

**OPUS MEDICAE
PROGNOSEOS, IN
QUO OMNIUM
QUAE POSSUNT
IN AEGRIS...**

Antoine Constantin, Giovanni
Battista Coccini





Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu

71

14

O P V S

M E D I C Æ P R O G N O S E O S .

In quo omnium quæ possunt in ægris animadu-
uerti symptomatum in omnibus morbis, causæ
& euentus copiosè & luculenter exponuntur.

*Omnia à Galeno, Hollerio, Dureto & Iacotio, fidelissimis
summi Hippocratis interpretibus deprompta; & quæ
in illis Authoribus erant hac illac sparsa, sunt in eo
opere optima methodo digesta.*

Labore ANTONII CONSTANTINI,
Doct̃oris Medici.

Cum Indice locupletissimo.



L V G D V N I ,


Apud CLAVDIUM MORILLON, Typographum
Sereniss. Ducissæ Montispenserij.

M. D C. XIII.

CVM PRIVILEGIO REGIS

1871

1871



C A R O L O L O T A R I N G I O .

SERENISS. GVISIÆ

Duci, Prouinciæ Proregi
dignissimo,

Antonius Constantinus Medicus, S. D.



AB ET, Princeps Serenissime, nostra medēdi facultas, quemadmodum Respublica Christiana suos perturbatores: quoniam sicut Hæretici pestiferis dogmatibus vniuersæ Ecclesiæ Christi politiam peruertunt, & animabus exitium afferunt sempiternum: ita Empiricorum secta, & carbonarij Paracelsici, qui sua illuue meliorem Europæ

E P I S T O L A.

Christianæ partem conspurcarunt, non solum synceritatē & perspicuitatē nostræ artis, quibusdam barbaris & incognitis vocibus obnubilarunt: verum etiam salutem hominum fucato venenorum sapore insidiantur. Et, quod calamitosius est, non desunt multi etiā ex his qui clauum tenent in Republica, qui hoc hominum genus, omni salubri doctrina & philosophandi scientia destitutum, sine vlla naturæ & anatomicæ rationis cognitione, omnium circumstantiarum in Medicina faciendâ obseruandarum contemnens admirantur, suspiciunt, & amplectuntur: etiam si eorum manibus propriam corporis salutem credere formidarent. Talibus viris te minus assentiri (Dux potentissimè) non ignoro: cū in Gallia æquè atque in hac Prouincia tuos habeas rationales omnique probitate & doctrina ornatos Medicos. Solius est huius ordinis rationalium morbos quibus humanum corpus opprimitur distinguere, singulorum causas & naturas investigare, omnibus salutes curationes discernere,

EPISTOLA.

cernere, & in quem quique exitum incli-
nent (quod pene diuinum est) prænuntia-
re. Cuius prædicendi artis studiosus, hoc
Medicæ prognoseos, sublime & excellens
opus, sed ambitionis expers, exaravi. Fetus
quidē est summis vigiliis, pertinaci & im-
probo labore, variisque partus tormini-
bus. Qui in liberam lucem proditurus, tui
augusti nominis vmbra & alis, vt à vultu-
rum rostris & coruorum croticibus tutus
auolaret, indigebat. Siue enim quod à ve-
teribus Austratiæ Regibus, seu ab anti-
quissimis Lotaringiæ Principibus genus
ducas: siue ab Arduenuæ, Bononiæ, Bra-
bantia, Cymburgij, Louani Ducibus &
Comitibus vetustissimis sis oriundus: siue
ab inclyto illo Bullinæo, Eustachi & Idæ
filio, Solymorum & Asiæ triumphatore
piissimo Vvillerni Regiæ tuæ gentis aui
Germano, exordium trahas serie longis-
sima: siue quod sub augusto & magno
LVDOVICO Prouinciæ prouinciarum,
quam tu intrepidē è tyrannorū faucibus,
Maciliae vrbi antiquissimæ & potentissi-

EPISTOLA.

mæ libertate restituta , habenas Prorex
 mira prouidentia moderaris: Siue quod
 Heroïs illius Guisij , cuius nomen totum
 per orbem personat verè sis filius. Cui,
 amabo , generosiori & illustriori tutori,
 qui rei literariæ & medēdi arti plurimùm
 tribuit , potuit vel debuit laborum meo-
 rum hic fœtus committi aut consecrari?
 Quòd si Deum naturalis subditorum in
 Dominos inclinationis, & animi memor,
 Lábisci , cui auita successione dominaris,
 incola (vbi publico honorario cohone-
 status, & aëris salubritate allectus, Aquensi
 ciuitate relicta , medicinam facio) te tan-
 quam dominum, & rerum omnium mea-
 rum legitimum protectorem suspiciam:
 nulli potui tot nominibus, has meas lucu-
 brationes dedicare. Quare quātuluncum-
 que sit hoc munus (Princeps illustrissime)
 quod ego tanquam excelso tuo nomini
 dicatæ Basilicæ Tholo deuotus appendo,
 æqui bonique consulas supplex exposco.
 Maxima quæque & sublimia me cōsecu-
 turum gloriabundus , si illud idem serena
 fronte,

EPISTOLA.

fronte tranquillóque animo suscipias, veluti quoddam signum meæ erga tuam Celsitudinem iustæ ac debitæ seruitutis, atque hoc ipsum in manus studiosorum Medecinæ, te auspice, prodire permittas. Quod à tua dignitate non erit alienum, siquidem Principes scientiarum cultores suscipere & hospitare consueuerunt. Vale. Faxitque Deus Optim. Maxim. vt quàm diutissimè saluus & incolumis viuas, & vsque ad extremam senectutem, heroica Principum sobole ditatus, benè & feliciter agas. Ex nostro musæolo Lambisci tuæ dominationis, Idib. Augusti, anno 1612.

*Tuæ celsitudinis cliens addi-
ctissimus,*

ANTONIUS CONSTANTINVS.



Amico Lectori, Salutem.



Quamvis humana menti negatum fuerit (amice Lector) per se & primò futura cognoscere, sed vel obiectis excitata præsentia intueatur, vel in reservatas species mersa præteritorum recordetur, solius autem diuinitatis sit vnico aspectu intueri

Quæ sint, quæ fuerint, quæ mox ventura trahantur.

Huius tamē æternæ lucis radiis inferiores mentes illustrata, futurorum etiam prænotione donantur: clara aliquando visione diuino numine abundantius afflata, ventura conspicientes aliàs coniectando solùm arte & præceptis instructæ imminetia procul cernentes. Qua posteriore præsa

Ad Lectorem.

præfagiendi via, Medicis concessum est posse irruentes morborum casus prævidere, & præuisos ante enuntiare quàm accidant. Quod cum maximam arti dignitatem tribuat, professoribus ingentem utilitatem comparat. Dignitas quidem inde micat, quod futurorum quævis prænotio magnum diuinitatis specimen referat: utilitas verò inde emergit, quod rectè præsentiens Medicus, & sibi agrorum gratiam fidemque conciliet, & oportunius quibusque medeatur. Sed hoc vnum dolendum est, quod inter cæteras medicinæ partes, ea quæ futurorum morborum euentus prænoscenti præcepta continet, cæteris minùs excolta videtur: seu quòd sparsim aliis confusa tradi consueuerit, seu quòd imminutè à plurimis attingatur. Atque utinam viri docti, & in artis operibus exercitati, suorum ingeniorum labores ita dispensarent, ut potiore eorum partem in prænotationis Medicæ institutis penè neglectis diligentius excolendis insumerent, & quæ rudia sunt expolirent, quæ verò obscura propriis observationibus illustrarent. Quod ut quantum in me est aggrederer, quæ longa experientia adnotavi, & quæ ex principibus Me-

Ad Lectorem.

*dicinae scriptoribus diuturna lectione ad hanc
artis partem utilia observavi, in facilem & ar-
tificioſam methodum diſpenſata, rogatus tan-
dem euulgare deſtinavi. Nolens fateor, & ami-
corum expoſtulationibus prouocatus, quod me
maledicorum huius aui frequentia perterreret:
maximè, cum nec vel expertiſſimus coquus poſſit
eundem cibum ad plurimorum guſtum condire,
nec quiſquam ſit qui ſua ſcripta tam indiſtriè
componat, ut omnibus ſatiſfaciat. Plurimi enim
inueniuntur qui nihil niſi vndequaue excultiū
ferunt, cætera criminantur. Quibus me ſatis-
facturum non ſpero: qui rebus, tum Medicinã
proſitentibus, tum toti humano generi utilibus,
methodicè conſcribendis intentus: fucatas di-
cendi veneres & verborum lepôres neglexi. Imò
negotioſa mea viuendi ratio in curandis agris
continuò occupata, & quod me aggrauat ſeniū,
nequaquam permiferunt, plurima quæ longio-
rem curam, & ſeueriorem cenſuram deſideraſ-
ſent, ut par erat, examinare & expolire. Quæ
alijs quibus plus otij & negotij minus relinque-
tur, accuratiùs excutient ac læuigabunt. Agri-
colas enim imitatus, qui varijs operibus intenti,
malunt*


Ad Lectorem.

malunt triticum licet non satis à lolio & auena expurgatum in noua frugis spem terra committere quàm à satione abstinere : satius duxi, hac minus exculta promulgare, quibus alij ad potiora proferenda excitentur, quàm occultare quæ plurimis profutura viri eruditi iudicarunt. Continet enim hoc opus non ea solùm quæ ad Medicam prognosim faciunt, sed omnium præterea symptomatum causas, in quibus discernendis iuniores plerumque perperam fatigantur, explicat. Totius autem operis ea est methodus, ut in sex libros distinctum sit ; quorum primo actionum animalium lesiones persequimur : secundo, quæ ad vitalem facultatem spectant percurrimus : in tertio circa sanguificationis vitia occupamur : quarto, excretorum & retentorum errores, scrutamur : quinto, eos affectus examinamus, qui in sensibilibus qualitatibus mutatione consistunt : sexto tandem Chirurgicorum morborum præsagia exprimimus. In quibus elaborandis quæ impensa est opera, tum mihi plurimum grata futura est, si in Dei laudem, & plurimorum utilitatem cesserit. Futurum enim est, ut quosdam delectet hic Liber, alios fastidiat.

Ad Lectorem.

*diat. Ne tamen ante iudicium feras, quisquis
es Lector, quàm totum legeris: tùmque
vel meliora meditare & profer,
vel his utere ac frueri,
& vale.*

PRÆFA





PRÆFATIO.



RTEM præfagiendi multi olim veteres excoluerunt, & tanquam vaticinationem quandam ob id admirati sunt, quòd optimi Medici sit officium, nò solum præsentem sanitatem conseruare & corruptam reparare, sed etiam futura præsentire & cùm oportunum videbitur, prædicere. Talis enim Medicus, ceu optimus gubernator de longinquo occurrens futuræ tempestati, omnibus quæ ad agros pertinent prospiciet & præcauebit. Et ex multo tempore singula consultè perpendens, quos superstites fore cognouerit, eos quoque rectius conseruabit. In exitialibus autem morbis, quæ futura sunt artificiosa coniectura præsentiens, adstantibus denuntiabit, vt & calumniam euitet, & præsidiorum famam tueatur. Quod aduertens mirus Hippocrates, omnium primus præsentiones ad therapiam pertinere existimauit. Non solum igitur Medico præfagiendi ars est utilis, verum etiam agro & adstantibus. Medico quidem, in quem

PRÆFATIO.

quem omnes habent coniectos oculos, sententiam de morbis expectantes. Qui si bona fortuna fecerit, ut sicut ab eo prædictum est, ita contingat (non contingit enim semper) suspiciunt, & admirantur prædicendi artem, & ad diuinationis naturam proximè accedere existimant. Eoque sanè modo & laudibus effertur Medicus, &, ut dictum est, internecionis crimine vindicatur. Ad ægrum verò peruenit illa utilitas, eius enim præscriptis facilè & exactè obsequitur, quem putat, & morbi sui naturam bene agnoscere, & numquam aut rarò in prædicendo errare. Ad adstantes denique spectat de morbi exitu prædictio, quorum ut plurimum è re est, utrum qui periturus est, condiderit testamentum, aut officia vel beneficia resignarit.

*

IN



IN OPVS MEDICÆ

PROGNOSEOS D. ANTONII

Constantini, ætatis nostræ

Medici celeberrimi,

EPIGRAMMA.

SI præuisa minùs ledant pungentia tela,
Præuisum ledet sic minùs arte malum.
Curandis morbis prænotio præstat, & inde
Accedit Medico maximus artis honos.
Gratia Prognoſeos diuos decet, vnde futuri
Temporis euentus ſolus Apollo refert.
Tu quoque diuino perdoctè hîc ordine promiſiſ
Quicquid de criticis cenſuit Hippocrates.
Obscura reliqui methodo ſcripſère, ſed vnus
CONSTANTINVS adeſt candidiora ferens.
Gaudeat hoc igitur peonia turba labore,
Et vigili tantum mente reuoluat opus.

Amicitia ergò ſcribebat, STEPHANVS
GAIOTVS, Medicus Salonenſis.

APPROBATIONES.

NOs subscripti Doctores Medici Lugdunenses, testamur hoc Medicæ Prognoseos opus legisse, quod iudicamus eruditionis & medicę scientiæ plenum ac dignum vt in lucem emittatur, tanquam omnibus Medicinæ candidatis vtile, & Reipublicæ proficuum. Datum Lugduni Idibus Februarij, 1613.

Y. CONNANVS.

A. C. A' GAVVILLA.



MEDICÆ PROGNOSEOS.

LIBER PRIMUS.

*Circa quos morbos prædicendi ars versari dicatur,
& utrum sit certior in longis, quàm
in acutis.*

CAPUT I.



SOLET melior pars Medicorum confiteri, & ratio etiam postulat, ut sicut boni Medici est in omnibus omnium partium morbis optimam victus rationem & artificiosam curationem præscribere. Ira de omnium exitu, quantum possit præfagiendi arte, pronunciare. Non enim solum morbis, qui acuti sunt & breues, verum etiam longis & omnibus in quibus excrementa, quæ mutationem subeant conspici possunt, hanc artem accommodari posse colligimus ex doctrina Hippocratis & Galeni. Sic de tussi & asthma ex sputis, de imbe-

A

cillitate ventriculi & iecinoris, ex alui excrementis, de febribus diuturnis ex vrinis, de vteri inflammationibus & aliis affectibus, ex his quæ per vuluam decidunt, iudicamus. Sic in tumoribus, vlceribus, vulneribus partiũ externarum, tempora & longitudines, ex his quæ defluunt prænosceimus. Et quemadmodum in cunctis morbis, qui ex humoribus sunt orti, ex humorum illorum mutationibus prænotiones fiunt. Ita existimandum est, in omni alio morborum genere, qui coctionem per excrementa cognitam non suscipiunt, ex alio quopiam haberi posse prænotiones. Habent enim tales morbi semper aliquod symptoma conspicuum & præcipuum, ex quo liceat internæ dispositionis constitutionem intelligere, licet ex excrementis colligi nõ possit. Quod autem quæritur, de facilitate, aut difficultate, de certitudine, aut incertitudine præsagiorum, in morbis vtriusque generis, contrariæ videntur extare sententiæ apud Hippocratem. Ille enim aphor. 19. lib. 2. aphorismor. certitudinem & facilitatem morbis longis tacite præbere videtur, cum ait: *In morbis acutis non omnino sunt tute prænotiones salutis & mortis.* Acutis verò, sententia 6. lib. 3. progn. vbi scribit: *Morbi qui breuissimo tempore indicantur, facilius cognitionis sunt.* Hanc difficultatem explicant qui morbos acutos inter se, longos inter se, atque hos cum illis comparant. Ex morbis enim acutis, alia habent præ

bent præfagia certa : quales dicuntur , qui toto genere sunt mortales , siue cum febre, siue sine febre, vt apoplexia fortis, angina exitiosa, & illi quorum signa non confunduntur. Alij incerta, cuiusmodi sunt qui indifferentes habentur ad salutem, vel ad mortem : quorū signorum confusio facit , vt Medicus, quamuis prudens, aliquando decipiatur. Vel propter materiæ morbigæ orgasum & varietatem, vel propter vires infirmi latentes, vel propter errores. Idem sentiendū de morbis chronicis, quorū etiam sunt certæ pronotiones : quales sunt qui sua natura sunt salubres , vt febres intermittentes ; aut lethales , vt phtisis : aliorum incertæ , vt quorum sunt signa dubia & confusa modis prædictis. In collatione autem morborum acutorum cum longis, distinguenda sunt tempora. Illi enim in principio certiores habent prænotionem , hi verò incertiores. Quia in acutis (& maximè si valde acuti sunt) statim summa sunt omnia, ita vt vires tam naturæ, quàm morbi facilè dignoscantur, vnde salutis & mortis signa certa colligi possunt. At in lōgis quorum materia tardè mouetur (quia frigida) non potest in principio discerni excessus morbi supra virtutem, nec huius supra morbum , nihil mirum si quicquam certi de morbi exitu à Medico promitti non possit. Verū si in progressu & statu acutum cū chronico conferas, quia tunc signa prognostica à co-

ctione vel à contrario sumuntur. Certū est prænotiones esse multo incertiores in acutis, quàm in longis. In illis namque materia calida & tenuis habens orgasmum, potest tunc tēporis impetu in partem principem ferri, & ægrum interimere. Quod in longis, quorum materia quietior est, & non tam variabilis, siue exitialis sit, siue salutaris morbus, minùs est pertimescendū. In salutaribus quidem, quia fieri non potest, ut materia morbifica, quę toto tempore quod præcessit, fuerit naturę obediēs, & nunc victa sit, ut malignitatē acquirat, modò nullus error committatur. Committitur autem ut plurimū in longis, & sæpius propter diuturnitatem, quàm in acutis & breuib. Sic in lethalibus morbis, quorum materia paulatim corruptionē acquisiuit, in statu ad extremum corruptionis gradū peruenit, eadem est prognosis certitudo. Dicamus igitur, eo faciliorem & certiore esse in morbis prænotationem, quo facilius & certius, potest eorundem virium cum naturę viribus fieri comparatio.

A quibus fontibus sumantur signa prognoseos.

C A P. I I.

Propterea quod tota prognosis ratio eò dirigitur, ut morbi finis innotescat, præcognoscatque Medicus, an æger euasurus sit, an moritu

moriturus. Hoc certe nulla scientia certiùs dignosci potest, quam si artificiosa coniectura vires ægri cum morbo conferantur. Certù quippe est vtrum horum duorum superabit, euasurum ægrum, aut moriturum: & eò citiùs vel tardiùs, quò fortius vel imbecillius vnù fuerit supra alterum. Fiet autem ex arte illa comparatio, si natura, si magnitudo, si motus & mos morbi bene dignoscatur. Primum signa propria & inseparabilia, *pathognomonica* Græcis dicta, demonstrant. Secundum eorundem signorum & symptomatum vehementia & magnitudo. Tertium partium morbi, principij videlicet, incrementi, status & declinationis tempus, quas partes morbus celeriùs aut tardiùs percurrit. Quartum denique, accidentia quæ superueniunt morbis, declarant. Ad quod etiam non parum confert cognitio partis affectæ, in temperie, nobilitate, usu, sensus acumine, & situ existentis. Quibus si rerum non naturalium distinctio adiungatur, certior erit coniectura. Indicatur autem virium robur, vel infirmitas, propriis quibusdam facultatum functionibus. Sunt enim tres præcipuæ facultates, quibus animal gubernatur, & in quibus vita consistit, à tribus præcipuis partibus promanantes, vnde actiones prædictæ habent originem. Harum præcipua & nobilissima est animalis, in cerebro proprio domicilio existens. Cui intra caluariam tâquam in arce contento,

adsunt sensus & motus instrumenta. Hanc facultatem illæsam esse ostendit animalium operationum, tam internarum quàm externarum integritas: sunt enim imaginatio, discursus, memoria, sensus, motus, vigilia, somnus, &c. Secunda facultas est vitalis, quæ à corde tanquam à fonte manans, per arterias omnibus cæteris partibus, suum vivificantem spiritum dispensat: cuius robur & bona constitutio anhelitu facili: qui ministerio pulmonum & partium thoracicarum efficitur, & pulsu æquali ac ordinato significatur. Tertia naturalis dicitur, quæ sui officij, quod est sanguificatio, habet iecur, propriū & præcipuum instrumentum. Illud enim in infimo vêtre positum à multis partibus tanquam ministris iuuatur. Nā vētriculū propinquum & vicinū habet, à quo chili rudimētum accipit. Habet in caua sui parte vesiculā felleā, & in latere opposito splenē, ut ab hoc humore terreo & nigro, ab illa igneo & flauo sanguis purificetur. Habet vtrinque ad latera venæ cauæ, paulò infra se, renes, per quos sanguis parte serosa expurgatur. Habet denique in ima ventris parte vesicā vrinariam, quæ veluti laguncula vrinā, quam à renibus per vreteras excipit, & ad tempus seruat, donec voluntas iubeat eam extrudere. Læduntur autem hæ facultates singulæ tribus modis. Diminutè nempe, deprauatè & abolitè. Ex animalibus quidem minuuntur, &

abolen

abolentur, plus minus, internæ in affectibus frigidis cerebri, & in horum multis externæ simul, vt in caro, in quo tamen spirandi operatio remanet: In comate, & in apoplexia omnes pereunt. Minuuntur in stupore functiones motrices voluntariæ, & in resolutione abolentur. Læduntur deprauatè animales internæ operationes, in phrenitide, in melancholia, in mania, & furore, in vertigine. In hac tamen sola imaginatio læditur, & visiva aliquando breui tempore aboletur. Deprauantur motrices & sensibiles omnes potentia, in morbo comitiali, sicut in eiusdem paroxismo omnes principes & internæ abolentur. Tot modis etiam læduntur vitalis facultatis operationes, tam in affectibus pulmonis, & partiũ thoracicarum, quàm in morbis aliorum membrorum. Minuitur enim vis pulsifica & interdum aboletur, in cardiaca passione, in syncope, in hysterice affectionibus, in asthma te & anhelatione. Deprauatur in omnibus generibus febriũ, in pleuritide, in peripneumonia, in cordis palpitatione. Sic imminuitur & aboletur respirandi actio in caroticis affectibus, in apoplexia & angina exitiosa, in hysterica passione. Deprauatur in tussi, in pleuritide, in peripneumonia, in phtisi, &c. Iisdem modis læditur sanguificandi potestas, & actiones omnium aliarum partium, quarum ministerio vtitur hepar. Minuitur enim in omni specie hydropis, in scir-

rho iecinoris, in dysenteria hepatica, in omni immodica emorrhagia, &c. Deprauatur in obstructione meatus per quem expurgatur sanguis à bile flaua in vesiculam felleam, in inflammationibus hepatis ipsius, in affectionibus lienis, quibus humoris nigri effluxus impeditur. Sic vëtriculi, ad quem pertinet cibos appetere & concoquere, operationes læduntur, diminutè in cibi fastidio, in prostrata appetentia. Deprauatè in canina appetentia, in citra seu pica, in Boulimo seu ingēti fame, in siti immoderata. Huius coquendi facultas læditur diminutè & abolitè in cœliaca affectione, & lenitate intestinorum, in apepsia, deprauatè in dyspepsia, in cholera morbo, & aliquando in alui fluxibus. Sic intestinorum operatio retentrix diminutè læditur, & abolitè in lienteria, in cœliaca passione, in voluulo. Deprauatè in diarrhœa, in cholera morbo, in dysenteria, in tenesmo. Nō dissimilibus modis vrinationis actiones (cui subseruiunt renes, vreteres, vesica, & sphincter musculus) læduntur, diminutè quidem in dyssuria siue vrinæ difficultate, abolitè in ischuria, id est, vrinæ suppressione. Deprauatè in stranguaria, quam vt plurimū faciūt renum & vesicæ inflammationes & vlcuscula. Ex supradictis læsionibus licet non solū colligere, quantum potest natura aduersus ægritudinem, aut hæc aduersus naturam: verū etiam ex substantia,

quanti

quantitate & qualitate eorum quæ excernuntur, vel retinentur præter naturam, præsertim in morbis humoralibus: quorum vnumquodque constitutionem partium à quibus manat, & in quibus generatur, optimè demonstrat. Vrina siquidem de vesica, de renibus, de hepate, de genere venoso. Fæces, de intestinis, de ventriculo, de mesenterio, de sima parte hepatis. Sputa, de pulmone, & partibus thoracis. Sudores, de toto habitu & vniuerso corpore, testantur. Quæ excrementa si cocta sint & victa, non solum salutem significant, sed & morbi breuitatem promittunt. Sicut eorum cruditas, cum virium robore longitudinẽ tantum cum langore, mortem propinquam ostendit. Prædictis testimoniis de morborum natura & exitu, adduntur alia, quæ circa corpus apparent, quæque corporis affectiones, seu qualitates appellantur. Quarum tot sunt genera, quot sunt sensus quibus vel à Medico, vel ab ipso ægro percipiuntur. Auditum quippe percipit æger sibilum & tinnitum aurium, vox verò clangosa, tremula, turbida, & rauca, à medico & ægro audiuntur. Sic colores præter naturam, vniuersum corpus, vel partes aliquas tantum maculantes, visui obijciuntur vtrique, in morbo regio, in hepaticis & lienosis, in vitiligine, in elephantiasi. Lingua, quæ faciliẽ tingitur, modò alba, modò rubra, modò nigra, conspicitur. Sic in carbunculis, in erysipelatis,

herpetibus, & gangrena quædam partes amittunt colorem naturalem. Huius generis symptomatum sunt fœtores, qui olfactum Medici & ægri per expirationes & transpirationes, feriunt: siue à pulmonibus, siue ab auribus, siue ab axillis, aut aliis partibus, vbi humores cunctando putrescunt, proficiscantur. Quantum ad signa quæ per sapores innotescunt, non decet Medicum excrementa gustare, cui satis esse debet ab ægro intelligere, quid dulce, quid amarum, quid salsum, per nares, per palatum, & per cæteras corporis partes, in excrementis sentiatur. Ad hoc genus quoque symptomatû referuntur, quæ tactu discernuntur qualitates; quales sunt caliditas, frigiditas, humiditas, siccitas, mollities, durities, ariditas, asperitas, leuitas, &c. quæ omnia isto sensu deprehenduntur. Tot sunt & plures aliæ affectiones, à quibus præfagij signa in omnibus morborum generibus desumuntur. De quibus optimo ordine, auxiliâte diuina gratia, agemus, simul atque de differentiis signorum hoc sequens caput præmiserimus.

Generalis signorum diuisio.

C A P. III.

Q Vando res ita tulit vt de morbis partium internarum nihil nobis innotescat, nisi quod

quod ex signis potest manifestari, optimo iure consulunt authores, magnam diligentiam in iisdem exponendis, & recēsendis adhibendam esse; ne quæ generis sunt, cum iis quæ speciei, & contra quæ speciei, cum iis quæ generis, confundantur. Hoc enim reprehendit Galen. in eo, qui prorrhetici libri est author. Signorum igitur distinguendorum hæc erit methodus, ut alia speciem morbi declarent, & ab eo sint inseparabilia: quæ *pathognomonica* Græcis dicuntur. Talia sunt in pleuritide, lateris dolor pungens, difficilis respiratio, tussis, febris acuta. In melancholia, metus & mœstitia. Alia assidentia dicta, quæ quidem non semper morbum comitantur, sed sæpe cum illo accidunt, ferèque pathognomicorum sunt effecta; quæ interdum aut etiā perpetuò causis inherant, differentiâsque ostendunt ab affecto loco, aut specie, aut natura affectus. Talia sunt in pleuritide sputum cruētum, flauum, lingua arida, dolor ad iugulum, vel ad hypochondria declinans, decubitus facilius in hoc quā in alterū latus: Et hæc *syndreuōda* Græcis appellantur. Alia sunt postmodum apparentia, eaque multorum generum; quorum quædam benignitatem aut malignitatem morbi ostendunt, quæ propriè *epiphenomena* dicuntur. Quædam, quæ naturæ certamen cum morbo, & motus criticos significant, & ob id critica dicuntur: cuiusmodi est anxietas, & perfrigeratio die critico

critico facta. Nonnulla sunt coctionis & crud-
 itatis, quæ in excrementis cernuntur. Alia deni-
 que sunt salutis & mortis, ex his sumpta, non
 solû quæ cum excrementis, sed etiam quæ toto
 corpore apparent. Quartum addunt signorum
 genus omibus commune, quæ vno & eodem
 tempore signa sunt & symptomata: quæque ne-
 que critica sunt, neque æquè atque illa quæ in
 coctionibus versantur, sunt fida, nec omnino
 infida: quorum etiam alia semper sunt bona, alia
 mala semper. Huius generis sunt quæ obseruat
 Hippocr. aphor. 33. lib. 2. & alibi: *Mente constare,*
& rectè se habere ad ea quæ offeruntur, facilem esse respi-
rationem, integrum pulsum, convenientem decubitus,
faciem bene valentium similem, caloris aequalitatem, &
similia. Ad hoc etiam genus referri possunt quæ-
 dam, quæ sensibus ipsis percipiuntur, quæque
 in bonis numerantur, sicut contraria in malis.
 Exempli gratia: Totum corpus æquè calere, be-
 nigni morbi est argumētum; cui neque inflam-
 matio interior, neque virium oppressio, aut ex-
 tinctio, neque aliquis vehemens affectus con-
 iungitur. Sic corpus æqualiter molle, vtramque
 duritiei causam abesse declarat. Sicut durities
 perseverans est valde prava, & perpetua planè
 lethalis. Item sitis absentia in febre ardente,
 extincta vi sentiendi in ore ventriculi, lethalis
 est, in delirio prava: bona verò, quæ neque bi-
 liosum, & calidum redundantem humorem ar-
 guit,

guit, neque humidum putrescere in ventre, aut pulmone denuntiat, quale in hydropse fitim facit. Huius generis sunt quoque somni suaues & moderati, quique laborem non faciunt, & contrarij; ex aph. 1. lib. 2. In exponendis autem signis cuiuscunque generis, quibus innititur prædicendi ars, habet Hippocrat. hæc vocabula familiaria: *Non malum, bonum, optimum: Non bonum, malum, pessimum.* Priora bonis signis, posteriora malis accommodantur. Ita vt primum sit de debilibus, secundum de fortibus, tertium de fortissimis & certissimis. In genere bonorum ergo alia promittunt dubiam sanitatem, vt quæ remisse sunt bona; alia securam, propinquiorem, vel remotiorem, quo vires firmiores vel infirmiores fuerint. In genere malorū, quædam sunt etiam non bona, remissam morbi malitiam significantia: quædam simpliciter mala, quæ periculum quidem minantur, non tamen necessario mortem, & maximè si cum aliis signis bonis coniungantur: alia sunt summè mala, mortem ineuitabilem portendentia, propinquam quidem si vires langueant, remotiorem si valeant. Hoc quoque in vniuersum de signis statuendum est, vt omnia quibus boni aliquid vel mali certò pronuntiatur, sint firma & constantia: per aphorif. 27. lib. 2. Praua siquidem signa, quæ stabilem causam non habent, breui desinunt, & per translationem humoris à nobiliori
parte

parte ad ignobiliorem, aut per motionem criticam, sæpe liberant ægrum affectu grauiori. Contra quæ modò bona sunt, modò praua, per humorum transfluxum, & transmigrationem, modò in hanc, modò in illam partem (vnde diuersa, & interdum cōtraria fiunt symptomata) in principio morbi, materiam turgentem, & naturam vinci à morbo denuntiant. Hoc modo suspecta, & infidelis estimatur aliquando morbi remissio, quæ à multis causis solet contingere. Aut scilicet quia materia eius est heterogenea, cuius portione tenuiore resoluta, vel sensibilter euacuata, crassior denuò inflammatur, & putrescit. Vnde morbus qui leuior factus videbatur, recrudescit; vel quia fit translatio materiæ à parte ignobili ad nobilem, vt in angina; vel propter spirituum & caloris innati resolutionem, vt in febris ardentibus, & in malignis, in quibus calor mitior ad tactum videtur; vel propter vltimum naturæ conatum contra morbum, vt in moribūdīs videre est, qui paulò ante mortem, alacrius moueri, & cibum appetere videtur; vel denique quia sensus hebetior factus est, vt contingit in vsu narcoticorum. Quædam pariter sunt ex prædictis signis, quæ grauiorem morbum factum sine perseuerantia ostendunt: Quæque sicut timorem & terrorem incutiunt ad stantibus, ita Medico spēs salutis promittunt; cuiusmodi sunt quæ crisim præcedere solent,

in con

in conflictu naturæ cum morbo. Cum scilicet cocta materia, natura vtile ab inutiles separare nititur, vt illud retineat, hoc deiciat. Recrudescit quoque morbus sine perseuerantia, ex animi pathematibus, vt ira, furore, tristitia, &c. Hoc tandem de signis vniuersaliter est notandum, vt eorum vi res potiùs quàm numerum perpédamus. In magnis enim morbis & suapte natura lethalibus, vnicum signum prauum est multis bonis anteponendum. Et contrà in mitioribus vnicum bonum multis prauis. Hippocrates tamen in epidemiis, inter signa graua & lethalia multos euasisse obseruat, quibus hæc tria in primis integra & inculcata fuerunt, pulsus nempe, respiratio, & appetentia, quòd ad salutem magnam vim habere comperiantur.

De prognosticis quæ sumuntur à lesionibus animalis facultatis internæ.

C A P. I V.

Diminutiones & abolitiones (quæ secundùm magis & minùs duntaxat differunt) facultatum animalium internarum, sequuntur potissimùm ad affectus frigidos cerebri. Sunt enim humoris frigidi soboles. Qui humor si cerebri ventriculos occupauerit, apoplexiam, epilepsiam, caroticos, & comatosos affectus diuersimodè dicitur generare. In quibus prædictæ actiones vt plurimùm abolentur. Si verò eodem humore

humore irroretur substantia illa cerebialis, minuitur memoria & aliquando omninò perit. Quòd si cum intemperie frigida fuerit copulata siccitas, stultitia simul, si humiditas, sopor etiam coniungitur. Minuitur memoria siue potius perit omninò, & celeriter in phrenitide, *ob vapores copiosos, qui cum impetu feruntur ad caput, nò sine multis phantasmatibus, quibus obruitur memorandi potestas.* Aboletur memoria in rigore symptomatico & critico, eadem ratione qua in phrenitide: aboletur quoque in pestilèti cōstitutione, à causa nò cognita. Vt in ea de qua meminit Thucydides, in qua multis cōualescētibz ita deperdita est memoria, vt etiam nominis proprii obliuiscerentur. Aboletur & in vulneribus capitis aliquando. Minuitur vel etiam perit in senibus, ab intemperie frigida, iuncta cum humiditate vel siccitate cerebri. Harum læsionum aliæ sanantur facilè, aliæ difficulter, aliæ in affectus peiores incidunt, aliæ ad mortem terminantur. Sanatur enim facilè obliuio, in rigore critico, quia in eo corpus magis incalcescit, quàm ante rigorem. Difficulter curatur ea quæ primaria cerebri affectione, & paulatim generatur. Incurabilis est quæ propter senium & ab intemperie frigida & sicca efficitur. Incurabilis est, & ad mortem terminatur, quæ rigori symptomatico & phrenitidi succedit. In illo, quia calor natiuus pugnx sucumbit, & à symptomatica

ptomatica per frigeratione vincitur. Tūc enim cor non habet spiritus, quos suppeditet facultati animali. In hac verò obliuiosi non ad se redeunt: quia cerebrum hoc modo refrigeratum vix vnquam potest restitui. *Intemperies enim frigida, quæ succedit calidæ, est incurabilis.* In affect⁹ peiores transit obliuio, quando repente, cū alia omnia in homine sana esse videntur, contingit. Tunc enim, vt ait *Ætius*, vel morbus comitialis, vel syderatio, aut resolutio, aut quoddam magnum malum cerebri ne superueniat, est formidandum. Minuuntur & pereunt, plus minus, prædictæ functiones, in apoplexia, cuius varij sunt exitus, pro eiusdem variis differētiis à maiore vel minore respirandi difficultate desumptis. Nam quæ maxima & acutissima est, magnitudinem causæ, sequens, non potest non esse funesta: nec, si authore Hippocrate superueniat febris inde solutio fiet: levis enim non sufficiet, & vehementem vires non sustinebunt. In ea siquidem natura ita succumbit oneri, vt ampliùs neque voluntate, neque instinctu thorax moueri queat. Pereunt ergo ægri aut quia omninò nihil respirant, aut cum magna violentia, & cum stertore, & intermissione, respirant. Quæ verò apoplexia habet quidem vehementem respirationem, minus inæqualem & inordinatam, mutatur in paraplegiam, & resolutionem aliquarum partium, aut etiam vniuersi

corporis : aut in amentiam , nisi proportionata febris superuenerit. At apoplexia in qua respirationis ordo seruatur, cum stupiditate & incertitudine quadā motus (est enim omnium mirissima) remediis euacuantibus curatur. Visa siquidem est plerumque apoplexia, ab obstructis venis & arteriis carotidibus orta , copiosa venæ sectione sanata.

Lædunt prædictas functiones magis vel minus affectiones comatosæ , pro vt grauior vel leuior fuerit ad somnum propensio , à primaria cerebri affectione, vel ab aliis partibus per sympathiam progressa. Ex quibus hac methodo licet prognosticum colligere. Coma quod ab humiditate copiosa & vtili, cerebrum opprimente fit, vt in ebrietate, absolutè bonum vel malum dici non potest, sed adhibita distinctione, per aphor. lib. 5. *Si ebrius derepente obmutescat, conuulsus moritur, nisi febre corripiatur, aut qua hora crapula soluitur vocem recuperet.* Quod verò coma à sanguinis copia gignitur, venæ sectione curatur. Sic cataphora phrenitidi superueniens, lethalis est per axioma: *Morbi frigidi qui succedunt calidis lethales.* Sic cataphora ab extinctione, quam ostendit pulsus paruus, languidus, ephidrosis frigida in capite & thorace, aut toto corpore, morti proxima est. Abolitè læditur imaginationis functio in catoche : In qua reliquæ etiam animæ facultates internæ vitiantur. De cuius exitu pronuntiandum

tiandum est, adhibita distinctione, grauitatis & leuitatis affectus. Leuior enim, cuius meminit Galenus sent. 56. secundi prorrh. cūrabilis est, ab ea quippe condiscipulus ille quem commemorat euasit. Catoche quæ repente incidit, aut diu perseuerat, cum signis salutaribus, in morbo diuturno, parotides prænuntiat. Catoche cui neque lotia, neque alui deiectiones succedunt, & quæ cum virium exolutione fit, lethalis est ex sent. 3. libr. 4. prorrh. sicut ea, cui cum interrupto suspirio sudor eruperit.

*De prognosticis ab affectibus functiones animales
internas deprauatè lædentibus.*

C A P. V.

MAnia, melancholia, phrenitis, vertigo, incubus, affectus sunt, quibus functiones internæ animalis facultatis deprauatè læduntur: in mania enim propriè dicta (multæ enim sunt huius nominis acceptiones apud Hippocr.) deprauantur rotiocinandi & imaginandi potentiæ, illæsa memoria, quod testantur cantilenæ, quas cum priùs didicerint familiares habent. In melancholia eandem noxam patitur vis imaginandi & cogitandi. In phrenitide omnes illæ operationes deprauantur, præsertim si magna sit. In vertigine imaginatio deprauatè etiam læditur, non sine functionis visuæ &

motricis læsione, præsertim si vertigo magna fuerit, & tenebricosa. Deprauatur denique imaginatio sola in incubo dormituris contingente. Ad prognosim spectat plurimum, distinctio harum omnium desipientiæ differentiarum. Differunt ergo mania, melancholia, & phrenitis inter se, ut metus & mœstitia, quæ sunt melancholiæ symptomata, in mania & phrenitide non inueniantur: non enim metuunt, nec tristantur phrenitici, multo minus maniacy: febris, quæ à phrenitide distinguitur melancholia, non omnino caret mania; ea tamen distinctione, ut in maniaco delirium antecedat febrem, in phrenitide delirium febrem sequatur. Ex quibus colligimus non eandem esse febrem quæ phreniticis contingit, quam quæ maniacy: non enim eadem est morbi materia, quamvis idem locus affectus: febris enim maniæ quæ succedit phrenitidi habet causam atrabilem, phrenitis verò biliosam. At mania quæ per se fit, aut nullam habet febrem, aut ita exiguam, ut causa maniæ dici non possit. Ergo non sola febre distinguuntur phrenitici à maniacy, sed ea acuta, & quæ ab inflammatione oriatur.

His prælibatis, de omnibus prædictis læsionibus deprauatis, instituenda est methodica prognosis. De phrenitide quidem, præmissa distinctione, temporum morbi, causæ, & eorum quæ

quę phrenitidi superuenire solent. Quoad tempus, non solum præsentī phrenitidi debet prospicere Medicus, sed etiam futuram præuidere, vt arte arceatur. Præuidetur ergo duobus potissimum signorum generibus. Quorum vnum consistit in omni voluntaria actione, quatenus in ea decorum non seruat æger, vt si manus indecorè moueat, crura admodum in lecto contrahat, aut proiciat, aut in ventrem iaceat, præter consuetudinem & sine conuulsione aut dolore. Et hoc est quod Hippocr. in prognostico, appellat inhonestam & absurdam corporis compositionem in lecto. Item si quis frequenter sputet sine necessitate, si surgere indecorè, & lectum mutare velit, aut magnum & rarum spiraret, aut totus à seipso mutatus in moribus videatur, aut turpia loquatur: his visis, vel breui futuram phrenitidem, vel iam adesse pronuntiandum, de quibus est textus apud Hippocr. in epid. & in prorrh. *Mores mutare & turpia ac obscena loqui præter consuetudinem.* Alterum genus signorum futuram phrenitidem præsagientium, est sensus vacuitas, qua in animo existente, non aduertit æger species impressorum, nec quæ sub sensum cadit percipit impressionem. De qua phrenitide extat aphorismus, *qui parte aliqua dolentes dolorem non sentiunt, ipsi mens laborat.* quę nota est non solum insipientis, sed etiam completæ affectionis. Sicut quæ sequuntur sunt solius



exordientis. Nempe infestari immodicis vigiliis præter consuetudinem, variis imaginationibus turbari, opes censûsque iactitare, nunc irasci & clamitare, sine ratione, nunc meticulosum esse, & lachrymari præter consuetudinem. Eadem arte prævidemus melancholiã priùs quàm fiat, & maniam quoque. Cui maximè propensos existimare debemus, quibus est debilitas cerebri, quales sunt epileptici: qui non manifesta causa, aut etiam manifesta longo tempore perseverante, metu & mœstitia afficiuntur: qui immodica pecuniarum cupiditate macerantur: qui indefessa opera literas & disciplinas sectantur. Hæc & similia huius generis si Medicus videat apparere, remediis conuenientibus, futuram melancholiam & furorem impediet. Quod attinet ad prognosticum, hoc de omni desipientia dicitur à Galen. comment. in aphor. 53. lib. 6. Nullam esse securam, minus tamen periculosam, quæ cum risu fit. Omnium verò periculosissimam, quæ audax est & temeraria. Habet enim hæc causam omnium mordacissimam, sicut illa mitissimam. Incurabilis fere est, quæ inueterascit, & in naturam conuersa est. Item omnis desipientia, cui vel hæmorrhoides, vel menses, vel varices superueniunt, soluitur. per aphorism. 11. & 21. lib. 6. *Insanis si varices vel hæmorrhoides superuenerint, insania solutio.* Item difficultas intestinorum, aut hydrops, aut extasis
insaniæ

infantiæ superueniens bonum per aphor. 5. lib. 7.
Quod verū esse posse in dysenteria & hydrope,
non autem in extasi, ait Gal. in cōment. Et hæc
de prognosi omnis desipiētīæ in genere. Quoad
speciem. In phrenitide hac distinctione erit
prælagiendum, vt alia ad salutem, alia ad mor-
tem, alia in affectum alterius generis termine-
tur. Quorum trium terminorum ratio, optime
dignoscetur, spectata phrenitidis causa, & acci-
dentibus quæ phrenitidi solent superuenire. Nā
quæ ex sanguine fit, & cum risu continuo per-
seuerat, securior est, ex Hippocrat. & curabilis:
modò sanguis nō sit substantia corruptus: tunc
enim à natura vinci non potest, testante Galen.
cap. 5. lib. 4. method. Quæ à bile pallida, est etiā
curabilis, habet enim & febrem & delirium
mitius. Quæ ex bile flaua, quam demonstrat
vehementius delirium & febris, difficilius cu-
ratur, & sæpe exitialis est: & quæ à bile im-
moderatè calfacta, plus æquo adusta, & præassata,
quod ostendit dementia ferina, efferata & me-
lancholica, omnino funesta est. Optime omniū,
quæ succedunt symptomata, huius affectionis
prælagium præbent. Phrenitidi enim ingraues-
centi, fatiscente natura, tria hæc superuenire
solent. Silentium nempe in extasi silente (ob-
scuram phrenitidem Hippocrat. appellat primo
prorrhethici.) Tremor in vehementissima phre-
nitide, & Conuulsio, morte imminente. Quo-

rum trium causæ sunt, infirmitas & langor facultatis animalis, quæ nec membris uti, nec sensibus potest, & vehemens neruorum exiccatio, ab incendio febrili. Languescit autem facultas, tum à morbo superata, tum à variis motionibus & vigiliis defessa. Superueniunt etiam phrenitidi, vrinæ tenues, & deiectio alba, malis ægri rebus: ut pronuntiat Hippoc. eodem loco per hæc verba: *Phreniticis alba deiectio mala est.* Albedinem autem acquirere illa excrementa, ait Galen. comment. ad sent. 13. lib. 1. prorrhæ. quòd bilis non ampliùs in ventrem confluat, sed vnà cum sanguine in vniuersum corpus distribuatur, & sursum feratur. Huius generis est rigor qui pessimè (ut ait idem aphorismus) phreniticis contingit, nisi criticus fuerit. Symptomaticus enim, magni morbi & pessimi est signum, magnas mutationes breui tempore facientis. Sed de rigore suo loco, sicut de stridore dentium, qui etiam exitiosè phrenitidi solet superuenire. Lethali signo phrenitidi superuenit semper lethargus: Siue errore medici nimio & diuturniore vsu refrigerantium vtentis, siue refrigerato aut resoluto neruorum principio, fiat. Mutatur denique phrenitis diutiùs perseuerans in furorem & immanem delirationem, funestè.

Quod ad prognosim vertiginis, varium & multiplex colligitur, ex multiplici eiusdem diuisione,

uisione, quatenus scilicet alia est sanorum, alia febricitantium, alia criticantium. Vocatur vertigo sanorum, quæ sine febre fit; in qua vel primigenio affectu cerebrum laborat, vel secundario. Nempe à ventriculo, ab utero, vel à genere venoso. Et hæc in apoplexiam, aut epilepsiam, aut in morbum obliuionis mutatur, ex comment. in aph. 17. libr. 3. Vertigo morboſa febricitantium si diutius in febribus permanſerit, vel si per totum morbum simul cum febre perseuerauerit, lethalis est; per aph. coacarum: *Febres vertiginosæ & sine sudoribus, & cum sudoribus, lethales.* Præsertim si localem habeat in cerebro generationem, vel in venoso genere, bile fermentante pituitam, vel in aluo aut pulmone: quæ enim ortum habet ab oppressione ventriculi, non ita lethalis. Vertigo critica excretionem critica soluitur.

Incubo imaginationem lædenti (quia humoris & vaporis crassi & crudi obstructione com meatum animalis spiritus impediens, ad diaphragma & thoracem peruenientis, est soboles) nisi succurratur tempestiuus remediis, in melancholiam, epilepsiam & tandem in apoplexiam labitur. Nonnulli volunt hunc affectum, spirandi ac loquendi difficultatem, difficilem motum, ac sensum obtusum efficientem, ita ut ægri se opprimi incubone putent, in paralyſim transmutari, quandoque in subitam mortem, dum

paulatim in ventriculis cerebri, crassus humor aceruatur. Hactenus de læsionibus actionum facultatis animalis internæ.

*De progn. læsionum facultatis animalis externæ,
& primo de visione laesa.*

C A P. VI.

Facultates animales externæ, quæ per nervos sensorios, & ad motum destinatos mediantibus musculis, dispensantur, multis affectibus diminutè abolitè & depravatè læduntur. Sentiens quidem externa (cuius pro quinario numero sensuum, quinque differentiæ statuuntur à Gal. cap. 3. libr. de differentiis symptomatum) habet totidem organa, quorum beneficio rerum externarum species percipit. Inter quæ illud per quod visio efficitur, præcipuum est & nobilissimum; quemadmodum visio excellit omnes reliquas sensuum operationes. De læsionibus cuius hoc loco tantum acturi sumus, quatenus ab ipsis sumuntur iudicia ad salutem vel mortem in morbis omnibus, & maximè in acutis. In oculis namque, tanquam in speculo, elucet & robur & imbecillitas facultatis. Quibus tantum tribuit Hippocr. ut ex oculorum carattere colligat totius corporis constitutionem, inquiens sect. 4. libr. 6. epid. *ut valent oculi, ita & totum*

totum corpus. Duo igitur considerantur in oculo, circa quæ versantur omnes morbi, qui visionem diminutè, abolitè, vel depravatè, lædunt. Videndi nempe operatio, & motus. Labefactatur itaque oculorum puritas & splendor, vnde minuitur vel aboletur visio, in morbis acutis, exempli gratia in pleuntide, aut per translationem materiæ ad cerebrum; cum scilicet temporis progressu, materia illic permanens, putrescit & nigrior efficitur. vnde vapores caliginosi ad oculos mittuntur, ac spiritu visiuo tenebræ offunduntur: aut resolutione spirituum, & natura eorum concidente: aut denique perit eadem puritas, neruo optico humore aliquo intercepto. Prima & secunda constitutio, non potest non esse suspecta: cum omnis traslatio ab ignobilibus ad nobiliores partes, in malis semper habeatur, atque irreparabilis sit spirituum ab imbecillitate, in morbis acutis resolutio. ex sent. 1. 1. 2. prorrh. Tertia verò vt plurimū incurabilis quidem est, siue derepentè, siue sensim fiat; ægro tamen non adfert mortem. Vbi notanda est differentia quæ est inter hebetationem oculorum, quæ morbi est per se, ab illa quæ febris est symptoma. Quod in hac multa turbulenta & caliginosa ob oculos versantur, quæ visa propria sunt delirātium, & propè omnium qui vita funguntur, illis que clausis oculis apparent. In illa verò apparitiones externæ sunt, propter

propter opacum humorem interpositum inter humorem cristalloidem & corneam tunicam: Quæ visiones intuenti se offerunt, quasi ante oculos fixæ sint. Eadem læsiones fieri solent à lemis & sordibus. Ex quibus ut intelligatur quid prædicendum veniat, notanda prius est earundem triplex generatio. Vna est in instrumentis ipsis affectis; ut inflammatis oculis, aut alio morbo laborantibus, tam propter humoris qui præter naturam est, copiam, quàm propter organa ipsa malè affecta, alimenta propria non benè coquentia. Altera generatio est, ubi caput plenum pituita fuerit, cutis verò frigore adstricta. ut in boreali constitutione. Tertius modus generationis lemarum est, ab imbecillitate facultatis naturalis, quæ oculos moderatur. Non qualibet, sed tali & tanta, ut ne modicum quidem oculorum alimentum concoquere possit. Prima igitur generatio nihil habet periculi. Tertia prorsus lethalis est, quæ à reliquis duabus discernitur: tum quia post tertium aut quartum diem, non antè, vi morbi incidit: tum quia concaui fiunt tunc temporis oculi, quod signum est potius penuriæ, quàm copię humoris, vnde colligitur facultatis imbecillitas, non potentis tantillum alimenti, quod oculis distribuitur, concoquere. Lædi etiam dicitur visio dum lachrimantur oculi, siue voluntariè, siue inuoluntariè. Illi enim, quia præ dolore, aut
miseri

miseriordia , aut aliqua animi affectione , exprimuntur lachrymæ , nihil mali est : hic verò cōtra. De his igitur lachrymis est , hac præmissa distinctione , præfagiendum. Num scilicet inflammatis oculis decidant , aut ex fluxione aliqua è capite oriantur , an verò ab imbecillitate facultatis retentricis. Primis enim duobus modis , contra naturam quidem fiunt lachrymæ , non tamen prorsus signo lethali : Imò interdum etiam sunt vriles. Deteriores multò sunt in vehementi phrenitide , sanie tenui , ex inflammato cerebro , in oculos redundante. At quæ exoluta & extincta facultate retentrice ipsius oculi substantiæ insita , exeunt lachrymæ (musculis scilicet & carunculis , quas angulis oculorū natura adiunxit , quasi præsidia quædam arcendis lachrymis , contabefactis & resolutis ,) Tale , inquam , lachrymæ omnium sunt exitiosissimæ. Huc pertinet luminis fuga , id est , luminis præsentiam ferre nū posse. Cuius causa communis est imbecillitas facultatis videndi , quæ à cerebro in pupillam affluens obiecti vehementioris occurso offenditur ; quæ facultas laborat , vel propter affectionem instrumentorum , vel per se ipsam affecta est : illud non est periculosum , hoc non caret periculo. Imò in febribus acutis , aut phrenitidis est prænuntium , aut mortis : præsertim si remisso certamine , natura impugnata fatiscat , oculorum splendidum instrumentum collaba

collabatur, & humor aqueus absumatur. Tunc enim luminis auersio, exitialis est omnino, & ægri iam iam morituri certissimum argumentū. Eædem læsiones visui contingunt, dum alter oculus altero minor fit, quam à natura factus sit. Quod quia significat spiritum, calorem insitum, & humorum tum natium, tum alimentarium deficere, & facultates principes extinguere, humoribus & tunicis, præ siccitate concidentibus: non est mirum si ab Hippocr. symptoma mortiferum pronuntietur. Cur autem summus ille author alterum oculum non vtrumque dicat, causam adfert doctiss. Iacotius. Quod scilicet non similiter facultas animalis in vtrumque descendat, vel ob maiorem vnius quam alterius infirmitatem, vel ob visceris interni, cui è directo situs est oculus, latens vitium.

*De prog. læsæ visionis à vitiis musculorum
oculum mouentium.*

C A P. VII.

ALterum caput læsionis visus, de iis erat propositum, quæ vitio musculorum oculos mouentium & palpebras, fieri solent. Qui muscoli, cum conuulsioni, resolutioni & tremori, sicut & reliqui omnium membrorum, sint obnoxij: fit vt cum eorum vitio vel torquentur
oculi

oculi, vel peruertuntur, vel agitantur, vel fixi & immobiles permanent, vel niſtant, vel cauantur, vel prominent, vel clauſi, vel aperti manent, præter conſuetudinem, prædictis omnibus modis viſio lædatur. His ergo oculorum vitioſis motionibus quid in morbis ſit præſagiendum, ſigillatim examinandum eſt. Conuulſis itaque prædictis muſculis cauantur oculi, contorquentur, peruertuntur, & immobiles manent. Sequitur autem cauitas eorundem oculorum, ad omnes immodicas & manifeſtas euacuationes, ad ſanguinis & caloris penuriam, aut victa natura & morte imminente, aut natura victrice, & poſt morbum diuturnum. Ergo ſi initio morborum acutorum cauentur oculi, colliquationis ſignū eſt. Nam oculi cū ſint humidiores, & molliores cæteris partibus, plurimūque animalis ſpiritus & calorem non exiguum, contineant, facilius à calore febrili abſumuntur, aut contrahuntur & excauantur: conſumptis ſcilicet reſolutis, vel ad viſcera, propter paucitatem, reuocatis ſpiritibus. Calor enim cum ſit in acutis acris, flammæ inſtar, ſuſum aſcendens, abſumit primum exiguas illas carunculas, quæ cartilaginibus & oſſibus oculorum incumbunt, ſigno maximè lethali. Eandem conuulſionem æqualem ſequitur oculorū immobilitas. Quæ ſi exhauſta iam materia, & natura ad exilium inclinante, in acutis fiat, melancholiæ & inſaniæ ſignum

gnum est. Fit etiam oculus fixus, & immobilis, à resolutione eorundem musculorum. vel ab imbecillitate facultatis, quæ musculos monet. Interdum virtute torpida, & oculis præ siccitate rigidis. Cuius immobilitatis prognosis colligitur, ex causarum distinctione, & morbi natura, additis aliis signis: Eorundem musculorum conuulsionem inæqualem sequitur oculorum contorsio, & peruersio. Quod vitium si musculis illis proprium sit & naturale, non est metuendum. Si verò à cerebro proueniat, extrema pernities significatur. Siquidem cerebri passiones, proximi nerui ante alios sentiunt: modò illi qui feruntur ad prædictos musculos, modo temporales. Contraria immobilitati oculorum, est mobilitas, & inconstantia eorundem, qua, vt ait Hippocr. assiduè nictant; quæ sicut in sanis, calidi cerebri & inconstantis, vel naturæ imbecillitatis in prædictis musculis, est signum, nullo imminente periculo: ita in acuta feбри nihil boni portendit, siue à bile in cerebro efferuente excitetur, quauariè agitantur animales spiritus, & nerui, qui in musculos oculorum inferuntur, acriter vellicantur, vt in phrenitide: siue à tremore & imbecillitate musculi firmantis & corroborantis oculum, qui comprehendit basim visorij instrumenti: siue denique ab occursumimij fulgoris fiat. Cautati oculorum contraria est eorundem prominentia, quæ visionem
vel

vel minuit, vel deprauat. Nam si à peculiari vitio, & resolutione musculi circumdantis neruum opticum, efficiatur, visum minuit. Si verò à multo spiritu, aut halitu confertim foras delato, vt in phrenitide, & magnis capitis doloribus, visum etiam deprauat. Harum duarum prominentiarum, vt prior exitiosa non est, ita hæc eandem habet prognosim, quam phrenitis & furor. Horrendum enim aspectum & veluti exterriti hominis, vulgò notant inter lethalia signa, in morbis acutis.

De prolesse visionis à vitiis palpebrarum.

C A P. VIII.

Palpebrarum (quarum superior duorum musculorum ministerio eleuatur, vno deprimitur, inferior immobilis est) vitiis offenditur etiam videndi operatio. Quatenus scilicet immobiles sunt, siue eleuatæ perpetuò perseuerant, siue depressæ, aut quia distorquentur, aut quia sine ordine motitantur. Si itaque resoluantur aperientes muscoli, descendit palpebra & immobiliter deprimitur, sicut si ambo prædicti muscoli conuellantur, sine motu eleuantur, & oculi aperti semper manent. Sed si alterutrum musculorum, vel conuellatur, vel resoluetur, sequitur palpebræ peruersio. Sicut hiat

C

& supina est palpebra, cùm claudens musculus resolvitur. Quoad prognosim, tentio convulsifica (quæ in acutis morbis resolutione est multò frequentior) aut accidit palpebris peculiari vitio suorum musculorum, aut reuulsa & corrugata fronte, præ siccitate, quæ vna palpebram eleuat; aut cerebri consensu & neruorum immodica resiccatione, à calore febrili. Primum nihil aut parum periculi habet. Secundum est magis metuendum. Tertium est planè perniciosum. Priùs tamen quàm ex his mors certò prænuntiari possit, addenda esse aliorum signorum testimonia, secundum Hippocrat. sent. 15. lib. 1. prog. diximus.

De prog. lesionum sensus auditorij.

C A P. I X.

Quemadmodum videndi, ita audiendi operatio tribus malè afficitur modis, diminutè scilicet, abolitè, & depravatè. In primo, sonus etiam in mediocri spacio, & moderata aëris percussione, vix percipitur: Diciturq; difficilis aut tardus aut grauis auditus. In secundo sonus externus nullo modo auditur, & surditas appellatur. In tertio sonus quidam interior, aliquando sine exteriori, aliquando cum eo intelligitur. Et hæc affectio tinnitus aurium, seu sibilus, nuncupatur. Grauis igitur auditus & surditas,

tas, quæ magnitudine tantum differunt, aut ab ipso ortu contracta est, aut post ortum: sed longissima & iam absoluta, aut nondum inueterata. Prima, quia vitio conformationis facta est, nulli remedio cedit. Sicut nec secunda, si post duos annos continuet. Tertia, quia nondum in habitum confirmata, quæ repente vi ipsius febris superuenit, distinctione indiget, ut de ea prognosis verificetur. Vel enim criticè, vel symptomaticè accidit. Illa fit in morbis diuturnioribus, à materia paulò frigidiorè; quæ & spem adfert abscessus, parotidum prænuntia, præsertim accedente comate, per aph. 73. tertij prorrh. *In capitis dolore coma & surditas, abscessum aliquem post aures eructant.* In tenuioribus autem & calidioribus humoribus, hæmorrhagiam, aut profluum alui, aut abscessum ad coxam, aut omnia simul denuntiat. Surditas symptomatica, si ab humore aliquo, ut bilioso, in auditorio meatu infixò, atque impactò, absque ullo peculiari aut insigni vitio instrumenti auditorij, aut facultatis fiat, facilè conquiescit; Bile scilicet ad inferiora translata, aut per hæmorrhagiam narium. ex aphor. 28. & 60. libr. 4. Si verò extincta audiendi facultate, quæ est acuti morbi aut turbulenti consequens, (id est in qua iam mens leuiter offenditur, vires infirmæ collabuntur, & sentiendi facultas extinguatur) surditas contingat, omnium deterrima, & maximè lethalis est;

& de hac surditate est particula illius aphorismi : *In febre non intermittente si labrum, aut supercilium, aut oculus, &c. si non videt si non audit, &c.* Deprauatæ auditionis symptoma, tinnitus aurium siue sibilus appellatur. Est autem vnus sonitus aurium naturalis & sanorum, quem non sentimus nisi admota manu ad aures vel re aliqua præsertim concaua & leui. Cuius perceptionem incolumitatis aurium indicium esse, ait Aristoteles 2. de animo. Alter tinnitus est morbosus, & contra naturam, magis vel minùs lædens. Malus quidem est, qui fit ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem, exhalantibus vaporibus ex ore ventriculi ad aures ipsas. Deterior ex humore crasso, qui intimam aurem occupat. At deterrimus putatur, qui in febribus acutis accidit. In quarum statu si fiat, quo tempore crises fieri consueuerunt. Tunc enim propter humoris agitationem in venis, aures implentur sonis. Ex quibus derepentè ortis, modò cætera consentiant, tutò crisin prædicere possumus. In declinatione & his qui ex morbo reficiuntur, propter aurium imbecillitatem, & resolutionem humorum, tinnitus & strepitus solet exaudiri. In quibus duobus modis nihil est periculi. Qui verò soni in febre acuta exoriuntur, vel ex biliosa materia, quæ per venas fertur, cuius motu & agitatione flatus ad caput peruenit, vel ex inflammato cerebro, & vehementius commoto, hali

to, halitu ab incendio intus concluso, lethales iudicantur. Præsertim si alia praua signa accedant, qualia sunt vrinx crudæ, confusæ, mentis leuis perturbatio, & similia per aphorismum. *Bombus in acutis, & sonitus aurium, lethale.*

De prog. læsionum sensus odoratus.

C A P. X.

Galenus libello de instrumento odoratus, anteriores ventriculos cerebri, esse olfactui designatos confirmat, hoc argumento: *Talia oportet esse odoratus instrumenta, quales sunt res que odoratu percipiuntur. Sed odores resultant ex halitibus. Ergo halituosum eius instrumentum esse oportet.* Eiusmodi est cerebri anterior pars; abundans spiritibus: Oblæsa itaque olfaciendi operatio, siue diminutè, aut abolitè, siue deprauatè fiat, ad anteriores cerebri ventriculos pertinebit. Fiunt autem hæc vitia, aut primario affectu, vt cum cerebrum, in illa parte præcipuè, aliqua intemperie, aut mali humoris alicuius exuperantia, laborat: & tunc vox manet incolumis: aut cum in ossibus colatoriis adest causa, quod ostendit vocis vitium. Nares enim, quia olfactui & spirationi subministrant spiritum, voci nonnihil conferunt. Diminuitur igitur vel amittitur olfactus vitiis omnibus, quibus magis vel minus impeditur halitus externi ingressus, ad loca vbi

odorum fit perceptio: *Qualia sunt angustia ossium colatoriorum, polypus, carcinoma, caruncula, rheumatismus perseverans, & alia eiusmodi, quibus viæ ad cerebri ventriculos impediuntur. Deprauatur vlceribus malignis & putridis narium (ozenas appellant) quæ quia putridorum & acrium humorum soboles sunt, graueolentiam in spiritibus, qui per nares ingrediuntur & egrediuntur, pariunt. Prognosis harum læsionum colligenda est, distinctione loci affecti, & affectus ipsius. Nam odoratus diminutio, vel abolitio, quæ fit ab intemperie ventriculorum anteriorum cerebri, vel potius ab eorundem repletionem, grauis putatur, & non aspernanda; propter periculosos affectus, in quos interdum mutari consuevit. Odoratus ablatio, quæ sequitur impedimentum viarum, aliquando curabilis aliquando incurabilis est, pro vt ab affectu grauiori vel leuiori sequitur. Odoratus verò deprauatio, magna ex parte periculosa est, præsertim si in morbis acutis accidat, & odor valdè putridus ac fœtidus spiret: vt in vlceribus narium. Quorum alia facilius curantur, vt recentia, superficialia & munda: alia difficilius, vt occulta, profunda, immunda, ossibus narium & colatorio potissimum communicata. Alia sunt perniciosissima & lethalia, vt diuturna, fistulosa, putrida, corrodentia, cancrofa. Et maximè si mammillaribus carunculis, & cerebro communicentur.*

De prog. lesionum gustus.

CAP. XI.

DVæ sunt præcipuæ partes gustui destinatæ, quæ saporum differentias primariò excipiūt, Lingua nempe & palatum; quæ rationem medij interioris & instrumenti habent, quarum variis affectionibus variè læditur gustandi operatio, siue perpeffio. Est autem lingua crebrò medico spectāda, non minùs quàm vrina. Cùm ad prædicendum in morbis non minor est vis ex illa, quàm ex his. In lingua enim propter suam compositionem & constitutionem naturalem, facilè omnium humorum, & vaporum vniuersi corporis, & maximè partiū internarum ac cerebri, qualitates imprimuntur.

Minuitur itaque aut perit omnino voluptas, quæ ex saporibus gustu percipitur, lingua molli, multaue humiditate imbuta, aut irrigatis nimium neruis, qui à tertia coniugatione prodeunt, ad gustum. Eadem sequitur noxa; & prorsus perit gustus, ex extinctione caloris natiui, in moribundis, in quibus lingua liuida est & frigida. Non enim apparet talis, nisi in magnis inflammationibus viscerum, aut in febre pestilenti. Deprauatè læditur eadem gustandi potestas in affectibus, quibus res gustabiles alio gustu percipiuntur, quàm præ se ferant. Sic

amara aut salsa iudicantur gustu deprauato quæ sunt dulcia. Et quemadmodum ex colore linguæ, sic ex sapore, qui succi vitiosi redundant in corpore, solemus iudicare. Lingua enim vincenti materiæ, aut coniunctæ, quæ morbum facit, concolor est, & eidem eius repræsentantur qualitates; ex quibus & natura morbi & præsagium colligitur. Quò itaque lingua horridior & asperior videbitur, eò deprauatior gustus erit, & res ægri peiore loco; maximè si in principio morbi, quod primo quaternario limitatur contigerit. Fit autem lingua horribilis duobus modis; aut contracto introrsum humido, & caloris propter penuriam extinctione; vel calore naturali exhausto, & inæqualiter disperso, à calore febrili & igneo, unde exarescit lingua, & difficilè exeritur. In priore modo frigus digito percipitur, & mors in propinquo significatur. In posteriore, aspera, sicca & arida percipitur lingua, minori periculo. In principio tamen, ut dictum est, deterior iudicanda: quia inde febris celeritas, vehementia, & malignitas significatur. Nigredo verò linguæ, si cum humiditate iungatur, non ita deprauat gustum, & minùs est periculosa, quàm si nigra & arida appareat. Quod si cum asperitate & veluti quodam liuore sit copulata nigredo, non solum fuliginis, aut feri atræ bilis soboles est, sed etiam extinctionem caloris, consumpto humido ostendit. Alterum
organum

organum gustus, palatum nempe, si intemperie, aut tumore, aut vlcusculis laboret; gustandi actionem labefactat magis vel minùs. Intemperies quidem calida eundem aliquando deprauat, frigida minuit & aufert omninò, si excedat. Tumores palati, qui vt plurimùm spectata loci natura suppurantur, siue per defluxum fiant, siue paulatim ex congesto partis excremento generètur, non sine gustus deprauatione. Quod maximè faciunt exulcerationes, quæ pueris latentibus in ore, vitio lactis corrupti in ventriculo. In adultis à fluxionibus acribus ex bile & pituita falsa, ex mala euaporatione & praua putredine, à ventriculo, vel à pulmone sublata. Fiunt etiam in febribus pestilentibus, & malignis prædictæ exulcerationes, quas aphthas Græci appellant. Quarum prognosis distinctione ætatis, causarum & locorum colligenda est. Pueri enim citiùs ab his consumuntur quàm viri; præsertim si aphthæ à gingiuis incipientes, ad palatum & totum os, tum ad vuam & fauces, propagentur. In adultis verò, quia vt plurimùm à fluente humore oriuntur, & aliquando depascentia vlcera euadunt, (nomas Græci dicunt) difficiliùs curantur, præsertim si ab atra bile fiant. Aphthæ quæ in suppuratis ex corrupto sanguine & feruente circa cor fiunt, & sanie acri in corpore coaceruata, atque à pulmonibus malè affectis, cùm in partes oris, tum in:

cutem effusa, lethales sunt, sequentes exitium morbi à quo manant.

De prog. læsionum sensus tactus.

C A P. XII.

Tactus non sicut cæteri sensus, peculiari aliquo organo concluditur. Sed toto corpore disseminatur, ut tanquam excubitor aliquis, violentos rerum externarum impetus persentiret, eosdémque moneret arcendos. Quam ob causam natura numerosos furculos neruorum à spinali medulla deductos, per totum corpus distribuit, ac veluti rete quoddam in cutem ipsam disperfit. Quam idcirco omnium extremorum medium esse voluit, præsertim quæ est in vola manus, ut sensibilibus omnium esset veluti norma quædam, mediante neruo, qui est proprium tactus instrumentum. Nec desinit visceribus & partibus internis sui quibusque nervi, quibus de iniuriis conqueruntur. Sunt autem obiectum tactus qualitates tactiles, quæ per oppositas cõiugationes, septem constituuntur. Prima est calidi & frigidi, Secunda humidi & sicci, Tertia gravis & levis, Quarta duri & mollis, Quinta friabilis & lenti, Sexta asperi & levis, Septima crassi & tenuis. His ferè omnibus si naturæ modum exceßerint, læditur aut diminutè aut abolitè aut depravatè tangendi operatio.

ratio. Diminutè quidem & abolitè in stupore & torpore, læditur quoq; motus. Quicquid enim attigerit pars stupore correpta, à quacunque causa fuerit affecta, obscuro & hebeti sensu affectionem percipit, vixque moueri potest, & si cogatur moueri, dolet. Causa autem stuporis & insensibilitatis est duplex. Insignis scilicet refrigeratio, cum humore aut sine humore, & neruorum angustia atque compressio; siue à ligatura, siue à luxatione vertebræ, siue ab aliqua inflammatione, neruum aliquem adstringente, fiat. Qui igitur stupor à refrigeratione, aut compressione nerui, perfectè spiritus animalis additus ad partem intercipiatur, paraplegiam facit; si ad totum corpus, apoplexiam. De huius prognosi diximus antea, de illius suo loco. Stupor verò in febribus periculosiorem habet causam, & plerumque lethalem. Nam cum stupet pars aliqua, calore natiuo euaporato, ac discusso à febrili, planè lethale est. Torpor in principio morbi, qui modò abesse modò adesse videtur, periculum significat & paralyfim minatur. Quod si longiùs progresso morbo, ea vicissitudo perseueret, signum est aut læsæ mentis, aut extinctionis caloris natiui. De quo torpore intelligitur aphorismus ille: *Torpor utroque celeriter transiens malum.* Deprauatur sensus tactus ab omnibus cæteris obiectis, quæ possunt inferre dolorem. Vt autem fiat dolor, necesse est obiectum

Etum dolorificum occurrere corpori neruoso, tam repente & violenter, vt soluat continuum, fiatq; non solum speciei affectionis impressio, sed etiam apprehensio. In impressione enim est sensus corporis neruosi, & in apprehensione est affectus indicium. Ex quibus patet ratio, cur sæpè in causa grauissima, dolor est leuissimus. Quod fit, vel quia non fit apprehensio, vt in phreniticis, vel quia non fit impressio in parte, cuius sensus extinctus est, vt in moribundis & resolutis. Ex quibus colligitur, vt dolor sit sensus seu perceptio rei naturæ tristic. Sicut voluptas est perceptio rei gratæ & consentaneæ naturæ. Et quoad prognosim, in vniuersum de dolore scire oportet, non solum loci dolentis naturam, verum etiam doloris species, proprietates & magnitudines. Confert etiam plurimū intelligere, non esse repugnans rationi causam doloris esse in vna parte, & in alia doloris sensum. Cuius rei causam volunt esse, aut sensus in actionum varietatem, vt in pulmonia: in qua pulmo non dolet, sed pectus: in lapide vesicæ & vlcere, dolor in pudendi extremo sentitur: aut conuersionem partis cum membro duro, & non cedente, qua conuersione fit, vt in pleuritide, & hepatitide, dolor ad iugulum ascendat: aut denique varietatem in quiete & motu. Nam cum pars quiescens cum parte mota connectitur, quæ mouetur magis dolet, quamuis in quiescen

quiescente fit causa doloris. Hæc sint dicta de dolore quo deprauatè læditur sensus tangendi. Nunc de signis doloris partium singularum.

De prog. à doloribus capitis.

C. A P. XIII.

DOlores capitis nouos & facilè solubiles cephalalgias nominare consuevit Gal. Eos verò qui inueterati sunt, & difficilè soluantur, cepheas, sub quibus continetur hemicrania, hac tamen differentia, vt in illis totum caput, in hac dimidium tantum capitis afficiatur. Partes autem in quibus doloris causa imprimi-
tur, sunt vel internæ, vt duæ membranæ, venæ arteriæ; vel externæ, vt cutis, muscoli temporales, & pericranium. Causæ doloris in vniuersum sunt, vel solutio continui, vel alteratio confer-
tim facta, quæ enim paulatim fit non sentitur. Causæ solutionis continui & alterationis, sunt vel flatus, à quibus dolor tensiuus; vel bilis excrementosa, vnde dolor mordax; vel plenitudo, eaque sanguinea aut alterius humoris, vnde dolor grauis. Dolètque caput aut per primariã ipsius affectionem, aut per secundariam. Illud ostédunt hæc symptomata, vertigo, aurium tinnitus, grauitas capitis, olfactus, aut alicuius sensus læsio sine nausea aut cardialgia. Hoc verò demonstrat prædictorum symptomatum pri-
uatio,

uatio , additur quòd hic dolores non sunt ita pertinaces, curatísque morbis vnde manant, sanantur. Trahitur autem caput in sympathiam omnium partium internarum, calida affectione laborantium , ascendente aliquando per continuas partes solo calore. Interdum cum spiritu vaporoso, fumoso, fuliginoso. Nonnūquam humorum excrementitiorum translatione. Quæ translatio ab infernis partibus ad superiores, semper suspecta est. Sicut ad inferiores laudatur ab Hippocr. Humor tamen metastasis in caput, non est semper lethalis. Natura enim robustior facta , humoris impetum interdum comprimit ; ac per hemorrhagiam , parotidas , aut alium abscessum vel excretionem se se exonerat. Ita vt quòd sit euasura eiusmodi translatio, prædici non possit, nisi ex superuenientibus. Ex quibus colligimus , quod de exitu doloris capitis variè sit prædicendum , prout à variis causis pendet , & cum aliis affectibus coniungitur. Nam dolor capitis, sine febre , cum vertigine & sonitu aurium , cum vocis tarditate & torpore manuum, finiri solet in apoplexiam. Præsertim in senibus , in epilepsiam verò in iuuenibus. Dolor capitis cum febre ardente, futurum delirium melancholicum portendit. Dolor capitis pertinax & firmus , cum delirio, feroci aspectu, rubore faciei , suppressione alui, quia multam caliditatem & siccitatem significat , metum conuul

conuulsionis & mortis adfert, nisi natura valida humorem morbosum deponat & mitiget, aliquo ex supradictis modis. Qui dolor aliquando in melancholiam & furorem mutatur, cum scilicet humor vritur, & substantiâ cerebri diluit.

De prog. oculorum dolentium.

C A P. XIV.

OCulorum duplex est consideratio, vna quatenus sunt partes organicę visionis instrumenta, de qua in superioribus actum est. Altera quatenus partibus similaribus componuntur, & morbis similaribus dolorem inferentibus obnoxij sunt. Et quod attinet ad prognosim doloris eorundē, sciendum est tales dolores esse solere grauissimos, siue fiāt ab humorū acrimonia, siue à multitudine & crassitie, quib. tuniculę oculorum supra modum extenduntur. (qua de re videndus est Gal. comm. in aph. 30. libr. 6.) & difficiles curatu; quę difficultas pendet à defluxione, quę vt plurimum eiusdem doloris est causa. Non enim facilē reprimitur in principio, ne irruat in oculos, nec sine noxa, duabus rationibus. Primò ratione plenitudinis totius. Non enim vtiliter repellentia vsurpantur, pleno corpore. Secūdò ratione multitudinis, crassitie, & tenuitatis humoris in oculo contenti. Copia enim & crassities, medicamentis non cedunt.

Tenui

Tenuitas compressionem eludit, præterlabitur, & in parte figitur. Tertiò ratione doloris & visionis. Dolor enim ab adstringentibus repressa materia augetur, visio periclitatur ab usu narcoticorum. Mitescit tamen hic dolor, qui ab inflammatione & humorum copia fit, superueniente diarrhœa, vel arte, vel natura excitata. Hippocra. lib. de vulneribus capitis scribit, quibusdam vulnerato capite ophtalmias superuenire, quæ purgatione conquiescunt. Idque magis ubi humor acrior fuerit. De quadruplici remedij differentia, quatenus à triplici causa manat hic dolor, extat aphor. 31. lib. 6. aphorismor.

De prognosi aurium dolentium.

C A P. X V.

IN doloribus aurium prognosis instituenda est adhibita distinctione loci, causæ & ætatis. Locus doloris, vel est in parte externa auris, visui conspicua, quam auriculam dicunt; vel interna & altius recondita. In illo loco, nunquam magnus dolor fieri solet: Et si aliquando inuaserit caret periculo. In hoc contra. Plerumque enim cum periculo affligit, magis vel minus, ratione causæ. Quæ est vel flatulētus spiritus, non habens exitum, qui membranas distendit & diuellit ab osse, cum tinnitu & strepitu valido. Vel est frigidus & crassus humor, intimæ auri
impa

impactus, vel denique phlegmones. Quæ siue fiat in parte intima, sub dura & tenui membrana, intus ossa ambiente, siue inter crassiorem meningem & membranam quæ prætenditur meatui auditorio, siue in exilibus musculis & vicinis partibus, cum periculo semper affligit ægrum. Nam cum pendeat eiusmodi inflammatio à tenui sanguine eò irruente per venas interiores meningum, & tandem putrescente, sitq; in parte sensus exquisitissimi; non est mirum si dolores eiusmodi grauissimi & acutissimi dicantur, & maximè perniciosi: præsertim in iuuenibus: quos dicit Hippocr. in prognosticis, & ex dolore aurium (per dolorem intelligens phlegmonē) septimo die, aut adhuc celerius interire; ob dolorum & symptomatum vehementiam, in calido & bilioso temperamento, in quo febris ardens cum delirio ægrum ad mortem precipitat ante suppurationem. In senibus verò, non est tantus dolor, nec tam periculosus, propter temperamentum frigidius, quo non tam faciliè affectibus calidis corripiantur. Non est tamen prius de morte pronuntiandum, quàm alia funesta signa coniuncta fuerint: qualia sunt yrinæ crudæ aut confusæ, vigilæ, deliria, dolor totius capitis, & similia; ex quibus inflammationis cacoëthia colligatur. Augebit certitudinem præfagij virium præter rationem infirmitas. Quoad dolores quos facit flatuosus spi-

D

ritus, vel humor frigidus & crassus, carent periculo. Per intervalla enim repetunt, ac intēduntur & remittuntur, nec habent delirium nec febrem comitem, nec sunt graues.

De prog. doloris cervicis.

C A P. - X V I.

Cervix, pars nervosa prope cerebrum sita, spinalem medullam continens, quæ per nervos partibus inferioribus vim mouendi impertit, nihil mirum si per febres acutas doloribus cruciatur, tam in partibus externis & circumpositis, quæ vertebrae ambiunt, quàm internis, propter affectum cerebrū, aut spinalem medullam, aut ipsas cerebri membranas. Prior dolor prauus non est, nec aliquid mali portendit. Posterior quia ab oppressione partium posteriorum cerebri, & humorum diffusionem in spinalem medullam, aut in membranas eiusdem cerebri, pendet, valde perniciosus est, & convulsionis prænuntius. Ostēdit enim copiam materiæ in cerebro aut malignam qualitatem. Quæ nec à natura euinci possit, nec loco contineri, in eas partes redundans nervos implet, ac spiritui animali præcludit exitum: unde convulsio aut paralysis sequi solet. Huius autem doloris prognos certius erit iudicium si aliæ partes, ad quas nervorum propagatio pervenit, offensum

offensum neruorum principium ostendunt. Cuiusmodi est manuum tremor, dolor cubiti & ad manus usque descendens, surditas, capitis grauitas, aurium tinnitus, quæ tria posteriora si cum dolore ceruicis coniungantur, comatosi affectus metum adferunt. Si verò cum vigiliis, & sine capitis grauitate, phrenitidem potius minantur.

De prog. faucium dolentium.

C. A. P. XVII.

Faucium nomine laryngem seu extremam partem arteriæ, qua spiritus ingreditur & egreditur, intelligunt; aut illas gulæ partes quæ sub oculos cadunt, ore aperto. Dolent autem fauces, vel sine tumore, vel cum eo. Idq; aut peculiari vitio ipsarum, vt à siccitate & inflammatione laryngis, aut cesophagi, aut musculorum eorundem; aut fit idem dolor per consensum cum cerebro, inflammatione laborante. Priore modo anginae sunt, de quibus capite de lationibus respirationis. Posteriore verò dolores faucium conuulsionem & phrenitidem denunciant. Ex eo enim quod æger cum febre acutissima malè in faucibus afficitur absque tumore, nec ore hianti, aut cum oscitauerit, facile tum maxillam reducere, tum os claudere potest, coniicere oportet cerebrum laborare phle-

gmone, ea parte qua nerui in temporales musculos deducuntur. Qua enim parte cerebrum affectum fuerit, ea neruorum propagines affectæ, musculos, quibus inseruntur, mouere non possunt.

De prog. clauicularum dolentium.

C A P. XVIII.

Dolentur clauiculæ aut quòd vniuersum thoracem claudant, aut quòd humerum & ceruicem concludant. Celsus iugulum appellat, à iungendo, soli homini & simiis concessum. Dolet hæc pars interdum, sed rarò propria affectione, & sine periculo. Plerumque ab inflammatione membranæ interioris & vicinæ. Sequitur sic dolor maximè cum materia pleuritidis; multas membranæ partes occupat, vel superiores, vel inferiores. Dolent clauiculæ maximè & cum maiori periculo, ad tensionē vtriusque hypochondrij, & inflammationem ingentem hepatis. Et quoad prognosim. Dolor iuguli, si per se consideretur nihil mali portendit. Quatenus verò sequitur ad inflammationem partium vicinarum, & potissimum hepatis, lethale signum æstimatur, non vt causa, sed vt signum. Duo enim sunt signa magnarum inflammationum iecoris. Tumor nempe hypochondrij cum dolore & calore, atque extensio doloris

ris ad iugulū. Non enim nisi in magnis inflammationibus gibbæ partis iecinoris, dolor extenditur ad iugulum; & ad nō has costas per consensum mēbranæ succingentis, & earum membranarum per quas in nonnullis iecur ad costas coniungitur.

De prog. pectoris dolentis.

C A P. I X.

Multiplex inuenitur apud Hippocr. pectoris acceptio: aliquādo enim accipitur pro media tantū parte pectoris, quam sternum vocant; aliquando pro orificio superiori ventriculi, quod sub cartilagine sterhi continetur. Familiare siquidem est Hippocrati, ut notata parte exteriorē, interiorē intelligat. Aliquādo & propriè pro tota parte thoracis. Cuius latera sunt costæ, posterior pars dorsum dicitur. Dorsi verò latera scapulæ & alæ vocantur. Dolet igitur pectus aut cum febre, aut sine febre. Sine febre quidem in lue venerea, iam altas radices agente, non solum sternum, sed etiam iugulum & omoplatae dolent dolore pertinaci. Cum febre verò si doleat pectus, in parte aliqua ex interioribus causam doloris contineri necesse est. Cuius doloris prognosticum colligitur; considerata morbi natura, unde est illius doloris origo: Siue pleuritis fuerit, siue peripneumonia, si-

sive alius affectus, in quibus virium robur donat semper medico bonam salutis spem. Potest enim dolere pectus cū febre sine vlla affectione internarum partium, vt patet in notha pleuritide. Est enim pectus sēsus exquisitissimi, partim propter membranas, partim propter nervos ex sexta coniugatione cerebri. Etiam propter nervos ab spinali medulla coniunctos cerebrali-
bus, vnde particula 59 sect. 6. de articulis scribit Hippocr. Dolores tardius desinere ex conuulsione sola musculorum intercostalium, quàm ex fractura costæ.

De prognosi ex dolente dorso.

C A P. X X.

PER dorsum eam spinæ partem intelligimus, quæ constat duodecim vertebis, quibus duodecim costæ articulantur, quam partem Latini tergum vocant. Pars siquidem est posterior, quæ vniuersum thoracem comprehendit, quia habet cum eo æqualem longitudinem. Cuius proprii & peculiare morbi sunt, tubercula magna, dura & diuturna, quæ circa vertebra oriuntur; & cū in tumorem sublata sunt, ligamenta ad se trahunt, & per ligamenta vertebra. Faciuntque tres differentias distorsionis spinæ. In partem scilicet anteriorem, posteriorem & ad latus. Accidunt quoque huic parti dolores,

lores, vel fixi vel locum mutantes : fixi quidem ab ictu, casu, refrigeratione, inflammatione spinæ, & membranarum eius, ab obstructione. Locum mutantes, ex humore defluente, vel solo, vel potius flatuosum crassum spiritum continente. Quoad autem prædictorum dorsi affectorum prognosim attinet, omnes morbos ex dorso difficiles scribit Hippocr. in coacis animaduersionibus his verbis: Ex dorsi dolore initia morborum difficilia. Et hoc (vt interpretatur Iacotius) duabus de causis. Vna propter sanationis difficultatem. Quia in dorso omnes venæ sunt exiles & angustæ, ita vt humores crassos excipere, & exceptos excernere vix possunt. Nec crudis tuberculis vllum remedium offerri potest. Altera causa est consensus quem habet dorsum non solum cum partibus inferioribus, quibus nervos distribuit, sed etiã cum principibus, id est, cum thorace & cerebro. Illinc stupores & paralysees partium subiectarum & totius corporis, atque vrinæ & deiectionis alui suppressio oritur. Hinc translata ad cerebrum materia, morbus comitialis & alij affectus naturam humoris & partis sequentes: additur etiam spirandi difficultas, quam vel empyema facit, vel vertebrarum dimotio, aut distorsio in anteriorem partem. Quorû affectuum prognosis, suis locis petenda est.

De prog. lumborum dolentium.

C A P. XXI.

PARTES quæ continentur & continent intelliguntur nomine lumborum. Continentes sunt partes spinæ, quæ absolvitur quinque vertebris, à nothis costis, ad os sacrum, musculis spinæ ipsius, & præsertim illo qui psoas ab Hippocrate & Galeno dicitur. Quæ verò partes continentur sunt, nerui, renes, vena caua, intestina, mesenterium, vtreteres, vasa spermatica. Partes etiam quæ illa omnia connectunt, vt membranæ, mesocolon, colon, cui continuantur renes. Tot sunt igitur partes quæ dolere solent in lumborum doloribus. Quarum partium dignotio accurata eget distinctione; cum qualibet parte affecta, putentur vulgò semper renes dolere, facitque hæc distinctio multum ad prognosim. Constat autem multis signis: qualia sunt doloris proprietas, situs, contactus, exeuntia, actio læsa, & propria symptomata. Exempli gratia: si doloris causa sit in renibus, dignoscitur ex vrinis. Si in musculis externis, tactu præfluq; sentitur. Si in spina, sensus stuporis, aut tremoris, in his partibus percipitur, quæ ex affecto loco nervos excipiunt. Si in membranis, dolor erit extensivus, dilacerans & horrificus. Si in intestinis, dolor est magis fixus & antrorsum inclinās.

Quoad

Quoad doloris proprietatem: qui pulsatiuus dicitur, fit quidem in partibus quæ sensu pollent; & arteriis refertæ sunt, quoties inflammatione tentantur, non autem in renibus, quia sunt sensus expertes. Dolor autem grauis magis illis aduenit. Confert quoque ad prognosim scire, vtrum doleant cuncti cum febre, aut sine febre. Si cum febre, dolorem esse in renibus, ex eo putandum est: quod ipsi in ea primùm ac multùm incalescunt, ob viciniam venæ cauæ, & arteriæ: multaque pinguedine obducti cùm sint, calorem febrilem augent & conseruant, adiuuante decubitu in dorsum. Cæteræ partes quæ continentur in lumbis, possunt dolere in febre, quoties inflammantur, aut intemperie calida cum materia laborant. Sine febre dolent lumbi, in suppressis mensibus, aut hemorrhoidibus, modò non sit alia manifestior causa, vt decubitus, labor, calculus, arenulæ, &c. Terminatur igitur lumborum dolor in febribus, aliquando critica excretionem per inferiora: victa scilicet materia crassa & tenaci à venis primis, quæ vètri & hepatis sunt vicinæ, ad colon intestinum prolapsa. Et hic dolor lumborum à suppressione, alui profluuium solet præcedere: præsertim in febribus intermittentibus, & his quæ habent motus inæquales, id est, quæ inæqualiter repetunt, & recalescunt. Aliquando in eodem dolore fit recursus materiæ morbificæ ad caput:

præsertim in febre ardente & maligna. Quod pessimum est ut signum & ut causa: ut signum quidem, quia non solum malignitatis humoris & vehementis perturbationis, in vena caua & arteria, certa significatio est: sed etiam naturæ infirmæ, quæ morbo dominari non potest. Ut causa verò, quia materiæ malignæ translatio à lumbis ad cerebrum, facit varia symptomata, prout in varias partes diuariat. Cuius metastasis certissimum signum est, doloris lumborum repentina, & sine causa manifesta, occultatio. Cui noua in superioribus partibus succedunt symptomata. Quod si natura in cerebro valens fuerit, larga per nares hæmorrhagia, aut materia ad inferiora deuoluta, profluuium alui, ab omnibus prædictis symptomatibus, ægrum liberat. Dolor lumborum sine febre, si à causa manifesta, ut decubitu, non pendeat, eruptione sanguinis solet finiri, per hæmorrhoides in viris, per menses in mulieribus. Et maxime si ab eiusmodi consuetis euacuationibus suppressis, originem traxerit.

De prog. ab ore ventriculi dolente.

C A P. XXII.

OS ventriculi veteres, ab accidentibus quæ inferre solet, cardiam dixerunt. Propter mutuum consensum & maximam affinitatem, quam

quam habet cum corde, ut colligitur ex scriptis Hippocratis. Et propter id cardialgia, & cardiogmos dicuntur de affectionibus huius partis, non de corde. Cum quo non solum consentit ventriculus; sed etiam cum omnibus partibus corporis. Quod ostendunt varia symptomata, quæ ex eius affectibus consequuntur. Qualia sunt convulsio, sopor, epilepsia, melancholia hypochondriaca, visæ suffusis similia, iactatio, inquietudo, anxietas, syncope, sonus turbulentus, insomnia, deliria. Quæ omnia cum vi febris plerumque fieri putentur, sæpe medico præsagienti imponunt. Notandum præterea ad præsagium, hanc partem tribus affectuum generibus affligi. Quorum alij ipsius proprii sunt, ut deiecta appetentia; alij per consensum cum vicinis partibus; alij denique sunt ex his quibus aliæ partes huius consensu afficiuntur, ut cor, cerebrum, &c. Dolet itaque hæc particula à morfu, quem facit acrium humorum ad eam partem affluxus. Dolet quoque per interiorum viscerum inflammationes, & maximè hepatis. Non tamen ad quamvis inflammationem: sed cum ita aucta est, ut & ventriculum immodicè calefaciat, & bilis calidioris, quæ continenter generatur, aut feri cuiusdam copiam, ad principium intestinorum (vnde dolor sæpè colico similis) transmittat. Ex quo ad ventriculum facilis est ascensus, & ad stomachum. Vnde semper
cardial

cardialgia, & sæpè singultus oritur. Quæ sine pulsu hypochondriorum fieri non solent; hanc cardialgiam, si perfrigeratio, & levis exudatio circa frontem tantùm & thoracem, vel pertor- tum corpus, sine remissione febris, sequatur, le- thale est. Inde enim & naturæ vehemens op- pressio, & virium summa infirmitas significa- tur, ab inflammationis magnitudine, quæ instar cucurbitulæ totū ad se sanguinem rapit. Quod si vehemens frigus fuerit, virtutem valdè imbe- cillam est coniiciendum.

De prog hypochondriorum dolentium.

C A P. XXIII.

Hypochondriorum nomine latius sumpto, omnia membra intelligimus, quæ sub par- tibus externis abdominis continentur: ventri- culum nempe, hepar, lienem & septum trāsuer- sum. At quoties, ut ait Gal. sine additione hypo- chondrium in singulari legitur, dextrum intel- ligi debere, ratione dignitatis, qua alterum su- perat. Inter notas optimi hypochondrij Hippo. ponit indolentiam, ex qua colligimus absen- tiam causarum quæ dolorem in illa parte mo- uere solent. Sunt enim, inflammatio, flatulentus spiritus, vehemens incendium, obstructio, refic- catio, conuulsio, &c. Quarum causarum aliquā, ponit semper dolor hypochondriorum. Dolet igitur

igitur aut totum hypochondriū, tam dextrum, quam sinistrum, aut alterum tantum, aut omnes partes quæ continent & quæ continentur. Quæ distinctio multum prodest, ad certitudinem prognosis, cum alia aliis, omnes, paucis, periculosius laborēt. Hepar enim dolens & inflammatum, grauius infert periculum, quam lien, & in hepate magis periculum imminet gibbis inflammatis, propter diaphragma, quam à parte concaua inflammata, & sic de cæteris est concludendum. Non enim distinguuntur pericula solum à magnitudine causæ. Sed etiam à natura partium, atque quo plures partes dolor occupat, eo deterius est, & contra.

Finiuntur autem dolores hypochondriorum excretionē critica, ut hæmorrhagia, sudoribus, vomitionibus, alui fluxu bilioso, præsertim si in parte concaua hepatis fuerit inflammatio, sicut quæ in conuexa per vrinas. Finiuntur aliquando suppuratione, quæ per vrinas vel per aluum expurgatur. Terminantur quoque hi dolores ab inflammatione, ad dolorem coxendiceum, per materiæ ad eam partem translationem.

Communicant enim cum partibus inferioribus, inflammationes hypochondriorum. Finiuntur & morte nonnunquam, quam certo prælagire possumus ex his quæ superueniunt. Ref: geratione nempe partium externarum, cardialgia, exsudationibus, &c. Et tandem quemad

quemadmodum dolores hypochondriorum celeriter generantur, natura infirma, à magna fluxione confertim facta, victa & superata: sic etiam interdum sine vlla manifesta euacuatione finiuntur. Quod quidem signum est, aut materiæ translationis ad nobilia viscera, aut naturam esse superatam nec amplius pugnare, aut denique mentem esse læsam: quod omne funestum est & lethale.

De progn. ventris dolentis.

C A P. XXIV.

PER dolorem ventris intelligimus cum qui fit in intestinis, tam crassis, quàm tenuibus, à flatulento spiritu, aut ab acri & mordaci humore intestina mordēte, aut ab inflammatione & abscessu, sicco stercore, ab intestinis in scrotum descendentibus, à veneno exhausto, à cruditatibus retentis & corruptis. Hic dolor si fiat in crassioribus intestinis, colicus dicitur; si in tenuioribus, ileus appellatur. Et quoad prognosticum, transit aliquando hic dolor in alios affectus; si diutius perseveret, nec vllis remediis cesserit, ut in nervorum resolutionem, præsertim in regionibus septentrionalibus; in morbum articulare, aut comitiale, aut melancholicum; aliquando in hydropem, potissimum qui dolores ab intēperie hectica intestinorum originem

ginem ducunt. Parit enim talis intemperies flatus, qui nullis medicamentis cedunt, & hydropem siccam efficiunt. per apho. 11. libr. 4. *quibus tormina adsunt, & circa umbilicū cruciatus, & lumborum dolor, qui neque medicamento, neque aliter solvantur, in siccam hydropem firmatur.* Terminatur denique aliquando in mortem, ut si intensissimus sit, si nihil remittatur, aut intermissionem habeat, si nihil excernatur per aluum, si excrementa alui per os excludantur, si singultus & sudor frigidus superueniant; ut in voluulo.

De prog. partium externarum & extremarum dolentium.

C A P. XXV.

Partes externæ aut superiores sunt, aut inferiores, aut medium corporis occupant. Illa scilicet manus & brachia, tibiæ & pedes, solent in febribus dolere, plus minus, prout cum foco febris magis vel minus communicant. Pedes enim, genua & suræ, per affectus viscerum, quæ sunt infra diaphragma magis dolent, manus & brachia, in affectibus thoracis & partium superiorum. Et quod attinet ad prognosticum, dolere consueverunt eiusmodi partes in febribus; aut à lassitudine spontanea, unde morbum præsentem aut futurum, aut etiam abscessum in articulos colligimus; aut à conuulsione à re-
siccatis

ficcatis nervis, quod est funestum; aut à materie decubitu, quod vel symptomaticè, vel criticè fit. Symptomaticè quidem, à copia & malignitate materiæ: cuius purredo in extremas partes diffunditur, manente foco in corpore. Quod malignum est & lethale, siue materia recurrat ad partes nobiliores, ubi delirium, aut alia lethalia symptomata generat; siue non recurrat. Tunc enim tota materia non potest in parte excipi: præsertim in genubus, ubi dolores per se maligni sunt, ob doloris vehementiam quæ celeriter vires deiecit, & ob naturam partis affectæ frigidæ & nervosæ, quæ obsedentem materiam nec totâ excipere potest, nec exceptam coquere, nec denique coctam commodè excludere. Dolores suræ, qui fiunt contractione muscutorum propriorum, à flatu, aut à frigore, non ita mali sunt: qui verò ab immoderata vacuatione, ut in cholera morbo, non carent suspitione: Dolores suræ, qui à materiæ decubitu recurrente ad cerebrum & mentem mouente fiunt, omninò maligni sunt & lethales. Dolores manuum & pedum, à translatione materiæ criticè facta & cum signis salubribus, nullû aliud periculum adferunt præter corruptionem & syderationem partis. Tunc enim materia febrilis, relictis partibus interioribus, in manus & pedes abscedens, caloris natui interceptione, nigrorem interdum inducit & sphacellum.

De

De prog. partium præter naturam calentium.

C A P. XXVI.

AD tactum imprimis attinet perceptio primarum qualitarum, quem maximè deprauat calor præter naturam : qui si in partibus externis fuerit, percipitur tum ab ægro, tum à medico manu admota. Internarum autem partium calor aliis signis manifestatur. Calor febrilis quâuis à natiuo specie non differat, excessu tamen ac proinde vi & effectu ab eo distinguitur. Natiuus enim succos æqualiter temperat, atque ad mediocritatem tum substantiæ tum qualitatis deducit ; qui neque mordax est nec molestus tactui : febrilis contra quem tamen in omnes corporis partes æqualiter diffundi, optimum æstimatur ab Hippocr. Totum enim corpus æquè calere, non maligni morbi signum est, cui nulla interior phlegmone nullusque cordis vehemens affectus copulatur. Omnibus namque affectibus quibus calor cordis & eius vires opprimuntur, impeditur cor quo minùs & sibi & toti corpori calorem impertiatur. Nec est hic calor præter naturam aliquando sine vtilitate: præsertim in affectibus frigidis, ab humore frigido & crasso. Is enim quamuis extraneus, conuulsionis remedium est, per aph.

E

26. lib. 2. nervos nãque calefacit & exsiccat, humorem attenuando euaporat, & frigidam atque humidam intemperiem, quæ pituitosi humoris effectus est & causa, ad calidiorem permutat. Sic febris quartanæ calor, ex Hippocr. & Gal. magnis morbis corpus liberat. Futuram enim epilepsiam arcet, quia excessu humoris crudi aut melancholici noxas tollit & accedente rigoris motu, eundem humorem promouet & expellit. Quod si igneus fuerit & perseverans, quia spiritus vitales resoluit atque humidum partium solidarum educit, calorem insitum extinguere creditur.

De prog. partium præter naturam frigentium.

C A P. XXVII.

Simili modo afficitur sensus tactus à frigore atque à calore, eidemque parem molestiam adfert, si modum excesserit, atque maiora mala aliquando gignit & significat. Sunt enim calor & frigus duo maximè agentia, quorum vnum plerumque ad alterum succedit, in corpore male affecto: à frigore etenim vehementi, idem effectus qualis ab igne produçitur; arefactio nempe, calor ater, mortificatio, &c. Consideratur autem frigus à medico non tantum ut qualitas agens, sed per comparisonem; vnde natius calor remissior, frigus esse censetur. Ad
pro gno

prognosim ergo notandum est, ex partibus externis (de earum frigore hoc loco tantum agitur) alias aliis facilius & vehementius frigesce-
re. Quæ enim natura frigida sunt, celerius frigore violantur. Sic partes posticæ vehementius obrigent, quia frigida nervosa, nervis atque arteriis destituta. Frigentque plus minus partes externæ & extremæ, pro ut à fonte caloris communis vel eminens magis abscedunt, in febribus non intermittentibus, & in intermittentibus, & præcipue in earum periodis, in dolore intenso, cum sudore plerumque frigido, in morfu aut oppressione ventriculi, & in perturbationibus criticis. Ex quibus perfrigerationibus aliæ sunt minus malæ, ut quæ in periodicis febribus, & quæ in doloribus fiunt; aliæ sunt etiam utiles, ut quæ in motibus criticis solent euenire, modò omnia consentiant, & sequatur excretio: at quæ in febribus acutis contingunt, pessimæ sunt, per aph. I. lib. 7. *In morbis acutis frigus partium externarum malum.* Gal. addit in commentario, non mediocriter malum sed valde perniciosum symptoma esse. Excitatur enim tale frigus vel à maligna materia quæ æstu turget, & feruet circa præcordia, vel à magna inflammatione, aut erisipelate alicuius visceris, in febre quam assodem vocant, vel ab infirmitate virium quæ corporis onus aut vim morbi ferre non possunt. Ad prognosticum etiam utile est scire, has perfrige-

rationes; fieri vel priuatiuo frigore vt quando cum sanguine calor ab extimis partibus ad interiores reuocatur, vt in magnis internarum partium inflammationibus: vel positiuo; vt cum calore insito extincto & resoluta, refrigerant prædictæ partes, vt in moribundis accidit. Solent etiam prædictæ partes in febribus aliquando alternatim modò recalescere modò refrigerari: Idque celerius vel tardius, prout citius vel serius noua materia colligitur, in qua vincenda plus minùs fatigatur natura. Quæ mutationes in vtramque conditionem, in acuta malignaque febre, mortem in propinquo significant; in minore morbo, longitudinem tantum.

*De prog. partium siccatarum & humectatarum
præter naturam.*

C A P. XXVIII.

HUMIDITAS & SICCITAS sunt etiam qualitates ad tactum pertinentes, quæ quia non sunt actiuæ per se, nec causæ efficientes, sensum illum non multum deprauant, nec eidem multum molestæ sunt. Ex his tamen de exitu morbi potest medicus quicquam certò pronuntiare. Humiditas enim quæ est mater putredinis, grauedinem & hebetudinem, resolutionem, segnitiam

tiem & mollitiem in toto corpore patit: aliquando in incremento febris, à malignis interiorum partium inflammationibus contracto ad interiora sanguine & spiritu: aliquando in fine acuti morbi, cum calor natiuus languescit & extinguitur; vnde Gal. ad sententiam 13. primi prorrh. scribit. Segnitiem commune esse symptoma eorum omnium qui moriuntur, propter dissipationem spirituum & extinctionem virtutis. Siccitas, quia lentè est actionis per se parum tactui molesta est: coniuncta autem cum calore vrente à quo generatur, dolorem facit. De ea multa dicuntur in genere. Quatenus nempe eius est duplex acceptio in medicina. Siccum enim in morbis dupliciter vsurpatur, aut pro excessu siccæ intemperiei, aut pro affectu in quo nihil per loca conuenientia excernitur. Sic febres siccæ & morbi sicci, qui in venis & arteriis versantur, quæ ex linguæ siccitate, totius corporis squalore, & sudoris absentia cognoscuntur. Quatenus etiam eius est duplex in corpore generatio. Fit enim alteratione, aut resolutione. Alteratione quidem alimenta, medicamenta, siue assumpta siue admota desiccant. Calor febrilis etiam ardens, ariditatem parit. Resolutione autem desiccant, quæcunque faciunt corpus plus resolui quàm nutriatur. Quorum alia sunt externa, vt nimia exercitatio, mora in sole, longa vigilia, &c. Alia in

na; vt calor febrilis ingens, calor natiuus debilis non potens præ debilitate coctionis ne minimum quidem eius quod consumptum est, restitaurare. Ad prognosim præterea vtile est scire, præ siccitate, primò laxari cutem & subsidere in spacia inania; quia primùm alimentarius succus ex sanguine & spiritu dissipatur. Facilius enim partes aeræ & tenuiores exhalant. Deinde tendi, indurescere, & contrahi, vt corium ad ignem, aut lignum exiccata medulla, torquetur. Hanc duritiem si perfrigeratio sequatur, funestum æstimatur per aph. *perfrigeratio cum duritie lethale*. Cuius rei talis est demonstratio. In humido primigenio est humor tanquam materia, anima tanquã forma, & calor tanquam instrumentum, vnde Gal. tribuit coctionem partibus solidis. Quo fundamento posito: Caloris extinctionem sequi necesse est, cui succedit refrigeratio, quæ restitui non potest. Cùm igitur in acutis mollior cutis & laxior apparet, postea verò tenditur & arescit, cum pallore defectu sanguinis, & frigore, resoluta calore, idq; perseverat; colliquationis & mortis proximæ certissimum est signum; etiamsi calor coniunctus sit: Is enim oritur à feruore humorum putrescentium, non à calore proprio ipsius partis siccæ, tensæ, & duræ. Item siccitas partium internarum vel externarum diuturnitate morbi contracta, minùs est periculosa; ardore autem igneo

igneo facta, lethalis. Siccitas gulæ & œsophagi à resolutione, & eius muscutorum ingenti exicatione (vnde deglutiendi potestas tollitur) putatur valdè lethalis ab Hippocr. multis in locis: Siccitas & durities in fronte inter signa exitiosa numeratur, ab Hippocr. in prognosticis. Tabescit enim facilè cutis frontis musculosa, vel veriùs musculus cutaceus, quia caro tenuis. Quod est signum perfectæ extenuationis, exhausto humido primigenio partium solidarum & non solùm disiectis spiritibus.

*De prognosi sensus grauitatis ac leuitatis totius
& partium corporis.*

C A P. XXIX.

Sensus leuitatis & grauitatis ad tactum quoque pertinet; à quibus duobus aliquid prognosis in morbis colligere licet. Ex leuitate quidem in bonam partem semper; ex grauitate in malam. Quemadmodum enim ex multo spiritu naturali, integra facultate animali, expeditum corpus redditur ad motum, & æger alacrior in assurgendo, & figuram decubitus mutando. Ita his exolutis, cum intemperie cerebri aut cordis, corpus proiectum, graue, torpidum, & quasi plumbeum iacet, lethali signo, & natura fatifcente. Grauitatis igitur duplex est causa; vna humoris multitudo & sarcina; altera facultatis

infirmetas & resolutio , vel interceptio , quæ membrum sursum mouere non potest. Sentitur autem grauitas in interioribus, sicut in exterioribus partibus. In illis dum cumulatur copia crudorum humorum , vt in his qui se cibis impleuerunt : aut dum sentitur viscus suspensum, vt vacuata aqua in hydrope, vel hepate in marasmo retorrido languente , aut vbi tumoris contenti pondus à tunica obuolvente quæ sensu prædita est percipitur. In externis verò partibus ab humorum copia, vt in plethoricis, vel cachochymicis; aut vitio facultatis retentricis. Grauiatur etiam totum corpus à feruente in venis sanguine, qui venas distendit, propter plenitudinem & vapores , in synochis febribus. Et quoad prognosim , grauitas si contingat incute morbo , oppressionem omnium virium significat , aut grauem intemperiem partium principum , & viscerum nobilium , quod exitiale est. Inde enim ægri fiunt graues & impotentes proiecto corpore , præsertim manibus & pedibus. Modò non sit causa in peculiari vitio musculosi generis.

De prog. duritiei & mollitiei totius & partium.

C A P. XXX.

Mollities & durities, quæ sunt etiam qualitates tactiles , humiditatis & siccitatis in corpore

corpore humano, sunt certissima signa. Quo enim membrum mollius est, eo esse humidius putat Gal. 1. de temperamentis; & quo durius eo siccus. Quod de sanis est intelligendum. In ægris enim mollities non semper significat mēbrorum humiditatem, quod in cachecticis & senibus est manifestum: in quibus quidem mollities tactu deprehenditur, propter copiam pituitosi alimenti, in poris membrorum contenti, à frigiditate morbida hepatis, aut ex senio, minore facta alimenti sanguificatione, tametsi partes solidæ exarescant. Quæ humiditas quemadmodum vitiosa est, & in malam semper partē accipitur: ita ea est laudabilis quæ æqualis per totum sparsa; in qua neque mordicatio neque scabrities vlla tactu percipitur, sed humidum blandumque exhalat. Sicut enim calor humido potentior exurit, & magis exardescit, quia humore non temperatur: ita humidum calore superius extinctionis & putrefactionis est causa. Durities pariter modum excedens, non solum tactum offendit, sed etiam à quacunque causa fiat semper in malam partem accipi solet: Siue à vehementi & violenta refrigeratione, siue ab exiccatione, siue à cōcretionē originem habeat. Durities in acutis morbis & febribus ardentibus ac colliquantibus, à resiccatione & tensione pendet. Calor enim febrilis attenuando, resoluendo, exurendo, exiccat, & indurat:

(vsta enim duriora) idem facit euacuatio manifesta, & latens colliquatio, modò peruenierit ad humidum primigenium partium solidarum. Cuius signum est tensio : sic in phrenitide, ingenti furore, cum tremore, cum voce clangosa, lingua conuulsa, durities perniciofa & lethalis habetur Hippocr. Et maximè si cutis in fronte tensa, dura, & scabra fit. Fit enim à resolutione spiritus, sanguinis & humidi primigenij: propter immoderatam eam, quæ in cerebro facta est, siccitatem & marcorem, vt antea dictum est. Hunc squalorem & siccitatem frigus sequitur necessariò, ab extinctione; quoniam caloris pabulum & vehiculum, humor est: igneus enim calor quicquid humoris est, absumit & conficit; vnde extremæ partes, quæ natura sicciore sunt, faciliùs & celerius resiccantur. Quemadmodum ergo corpus æqualiter molle, vtramque duritiei causam, vehementem nempe refrigerationem ab extinctione caloris, & partium solidarum extremarum siccitatem ab incendio febrili, abesse declarat: ita durities tensa, scabra & squalida, ac perseverans, prædictas causas præsupponit, & lethalis est. Huc pertinent quæ dicuntur de asperitate, quæ cum sit vehementis siccitatis effectus, à calore igneo omne humidum depascente, eandem habere creditur causam, quam durities prædicta.

De prog. à pruritu.

C A P. XXXI.

Sensum tactus deprauari in pruritu, constat ex eius definitione. Nihil enim aliud est quam molestus & tristis sensus, à nitrosis falsis vel mordacibus excrementis, in superficie factus. Gal. pruritus duplicem facit; vnum cum mediocri morfu, & sine dolore; alterum cum vehementi mordicatione & cum dolore: vnde colligimus varium esse humorē qui pruritus facit. Aliquādo enim crassus est, falsus, & nitrosus: & tunc squammas & vlcerationes, modò albiances si pituitosus sit, modò rubentes cum flauitie si biliosus, modò nigricantes si atrabilarius fuerit. Quod si humor qui ad cutem protruditur, tenuis admodum fuerit, sola cuticula attollitur, vnde sudamina vulgò dicta apparent. Fiunt autem pruriginosa corpora in scabie, psora, lepra, potissimum (vt ait Gal.) verno tempore; quoniam aëris calor verè subit vicem exercitationis, atque è profundo corporis humores euocans, ad cutem educit. Fit etiam pruritus in febre, interdum criticè & natura sese expurgante: Quod deprehenditur, si inde sequatur alleuatio & symptomatum remissio, & si alui excrementa pura, nec nimium biliosa videantur. Fit quoque pruriginosum corpus, in tabidis,

bidis, ab erodente sanie & corrupta, feruore cordis ebulliente, à centro ad cutim exhalante. Vbi vi adaucti morbi, & symptomaticè pruritus & pustulæ excitantur: quod prauum est vt signum & vt causa, maximè si cum vrinæ acrimonia perseueret. Significat enim copiosum ipsum humorem esse, & perennem eius generationem. Est etiam eiusmodi pruritus causa maioris atrophix, vigiliarum & febris. Præsertim si aluus supprimatur, per aph. *pruriginosa corpora post suppressam aluum in tabidis malum.*

De prog. sumptis à lesionibus actionum motricum,

P R A E F A T I O.

QVamuis motus dicatur aliquando lædi illaeso sensu: vna tamen & eadem est facultas, quæ & motum & sensum operatur, authore Gal. libr. de causis symptomatum. Quod putat accidere, quia minùs influit virtutis, quàm vt sufficiat ad mouendum, tantum abest vt valeat ad sentiendum. Læditur autem in vniuersum mouendi operatio multis affectionum generibus, quorum alij eandem omninò tollunt, alij minuunt, alij peruertunt, & deprauant. Eorum autem hæc sunt symptomata. Paralyfis, conuulsio, tremor, palpitatio, horror, rigor, singultus, tussis, ructus, sternutamentum, pandiculatio

latio, & oscitatio. Quæ omnia quatuor generibus motus deprauati comprehenduntur. Concussiuo scilicet, conuulsiuo, tremulo & palpitante. De quibus Gal. cap. 1. & 2. lib. 5. de causis symptomatum, horum motuum quædam sunt à causa morbi tantum, vt conuulsio, paralyfis, palpitatio. Quædam etsi sint symptomata, à facultate tamen aliqua earum, quibus corpus gubernatur, proficiscuntur; huiusmodi sunt rigor, horror, singultus, tussis. Propterea ex motibus iis alij sunt compositi ex voluntario & naturali, etsi vtuntur duplicibus instrumentis, vt videre est in ventris exoneratione, & in mictione: ille enim à fibris transuersis intestinorum, & à musculis abdominis fit; hic à fibris & musculo ceruicis: alij sunt merè voluntarij; vt respiratio, cuius nulla sunt instrumenta præter diaphragma & musculos alios respirationi dicatos: alij verò sunt merè naturales, à causa præter naturam excitati; vt rigor, horror, &c. De quibus motibus lege plura apud Gal. libro citato.

De prog. diminuta, vel abolita mouendi operationis.

C A P. XXXII.

MOuendi operatio diminutè læditur in stupore, abolitè in paralyfi: quæ quia secundum magis & minùs tantum differunt, quæ de vno dicuntur, de altero possunt intelligi.
stupor

stupor enim siue torpor parua paralyſis quædam eſt; cuius etiam aliquando eſt prænuntius: cum eo coniungitur gravitas: cuius cauſa duplex eſt, humoris nempe multitudo, ac facultatis infirmitas & reſolutio, vel interceptio; quæ ſuſum membrum attollere non poteſt. De ſtupore igitur ſic prædicendum, vt ſi dolor acutus ei ſuccedat, minùs periculofus putatur. Tunc enim fit humoris frigidi conſumptio, vigente bile, vt in phrenitide poſt lethargum. Stupor autem dolori acuto & calido affectui ſuccedens, lethalis eſt: teſtatur enim reſolutionem facultatis & caloris natiui extinctionem.

Paralyſis ſiue paraplegia, ab iſdem quibus ſtupor fit cauſis, grauioribus tamen: in ea enim pars motu omninò priuatur, ſiue neruorum ſubſtantia humore aliquo eluatur & molliatur, ſiue facultatis cōmeatus, in totum nerui ductū, ab aliqua cauſa obſtruente, impediatur. Quæri ſolet vtrūm paralyſis à bile fieri poſſit. Poſſe quidem experientia & ratio conuincunt: viſi enim ſunt ægri in paralyſim incidiſſe, effuſa bile in ſpinam doſſi & neruorum origines, ſub finem febrium intermittentium. Ratio in promptu eſt: quia bilis attenuat craſſos humores, quorū ipſa eſt vehiculum, facitque vt ad eaſdem origines craſſi ſucci facile influant. Non poſſe tamen, hæc ratio adfertur: nam propter acrimoniam humoris nerui vellicati, ipſam bilem priùs à ſe

à se excutiant, quam diutius morari & obstruere sinant. Ad prognosim est supponendum, paralysem nunquam in alios morbos transire, imò omnes alios frigidos in eam transmutari posse: Sequitur enim à debili apoplexia: in eam etiam transit colicus dolor: cum pituitæ morbum efficientis portio, ex capite distillans in nervos diuertit. Paralysis ergo morbus nunquam acutus, curabilis, vel incurabilis aut curatu difficilis est: Provt à variis causis pendet, diuersis ætatibus contingit, & pro symptomatibus quæ superueniunt. Nam quæ à nervi incisione oritur, incurabilis est; sicut quæ ex incisionibus transuersis spinalis medullæ, & quæ ex magna luxatione vertebræ, & quæ ab apostemate; postemate confirmato, quæ verò à gāgræna lethalis. Paralysis quæ non prorsus motū abstulit, quæ in vigēte adhuc ætate contingit, vbi membra diuturnitate temporis nō sunt extenuata, salutaris est. Hæc enim significat calorem adhuc in membrum peruenire, qui concoquat & assimilet. Sic membrum resolutum, si incipiat sentire, magnam salutis spem præbet: prius enim restituitur sensus quàm motus. Paralysis in ætate ingrauescente, sanationis exiguam præbet spem, in decrepita nullam. Paralysis cui superuenit febris aut tremor, curari potest; quæ verò à febre non soluitur, incurabilis est. Paralysis cui succedit apoplexia, incurabilis est. Paralysis in qua membrum vel

minuitur,

minuitur, aut eius color immutatur vix vnquā potest curari.

De prog. deprauata motus arbitrarij actionis.

C A P. XXXIII.

DEprauatur motus voluntarius conuulsione, epilepsia, tremore, pandiculatione & oscitatione: Fiunt enim beneficio musculorum. Non tamen vno & eodem modo in omnibus afficitur hoc genus motionis. Conuulsio enim habet vt plurimū dolorem comitem, quo carēt reliqui omnes motus. Conuulsio igitur (quæ definitur vt sit partium, quæ motu voluntario mouentur, ad suū principium, inuoluntaria & præter naturam contractio) vel permanens est & sine motu conspicuo; vt quæ ab humore nervos implente ac distendente fit; & quæ à siccitate contrahente, humido scilicet primigenio vel à calore resiccato, vel à frigore concreto: aut cum crebro motu & interrupto, à morsu & vellicatione partium nervosarum, aut violenta contensione, & labore, qualis conuulsio inter vomendum sæpe contingit.

Variè igitur est ex conuulsione præfagiendum, pro variis circumstantiis: vt ea sit minùs periculosa, quæ repentiè fit perfrigeratis nervis, vt in hæmorrhagia; quæ à repletionem & materiæ paucæ motu, vt in pueris (qui ob nervorum infirmitatem,

tatem, conuulsionibus facile corripuntur) si vires valent, & materia transferatur. Quæ fit per consensum, vt affecto vtero in hysteriis, ventriculo vellicato, acrimonia medicamenti, aut æruginosæ bilis, si aut vomitione, aut deiectione excludatur. Conuulsiones quæ in febribus fiunt, siue præcedant, siue sequantur, absolutè lethales dici non debent. Hæ enim (vt scribit Gal. commentario in sent. 14. 1. prorrh.) periculum quidem semper minantur, spem tamen salutis non adimunt. De præcedentibus extat aph. 26. lib. 2. *Satiùs est febrem superuenire conuulsioni, quàm conuulsionem febri.* De conuulsione quæ febri superuenit, est ille aphorismus in coacis: *Conuulsio in febre mota febrem soluit eadem die, aut certè altera, vel tertia.* & aphor. 57. lib. 4. *Spasmo aut tetano febris si accesserit, morbum soluit.* Conuulsio igitur cui superuenit febris, quia à repletionem fit, eadem curatur: tum quia superfluam digerit humiditatē: tum quia frigiditatem coquit. Quæ verò præcopia, aut in caput versa materia fit conuulsio, maligna est & periculosa. Lethalis tamē nondū est, nisi aliis grauib. casibus coniungatur; sed ea quæ ardore febris, siccatis neruis, aut immoderata vacuatione fit, mortalis omninò est. Quæ autem febri superuenit, si curari debet, à frigida materia crassa & viscida fieri conuenit. Quæ materia, violenta motionē quam facit conuulsio, concalefacta, tenuata, incisæque, partim

euaporatur & exhalat, partim sudoribus excluditur. Pari ratione, quartanæ rigor epilepsiæ medicina est: sicut febris conuulsionem aliquando soluit: ut enim motus, ita febrilis calor, commouet, tenuat, incidit & discutit.

De prog. epilepsia.

C A P. XXXIV.

Epilepsia symptoma est, quo non solum functiones animales internæ & sensibiles abolentur; sed etiam motrices omnino deprauantur. Siue quod infestat in cerebro localem habeat generationem, siue ab ore ventriculi, aut aliqua ignobili parte oriatur. Tot enim sunt epilepsiæ differentia, & quemadmodum apoplexia fit, cum humor vniuersam cerebri substantiam replet, aut ipsius cerebri & spinalis medullæ meatus intercipit; ita cum ventriculi eiusdem cerebri, à motu & qualitate humorum, aut à maligna qualitate commouentur, generatur epilepsia. Differt autem ea quæ per essentiam fit, ab ea quæ per consensum: quod in illa accessiones vehementiores sunt & diuturniores: in hac concidunt ægri sine vehemente conuulsione, & per interualla tantum, breuibûsque quibusdam motibus quatiuntur. Ex supradictis, iunctis his quæ epilepsiæ superuenire solent symptomatibus, licet prognosim colligere, ut ea sit periculosior,

loſior, quæ per eſſentiam fit, præſertim ſi fuerit inueterata. Ea enim commoriuntur ægri, niſi ſuperueniente febre quartana curetur: ex 6. epid. aut partu in prægnantibus, quo tamen antiqua non tollitur. Minimè periculofa eſt quæ ab ore ventriculi: ſicut quæ per conſenſum alterius partis efficitur, faciliùs curatur. Epilepſia, cuius paroxiſmi cum vehementi conuulſione ſunt, ſine interuallis, aut cum breuib, in qua longis motibus ægri concutiuntur, lethalis eſt. Epilepſia quæ magnitudinem, & malum morem oſtendit exitialis eſt. Sic reſpirationis difficultas, (quam ſublimem ſpiritum appellat Hippo.) Item ſtertor ſuperueniens vehementi paroxiſmo, & diu perſeueranti, à quo æger non releuatur. Item accidentia apoplectica periculofam epilepſiam oſtendunt. Tales enim epileptici ne in paroxiſmo moriantur, periculum eſt; & maximè, ſi ſternutamentis & aliis remediis nihil iuuentur, atque deterſa ſæpius ſpuma, redit. Epilepſiæ etiam magnitudinem oſtendit ſeminis deiection, ſtridor dentium, clamor, aurium tinnitus, atque finita acceſſione non recordari, nec factorum pudore moueri. Sicut paroxiſmi breuitas, accidentium paucitas, & ſupradictis contraria, facilem & ſalutarem declarant.

De prog. tremoris.

C A P. XXXV.

DEprauati quoque motus arbitrarij symptomata est tremor. Fit enim cùm inſita grauitate membrum delabitur, facultas verò imbecillior id nequit erigere nec robuſtè exporrigere. Tunc enim pugna quadam grauitati reſiſtit facultas, vt tantum in ſublime attollat membrũ quantũ id ſuo pondere deorſũ fertur. Vnde ſenes facile tremunt: tum quia virtute animali, & neruis infirmioribus præditi ſunt, tum quia habent corpus graue & terreum. Vna eſt igitur generalis cauſa tremoris. Facultatis nempe animalis imbecillitas, quæ grauitati membri liberè dominari non poteſt. Particulares autem multæ ſunt: vna eſt oppreſſio à multo humore, vt in his qui iniuſto onere opprimuntur. Secunda agitatio aut reſolutio, aut ex vniuerſo corpore ad cor, vel ad cerebrum, ſpirituũ reuocatio, qui ſpiritus membra erecta continebant, vt in iratis, timore perterritis, animo deficientibus. Tertia eſt intemperies partium neruoſarum, vt in vini nimio uſu marceſcentibus. Quarta eſt extinctio facultatis motricis. Confer ſupradicta diſtinctio multum ad prognofim, ſicut quæ à morbi temporibus ſumitur. Nam tremor in principio morbi, ab oppreſſione
cum

cum delirio, potest contingere. Ex quo tamen mortem pronuntiare certò non possumus, ut contingit ægroto primæ sectionis libri tertij epidemij, qui superstes euasit. Tremor autem qui superuenit morbis perniciosis & progressio iam morbo viribusque collapsis, mortem in propinquo denuntiat. Consequitur enim tunc hoc symptoma, ad solas & vehementissimas phrenitides. Phreniticis enim neruorum infirmitatem, propter affectionis siccitatem inesse, affirmat Gal. commentario ad sententiam 9. primi prorrhætica. Tremor omnis à causis externis, & à subita in affectibus animi spirituum collectione, minùs est periculosus. Qui verò à refrigeratione & intemperie partium neruosarum fit, sicut in senibus, incurabilis est, & ad mortem usque comitatur.

De prog. à pandiculatione & oscitatione.

CAP. XXXVI.

GAL. cap. 5. libr. 1. de symptomatum causis, pandiculationem & oscitationem numerat inter species motus deprauati: illa enim nihil aliud est, quàm alarum, brachiorum, & aliquando crurium extensio: hæc verò oris quasi coacta apertio. Vtriusque eadem est causa, eadem pars affecta: in utroque enim musculi quadam deliberatione dilatantur, ut flatibus crudis

exitum præbeant: fiunt enim propter flatum copiosos eleuatos ab humoribus pituitosis, vel à multitudine cibi ingesti replentis neruos & musculos, inducentis in eis lassitudinem quandam, siue laborem spontaneum extensiuum, quem membra neruosa sentiunt, sensatione quadam naturali. Concurrunt enim in hoc symptomate, naturalis facultas membrorum, compressione inutilia expellens, & animalis. Extenduntur igitur muscoli illi & mouentur, ut quod molestum est expellant. Quod contingit præcipue post quietem & somnum, præsertim in his qui habent crudos succos, & qui se cibis nimium impleuerunt, ut dictum est. Et quoad prognosim, pandiculatio & oscitatio, si præter consuetudinem multiplicentur, repletionem humoralem immediate significant, & febres putridas mediate. Vapores enim & flatus eleuantur à materia semicocta vel cruda & indigesta. Quæ nisi à calore naturali vincatur, sed putrescat, fiet antecedens & coniuncta causa febrium putridarum aut aliorum morborum, nisi præcaueatur necessariis euacuationibus.

De prog. à lassitudine.

C A P. XXXVII.

L Assitudo est etiam musculosi generis affectus: in ea enim graue pigrumque corpus, si commo

commoueat, sentit æger vel tensionem molestam, vel perinde ac si multis partibus compungeretur, aut configeretur, aut inflammaretur totum corpus, aut denique quasi confracta ossa haberet. Ex quibus colligimus lassitudinem esse triplicem, tensiuam nempe, à plenitudine; vlcerosam à cachochymia: & inflammatoriam, ab utroque: quæ lassitudines, si ab externa causa dependeant, ut à motu multo & vehementi, absolute & simpliciter tales dicuntur: si verò citra eam contingant, cum adiectione spontaneæ lassitudines appellantur, per aph. 5. li. 2. Habet aliquando lassitudo iunctam anxietatem. Quod significat tantam esse materiæ, vel quantitate, vel qualitate, vel utroque modo peccantis, copiam, cum virtutis imbecillitate, ut viscera opprimat, & in partes inter musculos & articulos ipsos redundet.

Est etiam horror cum lassitudine aliquando coniunctus, ita ut ægri cum vel minimum mouentur, vel si non moueantur quidem, quasi pungi, aut tendi, aut ossa dolere conquerantur. Quod à motu humorum, per sensibilia corpora proficisci, existimandum est, potius quam à fluctuosis, aut halituosis excrementis. Sequitur nonnunquam lassitudo ex rigore, quod fractas in pugna vires ostendit. Quibus præmissis de lassitudine ita prædicendum, ut ex ea in febribus laboriosis cum dolore capitis, lumborum, hy-

pochondrij, ceruicis, ab externa causa, vt motu, itinere, æstu, solet, nihil quod sit certum sumi possit. At si absque causa manifesta & externa, lassitudo & dolor prædictas partes prehenderit, prognosis ab his symptomatibus colligitur, quæ ostendunt humorum motum, & impetum in has vel in illas partes, nam materiæ redundantis copia, in plethora, aut cachochymia, diffuit in multas partes vel debiles, vel vicinas, vel nobiles, vbi calore febrili turgens, minùs reprimi potest. Omnium autem lassitudinum, vlcerosa paratissima est ad materiæ translationem in caput, propter bilem acrem, calidam, & tenuem.

De prog. ab anxietate & inquietudine.

C A P. XXXVIII.

PArtium mouentium, id est musculorum, anxietas seu inquietudo pariter est. Anxios vocat Gal. commentario in sententiam 44. secundi prorrheteos, qui nullam decubitus figuram facillè sustinent, eandemque sæpè mutant, quia præsens est semper molesta. Duplex est autem anxietas. Vna critica, quæ fit in ea perturbatione, quæ antecedit repentinam motionem, in qua ægri iactantur, sese erigunt, dilatant, & exæstuant grauiùs solito, crisi imminente. Altera symptomatica, eaque duplex: vel enim his contingit

tingit quibus est in ventriculo propria quædam humoris qualitas, & maximè in eius tunicis immersa, cum nausea, siue vomitu: vel excitatur vi & malignitate morbi, ab acri scilicet materia & maligna, æstu turgente, & feruente, circa præcordia; aut ab inflammatione insigni alicuius visceris, aut erysipellate, vnde febris affodes, aut denique ab infirmitate virium, quæ corporis onus, aut vim morbi amplius ferre non possunt. Ex quibus colligimus causam proximam anxietatis esse humorum & spirituum agitationem, quam facit vel motus criticus, vel affectus ventriculi cum nausea, vel æstus febrilis ad extimas vsque partes peruadens, vel denique ægri molities. His suppositis: prognosis ex anxietate facilis est collectio: vt ea non valdè mala sit quæ fit ob malè affectum ventriculi orificium, sicut nec illa quæ apparet in vigore crismus. Non enim perseverat, nec vi adaucti morbi commouetur, sed vomitu aut deiectione conquiescit. Nam, vt ait Gal. loco citato, interdum corporis extrema promptè refrigerantur, cum anxietate, non ob morbi malignitatem, sed ob malè affectû ventriculi os, ex intempestiua victus ratione, *ob longam inediam*, quæ ventrem humoribus acris replet, vel propter cibum intempestiuè exhibitum, quo grauatur vētriculus. Altera autem inquietudo quæ ad malignas febres sequitur, perniciosissima est, tantòque deterior, quanto ex-

tremorum aut totius corporis refrigeratio maior coniuncta est , de qua est aphorismus in coacis, *quæ cum refrigeratione anxietates incidunt, pessima.*

De prog. à decubitu & forma iacendi.

C A P. XXXIX.

QUemadmodum inquietudo , sic forma decubitus ad genus musculosum spectare dicitur. De quo decubitu agere consueverunt medici duobus modis: aut enim quærunt in genere quo situ tum ad suauitatem, tum ad coctionem dormiendum sit dormituro, aut quo modo iacentem ægrum deprehendi à medico oporteat, quo tempore eum inuisit. Ita vt talis decubitus, non ex composito, neque de industria factus videatur. Sunt autem decubitus tres figuræ, quas Hipp. describit primo prænotationū, & in coacis. Duæ extremæ prorsus absurdæ, & vitiosæ: vna in excessu, qua supra modum contrahuntur membra; altera in defectu, in qua proiciuntur & extenduntur: inter has, naturalis quædam, & beneualentium propria est, in mediocritate vehementis contractionis, & immodicæ projectionis artuum & spinæ. Quæ figura etiam non cogitantes cubare solemus, in qua tria concurrere debent: Decubitus nempe in alterum latus, erectum ac constans corpus, non

non prolapsum ad pedes, & moderata totius corporis reductio, id est, spinalis medullæ & quatuor artuum. Quæ figura decubitus, opinionem facit robustæ facultatis animalis, quæ corpus per musculos firmat, & qui ita decumbit, spiritum ducit ex facili. Cum igitur medicus cubantem ægrum deprehenderit tali figura, duo colliget: robur scilicet facultatis animalis & absentiam doloris in ventre, atque resolutionis vel conuulsionis in nervis. Et hæc est forma quam probat Hipp. eodem loco, & hoc aph. *Decubitus optimus est veluti qui sanis solitus fuit.* Reliquæ omnes species siue ad pedes sit declivius decubitus, siue in ventrem, siue supinus, siue inflexis supra modum & naturalem figuram articulis, aut nimium diductis, in malis habentur, quia aut virium fractarum & facultatis animalis resolutæ, aut conuulsionis & delirij sunt significationes. Prius quàm tamen medicus ex his præfagiat, de consuetudine debet interrogare. Nam si æger eo decubitu iacere solitus sit, qui nihilominus videatur absurdus, non protinus ut malum signum damnandum est, quoniam quodcunque consuetum est, vim morbi præsentis non sequitur, nec quicquam confert ad præfagium. Vnde Hippocrat. decubitum damnat in ventrem, cum distinctione, utrum nempe æger in secunda valetudine, ita decumbere consueverit, an non; & in summa est hoc hac de
re in

re in vniuersum concludendum, vt omnes motus aut decubitus absurdi, qui neque conuulsione, neque consuetudine, neque dolore, aut alia manifesta causa fiunt, ad delirium referri debeant.

De prog. ex somno præter naturam.

C A P. XL.

Quia somnus definitur vt sit animalis facultatis, quæ in sensu & motu posita est, beneficio musculorum, requies. Iure optimo inter affectus, quibus eiusdem facultatis operationes læduntur, numeratur. Cuius tres differentię inueniuntur apud Hipp. Naturalis videlicet, præter naturam, & criticus. Naturalis dicitur: cum calor natiuus per vigilias resiccatus, copiosam requirit humiditatem, & ideo in ventrem & viscera tanquam ad alimentum conuertitur.

Præter naturam, cum idem calor foras progredi non potest, vt in comatosi & lethargicis affectibus. Sicut per phrenitidem quasi inflammatus, foras mouetur immodicè. Prohibetur autem eo motu calor multis de causis. Interdum propter humiditatem multam eius partis in qua fit somnus: interdum ob solùm frigus, vt in vsu narticorum: nonnunquam ob vtrumque simul,

simul, vnde profundus somnus, & comatosus. Impeditur quarto ob virtutis imbecillitatem & extinctioni proximam, vt in moribundis, qui palpebras non possunt attollere: fit denique somnus turbulentus ac tenuis in quo ægri interdum clamant, & exiliunt ac perterrentur à tetrīs vaporibus, aut humore putri & bilioso, aut acri aliqua exhalatione.

Somnus criticus dicitur, vel qui signum criticum est, vt ante parotidas, vel qui crīsim optimam facit, aut indicat. Spiritus enim animales instaurat & colligit, calorem febrilem extinguit, moderatè humectando & refrigerando, natium auget, cerebri temperiem restituit, & humoris morbifici reliquias concoquit, & discutit. De quo extat aph. in coacis, *somni profundi neque turbulenti firmum iudicium significant*. Profundum intelligit longum somnum; à quo, quia nulla est obstructio quæ spirituum delationem, & liberum motum impediat, facile excitari ægri possunt. Quantum ad prognosim somni præter naturam attinet, nihil ex eo de morbi exitu certò potest pronuntiari. Nocet tamen ex euentu initio accessionum: eo enim tempore somnus calorem vniuersum, & humores, in intimos corporis recessus cogit; vnde materia cruda & vitiosa caput & ventriculi orificium replet, pauorēque mouet & laborem facit; facitque vt febres ægrè ad vigorem perueniāt, & adfert

& adfert diuturniora symptomata. Nihil tamen reformidandum significat, multò minùs mortem. Nocet præterea in inflammationibus internis, humoribus vnà cum sanguine in ventrem confluentibus, qui & affectum augent, & ob copiam mitigari non possunt. Prodest autem somnus & vtilis est in declinatione accessionũ, vel in remissione morbi.

De prog. ex vigiliis.

C A P. X L I.

PERTINENT quoque vigiliæ ad sensum & motum: sicut enim per soporem torpet totum corpus, & eius sensus & motus diminutè læduntur, ita per vigilias deprauantur. Est autem vigilia duplex, sicut & somnus. Vna naturalis, pendens ab effusione facultatis animalis ad exteriora, quæ effusio est secundùm naturam, cùm non excedit terminum suum. Altera præter naturam, in qua excedit illa effusio, diciturque vigilia superflua: cuius causa est cerebri intemperies calida sicca, & caloris natiui exiccati, & quasi inflammati, immoderata foras agitatio, atque vitiosæ exhalationis copia. Fiunt etiam vigiliæ vt plurimum à tristitia, vnde facies cadauerosa, & extenuatio totius corporis. Fiunt quoque vigiliæ febricitantibus, ante crìsim, quam significant futurã (si ante ea non fuerint) circa

circa statum contingentes, cum anxietudine repentè obortæ. Tunc sanè perturbationis criticæ signa sunt: non tamen speciem crisis ostendunt. Fiunt denique post crîsim, quam imperfectam fuisse significant, & recidiuæ signum sunt certissimum: ut enim nox quæ crîsim antecedit, molestior esse solet, ita quæ sequitur quietior & suauior, cum profundo somno esse debet. Indicant enim hæ vigilæ prauam cerebri intemperiem relictam, & acrem ex materia morbifica euaporationem. Quântum ad prognosim vigilæ perpetuæ, quia ab intemperie calida & sicca, & ab exhalatione acri ac biliosa originem ducunt, quia ex continuatione causæ quam fouet & augent, perseverant, phrenitidē prænuntiant, comitantur, & augent, biliosiore factō sanguine; atque conuulsionem à siccitate faciunt malis ægri rebus, per aph. 18. lib. 7. *Propter vigiliam conuulsio, aut desipientia, malum.*

Suntque tales vigilæ pessimæ, ut causæ & ut signa. Causæ enim sunt cruditatis, & resiccationis totius biliosi sanguinis, delirij & resolutionis virium. Signa verò sunt doloris, delirij & conuulsionis. Desinunt aliquando vigilæ in comata. Fiuntque ægri ex vigilibus comatosi, duabus de causis; aut resoluta bile & euaporata, quæ vigiliarum causa erat, manente, vel bilem superante pituitoso humore, qui humectat ac diluit cerebrum; aut resoluta calore nativo à febrili,

brili, & inde perfrigerato cerebro, quod est lethale accidit enim in febribus pessimis.

De prog. à palpitante motu.

C A P. XLII.

ET si palpitatio omnium membrorum, quæ distendi, & rursus in se sidere possunt, sit affectus, quia tamen partibus nervosis & musculosis plerumque contingit, de ea inter affectus qui motum musculorum depravant, agere visum est. Accedit quod propter similitudinem, quam habet cum tremore, inter morbos capitis numeratur à nonnullis. Est itaque palpitatio, motus præter naturam omnium partium (ut dictum est) quæ dilatari & constringi possunt, factus à flatulentis spiritibus inclusis, & exitum non habentibus. Generatur itaque motus palpitationis in musculis & nervosis partibus, quoties aliquis vapor in eorum spaciis occultis, aut manifestis, stabulatur, cui exitum quærenti, via occluditur. Cuius prognosis, loci distinctione, morborum quibus superuenit magnitudine, atque superuenientibus symptomatis, limitatur. Quæ enim palpitatio toti corpori fit, epilepsiam aut tetanum prænuntiat: illam si ad cerebrum, hunc verò si ad musculos anteriores & posteriores capitis materia feratur. Palpitant muscoli hypochondriorum sine periculo. Palpitant imæ præcor

præcordiorum sedes cum periculo delirij, præsertim si ab inflammatione magnæ arteriæ, iecoris, diaphragmatis, aut alicuius partis principis fiat. Palpitatio perseverans in facie, oris torturam minatur. Palpitatio perseverans in pectore, nuntiat vel epilepsiam, vel melancholiam per consensum. Palpitatio febribus acutis superueniens, quia ab acrimonia fuliginis febrilis, & in qua per alia symptomata caput affici appareat, metum adfert phrenitidis, aut convulsionis. Palpitatio quæ frequentius in morbis diuturnis fit, & aliquam earum partium quæ sunt circa umbilicum occupat, multam pituitæ excretionem cum egerendi conatu, ut in tenesmis, portendit.

De prog. à sternutatione.

C A P. XLIII.

EX quatuor generibus motus præter naturam, quibus ægri torqueri solent, restabat concussivus, cuius species sunt, sternutatio, tussis, singultus, vomitus, horror, rigor. Qui non musculorum quidem ope, sed sola natura impellente & laceffita, fieri dicuntur. Sternutatio igitur, quæ facultatis naturalis vigentis in cerebro opus est, definitur ut sit fortissima & sonora cerebri concussio, qua per vehementem fla-

G

tus expulsionem, ex pulmone & capite, expellere nititur quod molestum est, naribus, ossibus ethmoidibus, & parte cerebri anteriore. Causa autem irritans, vel externa, est, vt penna in nares immissa, radij solares, &c. vel interna, vt tenuis & acris humor in coriza & distillationibus, aut spiritus flatuosus in cerebro contentus, qui distentionem faciens, causa doloris est. Quam causam irritantem vt cerebrum à se depellat, geminam adhibet expirationem: vnā, quam per se facit per ossa ethmoidea; alteram per nares, neruis (vt ait Gal. in aph. § 1. lib. 7.) seu manibus prælongis in thoracem demissis, vtens, & spiritum vnico impetu ex pulmone & capite vehementer & confertim emittens: in quo conatu non solum quæ in cerebro continentur, sed etiam quæ in ventre & gula, singultus causa sunt, expelluntur. Atque in mulieribus grauidis, compressis & contentis musculis abdominis, foetus & secundinæ loco dimouentur. Quoad prognosim. Prodesse dicitur sternutationis motus, & obesse diuersis rationibus. Prodest quidem cocta & victa materia in caro, lethargo, ex Gal. libro de instrumento odoratus, in paralyti, paraplegia, epilepsia, comate. Tunc enim quia & mucosa excernuntur & spiritus flatuosi, coctionis argumenta nota sunt, & cerebri facultatem expultricem robustam esse demonstratur. Prodest etiam in febribus cocta materia,

materia,

materia, in partu difficili, in suppressione puer-
priorū, in hysterica affectione, &c. Nocet verò
in cephalalgia, cruda materia, capite, excremē-
tis pleno, & vrgente distillatione, in copia bi-
liosorum excrementorum: eo enim motu au-
gentur & perturbantur. Obest multum in om-
nibus pulmonum affectibus, siue præcedant si-
ue sequantur, eò quòd pulmones agitando, so-
lutionem continui in eis augeat: eos enim, vt
omnes alias partes quæ laborant, in quiete re-
tinere expedit. Sternutationem denique non
cieri in morbis capitis per erruia & acria medi-
camenta, lethale est: significat enim extinctio-
nem caloris in cerebro. Denique, sicut sternuta-
tio bona est procedente morbo, & post coctio-
nem in omni affectu, ita in principio mala: ca-
tarrhi enim futuri signum est.

De prog. rigoris.

C A P. XLIIII.

Rigor species motus concussivi definitur, vt
sit perfrigeratio dolorifica & confertim
facta cum inæquali concussione, & agitatione
totius corporis. Cuius subiectum est calor in-
natus: est enim rigor caloris innati affectus, qui
variā cum morbi materia pugnam iniens,
modò resilic intro, modò foras exilit: atque vi-

cissitudine motuum cōtrariorum & vehementiorum, totum corpus concutit. Calor autem qui hic læditur, est influens, pura quidem qualitas; læditurque vel secundum qualitatem à frigido in rigore, vel secundum substantiam & motum: quia aliquando accidit, vt per sanguinis & spirituum recursum ad interiora, suffocetur à copia, & priuetur altero motu qui fit intro foras. Fit autem rigor aut in sanis, aut in ægris; in sanis plethoricus dicitur; hisque fieri solet, qui se multis crassis & frigidis cibis impleuerūt; qui si à larga vini potatione contingat, nec ab eo recalescat æger; lethalis iudicatur: signum enim est, aut naturam suffocari, aut vias caloris & spirit⁹ intercipi, vt inde vita extinguatur. Sed initio huius de rigore discursus, notandum est nomine rigoris, horrorem etiam intelligi. Cum vtriusque sit vnum & idem subiectum, & vno ac eodem modo fiant, Differunt enim sola magis & minùs ratione: rigor enim à multa mordacique materia, cum violenta corporis concussionē fit; horror verò à pauciore & minùs mordaci, cum solius cutis miñiore agitatione. Vtriusque causa humor prauus, in venis calefactus, qui cū ad exclusionem festinat, per habitum corporis sensibilem, has motiones adfert. Sentitur autem frigus in rigore, quamuis sit à materia mordaci, tum quia rigor incipit potissimum à lumbis, per dorsum, quæ partes frigidae sunt;

sunt; tum quia reuocatione caloris cum sanguine & spiritu ad partes interiores, totum corpus alget. His suppositis, dicamus rigorem agrorum esse triplicem, periodicum nempe, criticum, & symptomaticum. Periodicus fit in his febribus, in quibus tempus intensiōis & remissionis distinctum cernitur (& hoc est quod periodum seu circuitum appellamus) quæ febres typicæ dicuntur; quarum cum sint plures species, habent quæque suum proprium & peculiarem rigorem. Rigent enim tertianæ cum sensu punctiōis, & magna cōcussione. Rigent quotidianæ cum minore & sine punctiōe, sed multo longiore rigore, nisi materia multum attenuetur. Rigor parvus est in quartanis, initio accessiōis, ut potius horror dicendus sit, cum perfrigeratione; in augmento horror magnus est cum magno dentium stridore, & magna concussione, musculosis membris à crassis vaporibus humoris melancholici irritatis. Commune est autem omnibus iis rigoribus, ut incipiant à partibus posticis. Primò quia (ut paulò ante dictum est) frigidiores sunt, & ideò in perfrigerationibus à rigore priùs frigus sentiunt, & ab eo magis cruciantur. Secundò quia partes sunt nervosæ, & sensus exquisitissimi. Tertio quia partes sunt densæ, ideò causam rigoris diutius retinentes. Rigores verò partibus anterioribus non incipere, in causa est earum caliditas, quam de-

monstrat earum raritas, sicut hæc ab hirsutis demonstratur: posticę enim omninò sunt glabrę.

Rigor criticus est qui in febribus tertianis, acutis, & continuis fieri solet diebus imparibus, & maximè die septimo; cuius hæc sunt signa: Primum est, omnium excretionum coctio manifesta & perfecta, die prænuntio apparens. Secundum crisis succedens die critico. Tertium est morbi species & mores eius sine malignitate. Quartum signum in doctrina Hippocratis maximè considerandum est, vrinarum retentio paulò ante crism; serosis scilicet humoribus aliò conuersis ad excretionem. Qui rigor, si hominem absolutè liberat, perfecta erit crisis, sin minus, sed tantum quodammodo ægrum leuat, imperfecta. Rigor symptomaticus est, qui nunquam vi naturæ, nec bonis ægri rebus fit, sed in perniciem eum semper inducit. Vi enim semper adaucti & maligni morbi efficitur. Quod symptoma sequitur, aut partis alicuius interioris inflammationem, quæ in suppuracionem abit; aut ad cacochymiam vasorum, quam natura tentat excludere, sed non potest. Estque hoc iudicatorium non iudicans, vel lethale: aut si inde æger remissius habet, morbum difficilis iudicij ostendit. Nocet autem hic rigor quatuor modis: Primum, vehementi concussione, corpus infirmum facit: Secundò, perfrigeratione (quæ est symptoma natiui caloris languentis)


actiones

actiones tum animi, tum corporis labefactat: Tertiò, quia materiæ intrò recurſu, & in nobiles partes translatione, varia & pernicioſa ſymptomata inuehit: Vnde in coacis animaduerſionibus numerantur rigores ſoporiferi, ſtupidi, cum ignorantia aut obliuione: Solet enim rigor qui citra euacuationem excitatur, vt plurimum materias ſecum ferre in caput: Quartò, quia nouo feruore concepto, febrem auget, ad hanc ſpeciem rigoris, referri poteſt ille, qui primæ inuaſionis dicitur. Solet enim in primo inſultu febrrium continuarum contingere. Horum omnium rigorum extant multi aphoriſmi apud Hippocr. Periodici quidem aph. 63. lib. 4. *Quibus febris certo die rigores repetūt, eodem febres ſoluuntur.*

Rigoris criſis perfectæ, aph. 58. lib. 4. *Si febre ardente laboranti rigor ſuperneniat, ſolutio fit.* Rigoris criſis imperfectæ, aph. 29. lib. 4. *Febricitantibus, ſi ſexto die rigores ſiant, iudicationem habent difficilem.*

Rigoris ſymptomatici, aph. eſt 46. lib. 4. *Si rigor febre non intermittente agrum iam debilem inuadat, mortiferum eſt.* Et hæc de læſionibus actionum facultatis animalis ſufficiant.

Finis lib. 1. Ad laudem Dei.



D E
PROGNOSTICIS
 QUÆ SUMVNTVR AB
 AFFECTIBVS VITALES
 actiones lædentibus.

LIBER SECUNDUS.

PRÆFATIO.



VITALIS facultas (cuius cor, primum viuens & vltimum moriens, principium est) per arteriarum substantiam ad omnes corporis partes influens, vitæ omnium functionum est conseruatricx.

Animali enim materiam, id est spiritum ad obeundas functiones necessarium, subministrat: naturali, calorem cum spiritu, cuius influxu singulæ partes recreantur, sicut sublunaris mundus solis præsentia. Ad hanc facultatem pertinet vis pulsifica & respirandi, quarum vnus & idem vsus esse creditur. Conseruatio
 nempe

nempe caloris natiui, & vitalis spiritus resectio. Alterantur etenim pulsus, & respiratio à similibus causis, similiter: animi perturbationibus scilicet, ut ira, inambulationibus, comestationibus; & in summa, quæcunque usum permutando, permutant respirationem, permutant & pulsum, & ad easdem differentias magnitudinis, celeritatis, crebritatis, aut contrariarum. Non videtur tamen tanta esse pulsus necessitas, quanta respirationis, cuius usu ne momento quidem vita carere potest; quod tamen de pulsu non verificatur. Nam si ligatis arteriis brachium priuetur pulsu, cor nullam noxam sentiet, brachium tardissimam: hanc difficultatem sic diluit Valesius, quanquam si duo motus eisdem usus præstent, non tamen eidem membro similiter præstare certum est: quod enim respiratio præstat cordi soli, hoc pulsus præstat omnibus membris reliquis; quæ ut minori calore indigent, ita tardius læduntur. Sunt itaque huius facultatis duo potissima munera, pulsus scilicet & respiratio; quorum utrumque cordis constitutionem testatur, sed pulsus magis: cuius operatio diminutè, abolitè & deprauatè læditur. Diminuitur quidem & perit in animi deliquiis, in syncope, & in pluribus cardiacis affectibus, siue per primariam affectionem cor lædatur, siue per consensum. Deprauatur in omnibus inflammationibus pulmonum & partium

De prog. à syncope.

C A P. I.

DIminutè igitur læditur vis pulsifica in li-
 pothymia seu animi deliquio, abolitè in
 syncope. Differunt enim tantum secundum
 magis & minus. Contingit namque illa leui de
 causa etiam in sanguinis missione, in qua ani-
 malis facultas tantum deiicitur, & vis pulsifica
 diminuitur. Syncope autem fit ex causa grauif-
 sima, in qua non solum pulsus extremè rarus &
 obscurus est, & sæpiùs nullus: sed etiam sentiēs,
 & mouens facultates ferè destruuntur. Defini-
 tur enim præceps virium lapsus, in quo imæ
 partes frigent, tempora, ceruix, & thorax, frigi-
 do sudore madent, facies pallet, totumque cor-
 pus quasi enervatum iacet, mens omnisque sen-
 sus deficit. Est autem syncope cordis affectus,
 siue in consortium mali celeriter adducatur af-
 fecto ventriculi ore, in syncope stomachica; aut
 vtero laborante, in præfocatione vteri; siue per
 primariam ipsius affectionem laboret; vt cum
 vulneratur, aut humore intra pericardium con-
 tento mouetur, aut cum inflammari incipit. Ex
 quibus colligimus syncopem esse duplicem,
 cuius causa proxima & immediata consistit in
 impe

impedimento affluxus sanguinis, spiritus, & caloris è corde, in vniuersum corporis habitum: cuius impedimenti quatuor assignantur causæ: Prima est obstructio vasorum: Secunda, sanguinis, spiritus & caloris paucitas: Tertia est eiusdem sanguinis, caloris & spiritus reuocatio ad cor, vnde suffocantur interdum, & intereunt ægri, vt de quibusdam legimus apud Aulium Gellium: Quarta causa est impuritas seu mixtio alienæ materiæ, spiritui & calori natiuo contrariæ: quæ vel extrinsecus aduenit, vt in tempestate pestifera, per aerem in propria substantia corruptum, aut tetra exhalatione infectum, aut etiam ab his quæ in corpore existunt contra naturam, vt assumpto veneno, ab aura venenata & corrupto semine, in mulieribus viduis, hystericis. His suppositis prognosis erit talis, vt à deliquio animi, quia à leuiori causa fit, facile resurgant ægri: à syncope verò, quia à grauiori (est enim sæpius malignorum morborum symptoma) difficile, imo vt plurimum lethalis est æstimanda. Et eò magis quò plures sequentium circumstantiarum habuerit, nempe si difficulter releuetur æger, & cum redierit ad se, pulsu careat, aut exiguum, aut vix apparentem habeat; si color viuidus non redeat; si frigeant membra vehementer, & calor non reuocetur; si syncopem antecedant crebra animi deliquia, dum lecto assurgit æger, dum caput attollere nititur;

Si sen

si sensus hebetentur; si crebrò cum palpitatione accidat syncòpe; si denique sæpè, vehementer & sine causa manifesta, fiat. Qui enim ita exanimantur derepentè moriuntur, per aph. 41. 2. *Qui sæpè & vehementer sine causa manifesta animo, linquuntur, derepentè moriuntur.* Exitiosa etiam syncope æstimatur, quæ corpore crudis succis referto, & primaria cordis affectione, generatur; sicut salubrior est quæ per consensum.

De prog. palpitationis seu tremoris cordis.

C A P. I I.

QUæ de palpitatione in primo libro scripsimus, sunt generalia: quæ hic de ea dicuntur ad eam quæ cordi accidit tantum pertinet, quæ nihil aliud est quam symptoma motus deprauati pulsatilis cordis. Vel est motus cordis ipsius (quem cardiogmmum verum appellant) similis palpitationi. Differt enim motus palpitationis à pulsatili. Cum alius sit affectus in quo pulsus cordis redditur tantum celerior, vel tardior moderato, alius per quem totum viscus tremulè concutitur; conatur namque eo motu expellere quod noxium est. Siue sit aura venenata, aut teter vapor opprimens, siue aquæ magna copia in pericardio collecta, quæ, cor ipsum ne moueatur impediens, palpitationem mouet: siue cordis intemperies aliqua, vel obstructio, & spiri

& spirituum interceptio, vel paucitas. Ex quibus causis viribus insigniter deiectis syncope, atque etiam mors interdum sequi consuevit. Accidit etiam quandoque palpitatio eiusmodi per se, sine alio manifesto accidente, per sanguinis feruorem. Qualis sæpè conspicitur adolescentibus & adultis. Cuius singulare remedium est sanguinis missio, cum victu attenuante ut testatur Gal. cap. 1. libr. 5. de locis affectis. Et quoad prog. certum est palpitationem quæ sequitur oris ventriculi imbecillitatem, vel eius nimis exquisitum sensum, potiùs quàm causæ ipsius magnitudinem, minùs periculi habere. Ea verò quæ primigenio cordis affectu facta est, nulla causa manifesta externa aut interna præexistente cognita, valde perniciofa iudicanda, tum aliàs, tum in febribus ab intemperie, vel ab inflammatione, vel erysipelate: cordis enim solutiones, inflammationes, intemperies malignæ, citissimè hominem de medio tollunt.

De prog. deprauata actionis pulsificæ per febres.

C A P. III.

DEprauatè læditur vis pulsifica, aucta potissimùm pulsandi necessitate, quod nullo magis affectu fieri consuevit, quàm in febribus. Quarum cum sint multa genera, de earum prognosticis

gnosticis hoc loco duntaxat agemus, quæ in præfagiendo sagaciorum medicum requirunt, cuiusmodi sunt febres vertiginosæ, singultuosæ, colliquantes, comatodes, diaphoreticæ, erraticæ, malignæ, syncopales, tiphodes, tritæphicæ, affodes, nocturnæ; de quarum præfagiis nonnulla hoc loco scribere decreuimus. Si prius quasdam regulas posuerimus, quibus febris natura & motus quæ præcipuam vim habent in præfagiendo) significatur. Primùm enim consideranda est morbi species, num scilicet febris biliosa sit, pituitosa, atrabilaris, vel mixta, additis tempore anni, ætate, temperatura, & similibus. Secundò accessionum circuitus, an paribus vel imparibus redeant, an eodem tempore progrediantur, ut in synochis. Nam exacerbationum anticipatio, aucta vehementia, & celer motus qui fit in diebus imparibus, breui futuram crisin prænuntiant: sin lentè moueatur morbus, eadem mora recrudescat, & singulis diebus, diuturnus futurus est. Tertiò coctiones & coctionum mutationes diebus iudicibus; ut quarto: quæ enim in meliùs mutantur, sequentibus diebus criticis, hominem liberatum iri denuntiant, & contrà. Quartò considerandum num febris sit primigenia in humoribus, an symptomatrica, partis alicuius principis phlegmone obsessæ, aut corruptæ; quod hæc sæpiùs interficiat, tametsi lenta aut sine yllo graui symptomate

promate videatur. Hoc etiam prænosendum est in febribus continuis, periculum imminere ab inflammatione, aut maligna putredine, aut materiæ in nobiles partes translatione, quæ alioqui extra venas à partibus nobilibus reicitur facilè, natura scilicet valida & recreata per intermissionem accessione ipsa multo longiorè.

De prog. febris vertiginosa.

C A P. IIII.

Vertigineum hoc loco consideramus quatenus est symptoma febribus superueniens, de quo prælagendum est adhibita distinctione. Vel enim vertigo in febribus diutius permanet, atque per totum morbum simul cum febre ipsa ægrum exercet: vel initio, morbo mihi existente, & sine vertiginis vlla molestia: aduentante autem crisi, & circa eam, dum magna fit in corpore perturbatio, aduenit. Priorè modo vertigo, si ab oppressione ventriculi ortum non habet, sed vel in capite localem habet generationem, vel in venoso genere, bile fermentante pituitam, vel in aluo aut pulmone, lethalis putatur ab Hipp. præsertim si cum ileo ægrum cruciet, per aph. *febres vertiginosæ cum ileo & sine ileo lethales*. Posteriorè modo, febris vertiginosa medium tenet inter morbos planè mortificos

tiferos & salutare: nam omnis spiritus flatuosi generatio, turbationem indicat, cum tumultuosis symptomatis, à materiæ contumacia, & caloris natiui media quadam affectione, inter summum langorem & robur. Humores enim dissoluere, & quodammodo liquare potest, resoluerè minimè. Quod morborum genus, initio lene, circa crìsim vehementem turbationem in corpore facit, eamque periculosam, ancipitem & lubricam, per se tamen lethale non est ab initio. Fiunt enim vertigines, & alia symptomata, cùm natura nec vincit, nec vincitur: sed tandem iudicationes absoluntur, aliæ ad salutem, aliæ ad mortem. Vtrum autè horum venturum sit, ostendunt alia signa, vt urinæ, &c.

De prog. febris singultuosa.

C A P. V.

FEbres non dicuntur singultuosæ, ab omni singultu, sed ab eo tantum, qui diutius permanet, vel etiam per totum morbum, simul cum febre ingrauescit, nec quicquam remittit: eo enim modo verè febris singultuosa appellatur. Singultus autem ille qui fit vel oppleto ventriculo & oppresso, aut eius orificio qualitate cōmorso, vt à pipere ingesto. Qui sicut sine febre excitatur, ita facile soluitur. Febris verò singultuosa,

tuosa, quæ causam habet inflammationem hepatis, lethalis est, per aph. 17. libr. 7. *propter iecoris inflammationem singultus malum*, præsertim quæ magna est & maligna, vt Gal. interpretatur in comment.

De prog. febris comatodes.

C A P. VI.

Febres à symptomate comatodes appellatæ, ex genere semitertianarum & intermittentium sunt, sicut & continuarum. In illarum accessionibus, soporosus aliquis affectus incidere solet, non quidem simpliciter malus, sed per accidens noxius. In acutis autem febribus ac morbis calidis & siccis, vt phrenitide, febre ardente, nisi salutaribus signis prius apparentibus sub iudicium incidat (qualis est sopor prius quam parotides exurgunt) exitialis est. Perfrigerati enim cerebri & vitiosis vaporibus pleni ac caloris nativi extinctionis est signum.

De prog. febris colliquantis & diaphoreticæ.

C A P. VII.

Febres colliquantæ & diaphoreticæ dicuntur in quibus non modò spiritus & humores, sed etiam carnosæ animalium partes absu-

H

muntur, humidum primigenium intra primum quaternarium exsiccat; in qua febris hæc tria concurrunt: infirmitas facultatis retentricis totius habitus corporis: humores biliosi, tenues & acres: & febrilis calor, qui ignis instar obuia quæque depascitur. Nam propter infirmitatem illam, semper aliquid extra cutem vacuatur, quod propter paruitatem, oculis cerni non potest, effluētibus nimirum tenuibus humoribus: febris autem tenuissimos humores magis absumit, crassos verò extenuat, adeò ut nulla mora vacuationi interponatur. Quemadmodum fieri solet ab immodicis vacuationibus, sensu deprehensis: tales sunt febres prædictæ colliquantes, & diaphoreticæ, quandam pestilentem naturam habentes. In qua colliquatione ita resolvitur corpus, ut facies illa cadauerosa Hippocraticè sæpè euadat, & squalescat, squabrescatq; corpus, ac si in marasmodem inciderit, omninò funestum & lethalem.

De prog. febrium malignarum.

C A P. VIII.

Febres malignæ dicuntur Hippocrati illæ, quæ malè moratæ sunt, & maleficæ, quibus sæua & horrenda symptomata contingunt, malignæ sunt etiam, in quibus ægri fallaciter & insidiosè

fidiosè laborant , cùm tamen moderatè habere videantur : tales sunt quibus humor deleterius & veneno similis generatur , per corruptionem propriæ substantiæ , aut malignus per adustionem bilis vel sanguinis : cuius excretionem natura non aggreditur , donec copia aut malignitate aucta , grauiùs sæuientem , huc atque illuc exturbare cogatur , vnde subitò lethalia signa eduntur, etiam his qui antè sani putabantur, vt docet Gal.com.in sent. 17.2. prorrh. huius generis febrium sunt etiam in quibus ex antecedente morbo, aut latente obstructione, vel putredine , vel visceris interioris corruptela , humor prauus, & sanguis corruptus in præcordiis exaggeratur. Quam corruptelam natura valens & robusta, quandiu potest sustinet, aut in pãcreas, aut in mesenterium corporis veluti sentinam, deponit; vbi tractu temporis putrescens, tãdem febrem lenem initio excitat, sine statis periodis, quæ medicos plerumque fallit: quorum opinione celerius de medio tollitur æger , vt mortem quàm periculum citius deprehendant. Nam oborto leui dolore lumborum, aut ventris cum horrore inconstante, modò subito venter intumescit , modò nigra vomitione redduntur , aut per aluum subeunt: quod à medicis in operibus artis exercitatissimis plerumque obseruatum est. Tales sunt quoque febres quæ diebus criticis , naturæ certantis nullum signum exhibent,

quòd extinctioni proxima sit aut maximè infirma. Tales etiam sunt in quibus biliosi humoris & crudi crassique succi species miscentur, quibus semitertianæ (pessimum morbi genus) superuenire solent, & ardentes quædam, à crudo succo, qui in progressu temporis, acrimoniam & malignam putredinem acquirit. Incunte enim morbo, quia bilis feruor pituitæ permixtione mitescit acrimoniæque retunditur, aut putredo nondum magna est, moderata omnia apparent: accedente autem incremento, aut circa statum, vehemètia morbi & symptomatū nec opinatò præripiuntur ægri, facta in venoso genere fermentatione à calore præter naturam. Huius generis sunt febres pestilentes, quas describit Gal. 6. epid. in quibus extremum corpus tangenti neque valde calidum apparebat, neque pallidum, sed subrubrum, liuidum, phlictenis paruis & vlceribus efflorescens, interna vrebantur: ita ut neque valdè tenues vestes, neque linteorum iniectiones, neque aliud quippiam vel nudi tolerarent. Tale denique est genus febris quod describit Hipp. in coacis prænotionibus, in quo initio urinx tenues conspiciuntur, cum vertigine & pulsatione arteriarum in temporibus, quæ circa febris statum & incrementū repentè tanquam è latibulis insurgit, cum turbulentis ac periculosis symptomatis: quorum motus atque impetus, quò pertineant non facile

facile intelligi potest. Prædictarum igitur febrium quia aliæ aliis sunt sæuiiores, vehementiores & maligniores: idèd quædam sunt mediæ inter salutare & perniciosas, aliarum verò certa est mortis prænotio.

De prog.feb.æstuosarum quas Hipp.affodes appellat.

C A P. IX.

A Estuosæ & implacidæ febres dicuntur, in quibus ægri grauiter afficiuntur, somno turbulento, qui laborem facit, cruciantur, in quo somno ægri inter dormiendum absurda loquuntur, exclamant, & somno excitati deterius habent. Tales enim ægri, vt ait Gal. in primo prorrh. sententia quarta, inchoata mentis læsione, turbantur & iam delirio proximi sunt. Hæc autem turbulentia & agitatio, siue ex concepto in venis maioribus incendio atque interna inflammatione indèque fuligine turbulentus somnus excitetur; siue humore partim acri, partim crudo, cerebrū imbuente, cum iactatione & febre acuta fiat; pessimū est, vt causa potissimū, quia varia illa corporis iactatio vires celeriter deiicit: Somnus verò materiam, cuius malignitatem frangere domarèque non potest, intrò impellit, quæ cruda & vitiosa caput replet & metum conuulsionis adfert; his potissimū quibus neruosum genus infirmum est, & alius

adstricta, aut suppressa insignis euacuatio. In quibus scilicet ad causæ efficientis perseverantiam & efficaciam, accedit patientis dispositio. Quorum duorum alterutro deficiente, vix sequitur operatio.

De prog. febris semitertianæ & tritaëphiæ.

C A P. X.

EX omnibus febrium generibus, nullum est magis infensum, & medico non auaro exosum, quàm ea quæ est de genere tertianarû, sine intermissione torquentium. Quarum duæ sunt differentiæ, aliæ semitertianæ dicuntur, Græcis hemitritæi, ex continua, quotidiana & tertiana intermittente mixtis, & variis locis variôque motu putrentibus pituita & bile, cum accessione & horroris ingeminatione, secundo die aut longioribus intervalis, per reduplicationem, aut brevioribus, per inæqualem incrementi motum. Aliæ huius generis febres sunt tritaëphiæ, quæ & ipsæ continuæ sunt, leuem tamen habent remissionem, die posteriore, ex qua mox violentiùs recrudescent, in tertianæ modum, cum horrore, vel sine horrore. Et hæ neque sunt continuæ tertianæ, quia leuem habent remissionem, & interdum cum horrore exacerbationem; neque semitertianæ, quòd neque habeant reduplicationem horroris, neque accessio

accessionem secundo die ; non sunt etiam extensæ tertianæ , quia non desinunt in integritatem. Hæ febres habent ortum à crudis pituitosisque succis putrescentibus , admixta his flauabile, vnde rigores erratici, non in singulis accessionibus , sed interdum , & parui horrores qui non perpetuò cum accessionibus inuadunt , ex variorum succorum putredine & motu. Nam bilis quidem calidior , febrem acutam celerius accendit, quia celerius putrescit: & mouetur: interea crudus humor & frigidior , tum corrumpitur, tum putrescit, vnde fit vt remissa bilis putredine & motu, recrudescat febris; ex facta veluti requie & remissione, altera adueniente materia; qua putrescente, quæ prior inuasit, iterum recrudescit , & ita succedit accessio deterior priore , quòd vires iam priore fractas offendar, nec vllum reficiendis viribus tempus nature relinquatur. Sunt autem eiusmodi febres continuæ, acutæ , & malignæ , tum specie ac propria natura , tum grauium symptomatum accessione: continuæ quidem, quia ex bilis & pituitæ vicissim facta putredine constant ; ac dum prior febris remittitur, posterior recrudescit, vt naturæ nihil quietis relinquatur : acutæ verò ob bilem calidiorem : malignæ denique, quòd, vt ait Gal. primo epid parum remitti, & ex leui remissione celeriter & vehementius exacerbari, maligni morbi sit indicatiũ , ad quam malignitatem

fit accessio pro ratione partis, pro qualitate materiæ, & vario illius motu, variâque corruptione, ex quibus colligimus has febres acutas esse, & plurimum lethales.

De prog. feb. autumnalium & erraticarum.

C A P. XI.

QUemadmodum alix temporum constitutiones sunt quorundam morborum effectrices & conseruatrices: ita & autumnus; sed multò deteriore conditione, ut vulgo pestilens, medicis morbiferax dicatur. Officit autumnus iniuria multiplici. Prima est, inæqualitas & repentina caloris & frigoris in aere mutatio: habet enim ab æstate siccitatem cum quodam calore, cuius est extremum; ab hyeme ad quam se applicat, frigiditatem cum quodam humore: facit itaque illa inæqualitas, ut calor natiuus æstate penè dissolutus, variè agitetur intro, foras, & contra, indèque se ipso imbecillior fiat. Secunda autumnus incommoditas est, bilis retorrida, æstate aceruata, frigore intus cohibitio. Tertia est, dietæ vitium & vsus fructuum: vnde cruditatis multus prouentus, quæ cum putredinem à prohibita transpiratione acquisiuerit, alui fluxus, febres varias, erraticas & autumnales, quales etiam hyeme nasci solent, generant. Quare
ut tri

vt tribus prædictis modis est noxius autumnus, ita morbi tripliciter difficiles sub eo existunt; primùm specie, quia atrabilarij; deinde virium infirmitate, quæ humoribus dominari non possunt; tertio transpirationis suppressione, & maligna putredine. Febres autem quæ vt plurimum autumnò vigere solent, sunt quæ tertianæ naturam referunt: quæ, quia sæpiùs omnem rationem formæ & circuitus febrium perturbant; vt modò tertio quoque die, modò quarto, interdum quotidie, nullo ordine inuadant, erraticæ appellantur: quarum sunt duo genera; vnũ, earum quæ ex congerie succorum diuersi generis in corpore putrentium ortum habent; alterum, earum quæ aliis succedunt febribus, vt continuis, ardentibus, aut semitertianis. Vtroque modo febres plurimæ, quæ vigent autumnò, vt semitertianæ, primò in erraticas, deinde in longas & difficiles quartanas mutantur, aut in accessiones paribus diebus degenerant. Quod in morbis acutis & perniciosis, mortis: & in mitioribus, diuturnitatis signum est certissimum.

Febres igitur erraticæ, de his quæ primùm intermittunt factæ, malum significant dupliciter, cum difficultate iudicij: primùm quia putredo diuersa in diuersis significatur, & per consequens opus coctionis operosius, quæ succorum æquationem molitur: deinde quia naturæ vis labefactatur. Cùm enim imparibus mouere soleat die-

bus, si ad pares recidat exacerbatio, præcipitan-
tis iam & debilitatæ naturæ, argumentum est:
perturbat enim naturæ ordinem, materia mor-
bi, vel copia, vel praua qualitate, vt diuina illa
vis quæ ordine omnia facit, anticipare cogatur,
nec ampliùs eodem temporis tractu eodémque
circuitu excrementa aggredi & expellere pos-
sit. Sunt enim parium dierum motus intempe-
stiui, & ex axiomatico physico, omne intempesti-
uum præter naturam est. Quòd si de continuis
quæ in intermittentes desuerint, fiant erraticæ
febres, in quartanas degenerare solent; quod
quàm sit difficile ex natura quartanæ intelli-
gitur, quæ autumnò incipit, & fractis ex diuturni-
tate morbi viribus succedit.

De prog.feb.nocturnarum & diurnarum.

C A P. XII.

A Vicennas post Hipp. & Galenum, pitui-
tosis febribus annumerant diurnam &
nocturnam, iure optimo. Hi enim autores cum
secunda, tertia, quarta & quinta sententiis lib. 3.
epid. egissent de reliquis febribus humoralibus,
solas pituitosas reliquisse videbantur. De his
igitur sententia sexta eiusdem libri scribentes,
sub nomine nocturnarum & diurnarum, easdem
intelligunt: cò-maximè, quia non eas separant
per

per certam periodum , sed per diem & noctem. Et quod ad prognosim attinet , cùm putentur quotidianæ non vacare periculo , periculosiorẽ existimat Hipp. diurnam cùm dixit : *Nocturna non admodum lethalis, diurna longior, sunt quibus ad tabem vergat.* Periculosiorem, inquam, vt signum & vt causa : vt signum quidem, quoniam malignitas humorum ostenditur; quia tenuatione & raritate , quam dies inducit , meliorari non potuit, nec ab insultu impediri; adde quod improporcionale est pituitæ , die incipiente inuadere, sed ad noctem , & improporcionabilia omnia mala sunt : vt causa autem , quoniam in diurna febre, noctu non in accessione cibandum est, & à cibo vigilandum. Quare diutiùs durat morbus , & non rarò in tabem præ longitudine facescit. Addit Auicénas, & quia diei calor febrili paroxysmo incommodat , frigus verò noctis tempori cessationis & interualli. Et hæc de deprauata pulsatione à febribus sufficiant.

De prog. læsionis respirationis, & primò ab angina.

C A P. XIII.

NVllus est affectus à quo respiratio magis deprauatè lædatur, cum febre acuta & non sine virtutis pulsificæ læsione, quàm ab angina vera : quæ cùm à phlegmone propriorum
m uscu

musculorum laringis pendeat, duobus tantum signis pathognomonicis demonstratur, & ab aliis morbis separatur, nimirum difficultate spirandi, nullo existente vel in thorace, vel in pulmone vitio, & angustiae sensus in gutture, cum dolore: ita ut in hac anginae specie, tria hæc simul conspirent, febris acuta, repentina strangulatio, & dolor in faucibus. Sed ut de angina certius præsagium colligatur, notanda est eius trimembris differentia apud Hipp. & Gal. lib. 4. de dicta à loco affecto. Prima est, cum humor tenuissimus atque acerrimus fauces prætergressus, in venulas duodecim musculorum laryngis delabatur, facitque anginae speciem perniciosissimam, cum prædictis symptomatibus, nullo tamen tumore apparente in faucibus, quæ vel eodem die, vel secundo, vel tertio, aut ad summum quarto strangulat & necat. Altera est, cum humor crassior in tenues gutturis venulas permeare non potest, in maioribus ad fauces cohibetur; facitque hanc anginae speciem, in qua hianti ore, tumor cum rubore in faucibus apparet: quæ angina periculosa quidem est & dolorifica, superiore tamen longè mitior ac diuturnior. Tertia est, in qua fauces & cervicis musculi ad latera œsophagi positi extrinsecus, intumuerunt, omnium tutissima & mitissima: in ea enim minor est angustia, & liberior spiratio, dolor remissior & curatio facilior, translata in partes

tes exteriores materia. De qua extat aph. in coacis, *quibus & fauces & ceruix rubent similiter, petus quoque, longior morbus est, & præcipuè ex iis seruantur, si quidem rubor non recurrat intro.* Prætermittito quartam anginæ speciem à luxatione vertebrarum ceruicis; tum quia rarò contingit, & Gal. rarò eius meminit; tum quia in ea gutturis musculi simul inflammantur, vt in prima specie. Quibus præmissis, in angina prognosis instituitur in genere & in specie. In genere quidem, cùm omnis angina morbus sit acutus, vt ea liberetur æger, coctionis signa statim apparere oportet, nimirum primo die, si celeriter morbus ad statum fertur, & quartò iudicari debet: aut secundo, aut tertio, vel ad summum quarto, si ad septimum progressurus sit. Sic omnis angina, quæ sine signis coctionis, sine materiæ excretionē, aut resolutione, vel à natura, vel à medico facta, & in summa absque ratione, aut cum prauis signis desiisse videtur, lethalis est, aut saltem infida, per sent. 17. 2. prorrh. Pernitiosa sine signis leuantia, mortem indicant. *Sic dolores sine causa manifestæ soluti, pernitiosi sunt in angina.* In angina quidem quia grauis affectus est: at in leuiore doloris occultatio, per materiæ trāslationem in nobiliorem partem, vt in caput, non semper est lethalis. Natura enim robustior facta, humoris ferociam interdum comprimit, ac per hæmorrhagiam, parotidas, aut alium abscessum, vel

vel excretionem sese exonerat. Sic ex anginae tumore ante ea conspicuo, & sine sanguinis missione, aut ex prædictis modis aliquo subside, symptomaticam fieri humoris permutationem prænuntiamus: in thoracem quidem & in pulmonem, si dolor grauis cum tussi & difficili spiratione superueniat: ad ventriculum, si nausea: ad vitæ principium, si cordis tremor, cum virium langore & animi deliquio: ad nervosas partes, si conuulsiva respiratioprehendat: si in aluum, tumorem in hypochondriis concitat, intestina vellicat, atque interdum saniosas aut purulentas deiectiones producit: nonnunquam abscessus ad vrinas, stranguriosi appellati, efficiuntur. Sunt autem eiusmodi translationes eò periculosiores, quò ad partes præstantiores feruntur: at si in caput fiat lethalis est, per aph. *In angina sine signis in caput dolores versi cum febre lethale.* Quod verum est, si fiat metastasis sine crisis significatione: si fiat manente priore foco, cum gutturis angustia, & difficili respiratione. Vnde colligimus morbo maligniore facto, materiam acrem & malignam in partes vicinas & intimas transmutari: quod summè exitiosum est, quia quò plures partes afficiuntur, eò periculum grauius & celerius. Prognosis ergo primæ speciei, ex eius descriptione supra scripta facile colligitur: cuius pernities prænuntiatur, tum signis maximè propriis, vt nullum tumorem,

tumorem, nullum calorem aut ruborem in faucibus conspici, cum maximi doloris & angustię in gutture sēsu, anhelitu suspirioso, orthopnoea; tum assidentibus ac superuenientibus symptomatis, qualia sunt raucedo, vocis impedimentū, spiritus sublimis, potionis per nares recursus, deglutitio intercepta. Et hæc symptomata, quia non semper morbum comitantur, sed sæpè cum illo accidunt, sūntque pathognomonicorum effecta, assidētia dicuntur, Gręcis syndreuonda. Huic autē anginx, si accadat vrinx & alui suppressio, extremarū partiū frigus ac liuor, quæ signa sunt superuenientia, mortem in propinquo esse est pronuntiandum. Secundæ speciei angina pernitiōsa quidem est, doloris acerbitate & perenni catharro nitroso à capite defluente: diuturnior tamen est primâ, quia non tam subito necat defectu respirandi & deglutiendi, præsertim si fauces insigniter rubeant; ex quo colligimus crassiores esse materiam quæ in faucibus subsistit nec laryngis venulas subire potest. Quod si rubor hîc accadat à propagatione materiæ morbificæ, manente priore foro in musculis propriis, fiatque metastasis faucium inflammatarum ad ipsam laryngem, mors in propinquo denuntiari potest: moritur enim æger eodem die. Tertia anginx species putatur omniū tutissima: in ea enim ægri nec magnopere dolent, nec admodum difficile respirant, nulla in re affe

re affecto gutture, ſed vniuerſa fluxione, vel in fauces vel in ceruicem, vel in vtrumque decumbente: in hac enim inflammatio magis cōſpicua eſt, quàm in ſecunda. Hanc longiorem facit Hipp. in coacis. Cuius longitudinis cauſa eſt abſentia eorum ſymptomatum, quæ in duabus ſupradictis mortem accelerant: nimirum acerbitas doloris, & orthopnoea, modò, inquit, rubor intrò non recurraſſet, per aphor. *Angina correpto, ſi tumor appareat in collo, bonum: foris enim morbus exiſtit*, vt igitur in angina externus tumor ſalutem polliceatur oportet cætera ſymptomata quæ circa guttur apparent, manifeſtè remitti; dolorem nempe & difficilem reſpirationem.

De prog. pleuritidis.

C A P. XIII.

DEprauatè læduntur viſ pulſifica & reſpirandi, per omnes affectus thoracis, præſertim ſi habeant febrem comitem. Nullus tamen eſt morbus, à quo principia illarum operationum grauiùs afficiantur, quàm à pleuritide: quæ cùm impediatur motum thoracis, & ſuæ inflammationis cor ipſum facilè particeps efficiat, nihil mirum ſi difficilem facit reſpirationem, & pulſum frequentiore, crebriore, velociorē, & auctiorē ſolito, febrem acutam teſtificantem.

Ad

Ad prognosim igitur ex pleuritide benè instituendam, necessaria est eius duplex diuifio: vna, quæ fumitur à loco; altera, ab humore. Habet enim pleuritis diuerfos exitus, & breuem aut longam extensionem, prout diuerfas thoracis partes occupat, & à diuerfis caufis oriri solet: Nam quæ notha est vel non exquisita, sicut externos thoracis musculos aut intercostales tantum occupat, præssuque digiti; & decubitu in dolente in oppositum latus percipitur; ita tolerabilior est remediis que etiam topicis solis cedit. Quæ verò exquisita est pleuritis, in membranæ succingentis costas inflammatione consistens, quia modò ab humore tenui & acri, modò à crassiore constat; ideò celerius vel tardius ad statum peruenit & terminatur. Nam quæ biliosæ simul sunt & sanguineæ, vt plurimum nono, aut vndecimo, aut celerius iudicantur: quæ verò materiæ contumacia constant, quæ nec coqui potest nec expectorari, sicut in his facultatis animalis & naturalis robur, prius quàm ad statum & expectorationem ventum sit, prosterni solet; ita vt plurimum sunt periculosæ, & lethales, magis senibus quàm iuuenibus: illi enim celerius intereunt virium debilitate: tales sunt in quibus dolores sunt initio molles, qui quasi ex insidiis quinto vel sexto die exacerbantur. Eas autem periculosas asserit Hipp. in coacis, tum propter sexti diei naturam, infidi &

tyranni instar iudicantis; tum propter accessiones paribus diebus contingentes, quæ malignæ esse solent, præcipuè in his febribus, naturam tertianarum referentibus. Mollis enim & latens symptomatum accessio, naturæ oppressionem ostendit, quæ vel morbificis causis occurrere atque obistere non audeat, propter malignitatem; vel non potest, propter copiam. Solet itaque pleuritis pro varietate humoris à quo fit, variis modis terminari; aut enim resolvitur dum materia in tenues discutitur auras, vel dum expectorato exhauritur; aut mutatur, dum fit suppuratum, aut putrescit, cum corrupta materia partem in gangrenam trahit, quod est calamitosum; aut induratur, cum exhausta tenui parte, crassior induratur, quod tamen raro contingit; aut denique permutatur aliò translata materia, unde parotis, phrenitis, paralyxis, orthopnoea, syncope, empyema, &c.

Pleuritidem igitur expectorato exhauriri pronuntiabit medicus, si promptè & faciliè, brevique tussi (quod benigni humoris indicium est) non lentè aut crassi; si citò, id est ineunte morbo, fiat expectoratio; si prodeant expectorata commodè; in qualitate, id est, colore cum flavedine commixta; in consistentia, ut non viscosa, nec nimium crassa sint; in tempore, ut citò appareant, nempe circa tertium diem. Solet enim hic morbus moveri diebus imparibus.

Pleuri

Pleuritidem in suppurationem mutari pronuntiabit medicus cum Hipp. si materia pleuritidis digeritur, vel per sputa vacuari non potuit intra decimum quartum diem, ab initio ipsius pleuritidis supputando: is enim est terminus morborum acutorum, per aph. 23. lib. 2 aphorismorum. Pleuritidem putrescere, & in malignam qualitatem mutari. ostendit sputum nigrum, aut biliosum simul, & purulentum, ac multum, feruor in gutture & stertor; si cum iis æger vim morbi præmolestè ferat; magnum & frequenter spiret, aucto incendio in pulmone & corde: si siti torquetur; costæ & thorax insigniter præ cæteris partibus, propter magnitudinem inflammationis, caleant: si denique inflammationis corruptela, calore nativo ab igneo dissipato & extincto, ad costas usque peruenerit, ita ut sydere percussus videatur æger, signo omninò funesto.

Pleuritidem in scirrhosam duritiem finire rarum est. Ea verò significatur dolore graui lateris, cum tussi sicca: pleuritidem enim siccam damnat Hipp in coacis hoc aph. *Sicca pleuritides, & in quibus nihil expuitur, periculosissima sunt.* Quod tamen simpliciter non esse intelligendum affirmat interpres Iacotius; nihil enim in principio expectorare ægrum, cruditatis quidem & morbi longitudinis signum est, nondum tamen malignitatis: cruditas enim non est simpliciter

mortis signum. Addendæ ergo sunt hæ conditiones eodem autore : vna, ex virium statu; altera, ex temporibus morbi. Infirmis enim viribus & progressu iam morbo, lethale est nihil expuere, aliis scilicet superuenientibus symptomatis. In principio verò oppressa potiùs quam infirma virtute, tantùm ostendit illa cruditas longius tempus habiturum.

Pleuritidem biliosam in cerebrum transferri, ex eo pronuntiari potest, quòd dolor lateris absque iudicatione, aut abscessu remittitur, móxque superueniunt signa delirij, qualia sunt quæ vim adaucti morbi sequuntur Græcis dicta epigenomena, vt oculus perturbatus, facies tristis, &c. Cùm enim materia ad cerebrum peruenierit, illic permanet, ac temporis progressu putrescens, fit nigrior. Ideoque caliginosos vapores emittit, ac spiritui qui aspectum efficit tenebras offundit. Alia sunt eiusdem generis symptomata, quæ pleuritidem lethalem significant & mortem propinquam, vt est strepitus multus in pectore, qui, si ab humida distillatione à cerebro non oriatur, materiæ pleuriticæ feruorem & agitationem significat, quæ propter contumaciam, copiam, aut facultatis imbecillitatem, non potest expectorari: huius generis est stillicidium sanguinis è naribus, quod duabus de causis est lethale: vna est communis omni feбри acutæ, in qua sanguinis è naribus stillatio, præter

præsertim nigri & synceri, si cum prauis cerebri symptomatis iungatur, mortem denuntiat: altera est pleuritidi propria, quæ hoc genere crisis rarò admodum soluitur. Visa est denique pleuritis aliquando sudore finiri: non parum enim iuuant feruentes phlegmonas, sudores multi & calidi, è toto corpore & præcipuè à parte laborante, die critico oborti, respondentes morbo, antegressis signis coctionis, & è quibus æger leuiùs habet. Pleuritidem etiam ex multorum symptomatum perturbatione abscessum ad cutem aliquando facere, scribit Hipp. sect. 6. lib. 6. epidemiorum, quasi ex humore falso excitata, vnde cutis arida & circumtensa redditur.

De prog. læsionis respirationis.

C A P. XV.

Respiratio, (altera vitalis facultatis operatio) tribus quoque modis læditur: diminutè nempe, abolitè, & deprauatè. Huius postremi modi multæ sunt quidem differentiæ, illorum duorum paucae. Diminuta namque quosdam potest habere gradus, sequiturque ad imbecillitatem, aut facultatis, aut instrumentorum respirationi dicatorum: sicut abolita respiratio, (apnoeam Græci vocant) fit cum principes partes, cerebrum nempe & cor, magno aliquo af-

fectu, siue primario, siue secundario, laborant: aboleri tamen respirationem non putat Gal. quâdiu viuit animal. In quibusdam animalibus tam exigua est, vt in serpentibus, vt percipi non possit: hystericae etiam mulieres aliquandiu dicuntur viuere, sola transpiratione. Deprauatae autem respirationis læsiones melius obseruatur, prænотatis modulis qui in bona respiratione esse consueuerunt. Sunt autem moduli sequentes: ne sit respiratio rarior, frequentior, tardior, velocior, maior, minor, inæqualis, intercisa, sublimis; sed sine interuallis iustoque spatio interposito, redeant inspiratio, expiratio & iusta quies: Spiritus calore temperatus sit, ne aut egellidus aut calidus ac feruens è thorace prodeat: Instrumenta pariter morienti facultati animali cedant, vt caloris insiti modus foueatur. Atque quæ in supradictis immutantur, tanto periculosiora sunt, quanto causa grauior & naturæ magis infensa. Mutatur autem respiratio potissimum ab illis tribus causis à quibus manat. Cerebrum namque tanquam agens respirationem mutat penes robur, imbecillitatem, vel conatû quem facultas assumit, vt cum humorem criticè expellit. Pectus mutat respirationem tanquâ instrumentum, penes dolorem, angustiam, conuulsionem, paralyfim, duritiem, siccitatem, &c. Eandem denique mutat cor ipsum refrigeratum, calefactum, impeditum, in cuius gratiam

priora

priora illa operantur. De speciebus læsionis respirationis, sigillatim agendum.

De prog. respirationis parua & frequentis.

C A P. XVI.

Quatuor duntaxat difficilis respirationis coniugationes, ex duobus contrariis assignauit Hipp. non enim plures quatuor primæ & æquales esse putantur. Nam vel spiritus paruus est & frequens, ut in dolore; vel paruus & rarus, ut morte imminente ab extinctione; vel magnus & frequens, ut in vehementi incendio cordis & pulmonis; vel magnus & rarus, ut in delirio. Frequens itaque respiratio dignoscitur, ex breuibus interuallis, & quiete, in qua vix perficitur altera pars respirationis, cum altera succedit. Quæ frequentia coniungitur vel cum magnitudine, vel cum paruitate. In illa augetur usus respirationis, vel à calore redundante, in his præsertim partibus, quæ sunt circa septum transuersum; nimirum in corde, ut per febres; in pulmone, ut in peripneumonia, in qua nondum est magna angustia, aut in causo, quæ focum habet in pulmone. In hac, id est, in respiratione frequenti cum paruitate, augetur idem usus ab aliqua causa impediente sufficientem thoracis motum, siue in pulmonibus insideat, ut in peri-

pneumonia cum magna angustia: siue in thora-
ce, vt in pleuritide; siue in diaphragmate, vt
cum ventriculi, iecoris, lienis, aut stomachi mo-
le premitur; siue in musculis abdominis, qui
omnes respirationi subseruiunt. Et de hac fre-
quentia extat aph. in coacis, *spiritus frequens &
paruus, inflammationem & dolorem in principibus locis
significat.* In hac igitur respirationis differentia
prognosis, secundum grauitatem vel leuitatem
affectus vnde manat, limitatur: quòd dolor, non
minùs quàm locum affectum demonstrat: si
enim grauiùs sunt affectæ partes prædictæ, do-
lent; quamuis non moueantur: si verò leuiùs,
quando mouentur tantùm. Confert & ad pro-
gnosim scire (quod antea diximus) omnem fre-
quentem spiritum gigni, non solùm à dolore,
verùm etiam à caloris copia; quam etiam velo-
citas pulsus cum frequentia comitatur, & ab
angustia, ex qua non tantùm frequens respira-
tio editur, verùm etiam orthopnoea & sonus
quidam, id est strepitus, qui stertendo fit. Qui-
bus frequentis si paruitas accedat, grauius pe-
riculum & mortem in propinquo plerumque
significat.

De prog. respirationis rare & parvæ.

C A P. XVII.

Hippocrates in coacis animadversionibus, raram & parvam respirationem intelligit, per spiritum frigidum. Quemadmodum enim magnus & frequens nimium calorem ostendit, atque idem est dicere calidum spiritum, quod magnum & frequentem, ita parvus & rarus, frigoris est argumentum: talisque spiritus non est alius quàm frigidus. Ex quo certò mortis periculum prædici potest, & esse in propinquo, tribus certissimis signis, præsertim in morbis acutis, vnum est frigida naribus & ex ore expiratio; alterum est pinnarum nasi motus, tertium prolapsus pectoris: quorum primum instrumentorum respirationi inseruientium & cordis frigus denuntiat, per extinctionem caloris natiui, & humidi primigenij ipsius cordis consumptionem; quæ extinctio differt ab ea quæ in morbis longioribus à pituitosis & crassis succis cordi contrahitur: Secundum absolutum virium infirmitatem sequitur; tunc enim natura emoriens, quasi ita plus aëris intra pectus receptura esset, nares contrahit, non secus atque nonnulli morientes hiare conspiciuntur: Tertium quod est pectoris collapsus & casus repentinus, fit

ægrotante morrice facultate, quæ non ampliùs
ut ante paulatim pectus dimittit, sed acervatim
totum collabi sinit; sicut fieri solet in his, quo-
rum totum corpus ad pedes prolabitur.

De progn. respirationis magnæ & frequentis.

C A P. XVIII.

QUemadmodum respiratio fit parva & fre-
quens, cum instrumenta vel non sunt
libera, vel cum ad motum naturæ, & ad incitan-
tem usum necessitatēque torpent: ita magna
& frequens esse consuevit, cum libera sunt do-
lore, nec ullo affectu intercipiuntur. Magna igi-
tur & frequens respiratio, parvæ & raræ contra-
ria, dicitur, quæ plurimū spiritus trahitur, &
calidus ac feruens ex naribus & ore efflatur.
Quæ cum ingētem calorem sine obstructione,
& incendium partium thoracicarum declaret,
salutaris, dubia, aut lethalis, pronuntiabitur,
consideratis signis, quæ affectionibus à quibus
oritur, superuenire consueverunt: de hac sic
scribit Hipp. in coacis: *Lethalis est spiritus ex æstuās
& fuliginosus, minus tamen quàm frigidus.*

De progn. magnæ & raræ respirationis.

C A P. XIX.

MAGNA dicitur respiratio, vel quia in ea
multū dilatatur thorax, vel quia mul-
tū

tum aëris inspiratur. Tribus autem de causis fit illa plurima thoracis distentio; aut quia augetur calor viribus constantibus; aut quia angustia impedit ne multus aër subeat; aut quia vires deficiunt. In prima causa verè magna est, in qua pectus maximè dilatatur, & multum aëris inspiratur, etiam sine superiorum muscutorum actione: in secunda, magna quidè est, sed quia quod inspiratur non solum non assequitur proportionem dilatationem, verum etiam multò minus quam secundum naturam solet (propter angustiam & obstructionem) attrahitur. Idèd magna dicitur, cum adiunctione. At quæ magna videtur respiratio propter virium imbecillitatem, in qua licet agant omnes respirationis muscoli, magna tamen re vera non est; quamobrem vocatur ab Hippoc. sublimis, quia in ipsa sublimes muscoli operantur qui thoracem & scapulas plurimum attollunt, licet aër non multus ingrediatur. Raritas quidè cum duabus postremis iungi potest, sine delirio. Quæ si accedat ad primam, in qua est magnitudo cum distentione pectoris & multi aëris ingressu, certissimum est magni delirii, aut præsentis, aut iam iam futuri argumentum. Est enim raritas hæc solius obliuionis affectus: quia aucto usu, & liberis instrumentis, sola mens in vitio est. Nam cum respiratio sit opus naturalis facultatis, fit ut qui delirant, in ea deficiant, non secus quam in reliquis functionibus

ctionibus arbitrariis, obliuioni detenti propter occupationem in spectris. Et sic cessant longo tempore bibere, meiere, &c. quia obliuiscuntur, aut non apprehendunt impressionem in sensibus factam. Aucta igitur necessitate, cum iam valdè vrgentur, exercent animales operationes, & longis interuallis, ideò magnas, inter quas respiratio numeratur, de qua extat aphoris. in coacis: *Magnus & rarus spiritus delirium aut conuulsionem significat.* De delirio autem & conuulsione superius egimus.

De progn. respirationis inæqualis.

C A P. X X.

PRæter prædictas respirationis differentias, aliæ sunt inæquales, in quibus inspiratio cum expiratione comparatur. Nam cùm sint duæ respirationis partes; vna qua spiritus stricto thorace foras excluditur; altera qua idem spiritus intrò trahitur, thorace ampliato, efficitur ut eius inæqualitas consistat, quando magna est expiratio parua existente inspiratione, & cōtra. Cuius inæqualitatis causa petenda est potissimum ab usu incitante: quamuis anima quæ mouet, & instrumenta quæ mouentur animæ cedunt, concurrere dicuntur. Est autem necessitas eiusmodi triplex: vna maxima & præcipua, innati caloris refrigeratio, vel potius moderatio; altera

altera minor, sed maximè necessaria, spiritus animalis nutritio; tertia fuliginum expurgatio. Primæ & secundæ inspiratio satisfacit, ultimæ expiratio. Quoties igitur magis vrget expirandi, quàm inspirandi necessitas, motus foras vincit, & qui intrò procedit minor efficitur, modò instrumenta sint libera: quod è contrario de vrgente inspiratione est concludendum: diximus modò instrumenta sint libera: nam læso diaphragmate & musculis intercostalibus interiorius, non ita libera est inspiratio: tunc enim minor est & maior expiratio, & contra cū musculi externi intercostales & abdominis laborant. Quoties igitur coeunt necessitas expirationis & infirmitas prædictorū instrumentorum, maior erit expiratio & minor inspiratio. Eadem ratione cū maior est vsus inspirationis, doleatque vëter exteriorésque costarum musculi, maior erit inspiratio, minore existente expiratione. De qua inæqualitate extat aph. in coacis animaduersionibus. *Spiritus qui foras magnus excluditur, intrò paruus redit, & qui foras paruus intrò magnus, &c.* Quantum ad prognosim huius inæqualitatis, petenda est ex acutie morborum in quibus fieri consuevit. Sunt & aliæ inæqualis respirationis differentix apud Hipp. ex quibus per se de exitu affectionum nihil potest concludi.

De

De prog. respirationis cum stertore.

C A P. XXI.

SOlet in multis affectibus, respiratio cum stertore contingere, ut in apoplexia, in pleuritide, peripneumonia, asthma, in suppuratione, &c. Est autem stertor symptoma feruentis materię in bronchiis pulmonum, cum scilicet pulmo nihil expurgat, sed plenus est humore feruente, quem cum aer inspiratus & fuligo exitum moliens per vim diuidit, strepitum excitat. Vehementem igitur esse oportet respirationis difficultatem, in qua stertor accidit, cuius duę sunt pręcipuę causę, feruor scilicet prędictus & angustia viarum prohibens concursum liberum ingredientis aeris & exeuntis fuliginis. Talis est in orthopnoęa, in qua spiritus nisi erecta ceruice duci non potest: cuius ratione reddit Gal. comment. ad sententiam § 4. 2. prorrh. cum, inquit, Aspera arteria, principium ducens à summo gutture, in pulmones distribuitur: quoties thoracem cum collo extendimus, arteria ipsa dilatatur, & simul cum ipsa propagines omnes, quas pulmonibus inserit. Vnde etiam petitur ratio, cur qui ita laborant, surgere conentur. Nam bronchia pulmonum magis hiant erecto quam decumbenti, & minore difficultate distenditur pectus. Prognosis tam stertoris,

toris, quam trium graduum difficilis respirationis, petenda est ex grauitate affectuum quibus superuenire solent.

De prog. peripneumonia.

C A P. XXII.

ET si vis pulsifica & respiratoria æquè lædi videantur in inflammatione pulmonum. In hac tamen tanta est respirationis deprauatio, vt dum pus in ea conficitur, summa angustia æger pressus, nisi erecta ceruice vix respirare possit. Est enim peripneumonia pulmonis phlegmone, vel primaria nullo præcedente affectu, vel aliis morbis succedanea. Eius enim est triplex generatio. Interdum statim inuadit nullo præcedente, vt dictum est, affectu, sed sanguinis biliosi ac tenuis collectione, per totum visceris corpus, qui è dextro cordis sinu continuo effluit per venam arteriosam. Interdum ortum habet à destillatione, è cerebro confertim in pulmones illapsa, quam pulmo faciliùs excipit. Sæpiùs aliis morbis superuenit. Et quoad prognosim, quinque modis peripneumonia inuenitur finire apud Hipp. morte, nempe, per suppressionem sputi: coctione: suppuratione: crisi, aut deriuatione & expurgatione humoris per vesicam, vel alium: & abscessu ponè aures, aut in cruribus.

cruribus. Quorum omnium modorum perquirere, facit multum ad prognosticum. Moriuntur itaque & suffocantur peripneumonici, cum aut paucum est quod expuitur, etiam coctum, aut nihil (pulmoniam siccam tunc appellant) quod horrendum est, duabus de causis: vna omnibus febribus communi, in quibus paucum nullum criticum est: altera huic affectui propria: qui propter loci affecti laxitatem, & raritatem, semper aliquid humoris contenti remittit, quod non fit in pleuritide, tunc enim quia nihil aliud incusare possumus, quam imbecillitatem facultatis vitalis, & motricis, cum pulmonis angustia, salus non potest non esse suspecta. Peripneumonici coctione, modo omnium tutissimo liberantur, cum sputum pro ratione editur, nempe si coctum, si facile; si citò & cum pauca tussi educatur. Suppurationem in pulmone esse factam hæc declarant: horror, à vellicatione membranarum partis affectæ ab acrimonia puris; difficultas spirandi, à repletionem bronchiorum pulmonis; febris assidua noctu increscens, aucto calore à suppressione excrementorum; sudores multi, tussendi cupiditas irrita: nihil enim excreatur effatu dignum; color & æstus circa thoracem.

Liberantur aliquando peripneumonici, multa & crassa vrina, cum multa hypostasi; aut alui fluxu, qui quidem utilis putatur, si in principio
aut

aut incremento contingat, materiæ scilicet antecedentis expurgatione, modò diutius non perseueret: alioqui in declinatione; aut statu, quia nihil de materia coniuncta educit, ac vires iam fractas prostermit, ferè semper est lethalis.

Peripneumonia, quæ aliquo ex prædictis modis non terminatur, per abscessum solui consuevit: abscessus autem qui peripneumoniciis superueniunt, alij sub auribus oriuntur, qui vtiliter suppurant, pure scilicet cocto & naturali, ex quo præter caloris robur, significatur periculum abesse refluxus materiæ in cerebrum, aut pulmones: alij in partes thoraci subiectas, & inferas discedunt, ac in fistulam abeunt, cuius perenni influenza, veluti emissario quodam, non solum pulmonis morbi, sed alij plerique, & prohibentur, & curantur. Non erit ab instituto alienum, causam inquirere, cur Hippocrautes abscessum ad crura in peripneumonia, in angina non laudat, quamuis videatur vtrumque laudabile, cum eadem sit in vtroque affectu periculi ratio: additur quòd satius est, etiam sine particulari coctione, anginæ superuenire abscessum ad crura, quam in larynge humorem retineri: ad hoc respondet interpres, Hippocratem damnare dolores & abscessus, qui per vehementes & periculosas anginas in crura erumpunt. Quia metuit effreni humoris effluxum ad interiora, & per cordis partes transitum. Sæpè enim inte-

ritus derepentè sequitur; cum humor, qui amplius loco contineri non potest, relictis faucibus in asperam arteriam effunditur, & in vasa quæ ad cordis ventriculos pertinent affatim irruit, ex quibus portio aliqua delabitur, & ad partes inferiores abscedit, reliqua paulò post necat. Cuius rei posuit exemplum in vxore Polemarchi hyeme anginosa, 5. epid. fol. 351. ex versione Cornarij,

De prog. phtisicos.

C A P. XXIII.

Facultates pulsifica & respiratoria non in omni tabe æqualiter læduntur: modò enim diminuuntur, modò deprauantur, prout ab hac, vel illa causa, corporis consumptio ducit originem: nam in phtisi, de qua hoc loco, vtraque deprauatur, & præcipuè vis pulsifica. Generali enim significatione tabes seu phtisis accipitur, pro qualibet corporis extenuatione, siue ex defectu alimenti, quam atrophiam appellant, siue ex febre hæctica, siue ex pure contento in thorace, aut quauis alia causa exiccante, contingat. Particulari verò & propria acceptione, eam corporis consumptionem significat, quæ sequitur ad insanabilia pulmonis vlcera, quosû tres sunt maximæ & præcipuæ differentiæ: vna est à destil

destillatione à cerebro, eaque vel multa, nec expulsa, quæ pulmones molles & tenellos putrefacit, vel (quod frequentius est) acri & exedente, qualis est salsa & biliosa, altera est ex successione pleuritidis, aut anginæ, aut peripneumoniæ, in quibus vomica rupta intra 40. dies repurgari non potuit: tertia frequentissima, ex apertione, aut ruptione vasis alicuius in pulmone, ex qua relinquitur vlcus, quo tunicæ vasorum & ipsius pulmonis carnes eroduntur, & de hac differentia habetur aph. 15 lib. 7. à sanguinis sputo puris sputum. Nam in secunda sequitur sanguinis sputum, à puris expuitione. Nonnulli addunt quartam tabem, hæreditariam, nempe à vitiosa pulmonum constitutione & corruptioni parata, qua tempore sensimque flaccescit ac sponte corrumpitur pulmo. Interdum sine cruenta excreatione, aliquando cum ea. Et hæc præparatio ad phthisim potius est dicenda, quàm phthisis. Ex supradictis concludimus tres præcipuas esse causas phthisis, illuuiem scilicet suppurationis, qua pulmo immergitur: corruptionem ipsius pulmonis, cui maximè est oportunus: atque ferinam distillationem à capite in pulmones errantem. Quod attinet ad prog. A quacunque causa fiat phthisis, ægrè curatur. Nam vt vlcus sanetur, vnione opus est: vnionis autem nulla spes in pulmone relinquitur, cuius caro, venæ & arteriæ reponi non possunt: additur, quod

præter motum perpetuum pulmonis, respirationis causa, non potest nisi tussiendo se excrementis extricare; at tussis, alas pulmonum vibrat & dilacerat. Dicitur tamen in sicca corporis constitutione siccari vlcus, & callo obdurrari, modò exiguum fuerit, idque in principio tantum. Nam si inueterauerit, nulla est salutis spes. Alij tamen phthifici, aliis diutius viuunt, non enim æquè praua est omnis purulentia. Sûntque nonnulli quibus nec alui nec capilli fluunt.

Phthificorum mortem in limine esse, tribus signis certò concludimus, si concurrant. Vnum est expectoratum foetidum, cuius explorandi ratio est, vt igni superfundatur, aut in vitro, vel pelui admotum carbonibus accensis superponatur. Alterum signum est diarrhœa. Tertium capillorum defluuium: hoc enim magnitudinẽ morbi significat: quia principiis vehementer alteratis, necessario in consensum adducuntur omnia quæ ex illis vim accipiunt. Non potest igitur succus satis largus, satisque efficax transmitti ad partes solidas ab hepate. Calor cordis cum spiritu ineptus est, & tabificam quandam qualitatem acquirit. Alimētarius humor intercedens in partibus solidis, aptus non est ad unionem. Colliquatur ergo corpus, & humor diffluit; qui vitæ est fundamentum. Quare qui sic affecti sunt, alui profluuium intereunt, per
aphori

aphorismum, quibus tabidis pili è capite defluunt, alui profluuium moriuntur: & quibus tabidis alui profluuium superuenit, moriuntur. Ratio inde petitur, quia alui fluxus neque vllam alleuationem adfert, symptomaticus enim est; neque cessat ad interitum vsque, quia facultatum prostrationem, & partium mortificationem sequitur. Apparet tamen in principio diarrhœa mitioribus symptomatibus, quæ tamen nisi tempore conquiescat, & tussis minuatur, lethalis est.

De prog. empyematis.

C A P. XXIIII.

Quia actio thoracis & pulmonis intercipitur in empyemate, necessario inde læditur respiratio; ægræ enim ægri respirant: in quibus etiam operatio pulsifica in deterius mutatur quia non desunt causæ quibus pulsandi vsus augetur. Hipp. nomine empyematis generaliter sumpto, omnem omnium partium phlegmonem quæ in pus mutata est, intelligere consuevit. Peculiari autem acceptione empyicos appellat, quibus pus natat in capacitæ thoracis, ita vt empyema nihil aliud sit, quàm oppressio spatij thoracis à purulenta materia: vnde accidit vt suffocatio magis ab oppressione oriatur, quàm à necessitate, & vsu respirandi. Hanc pu-

ris in capacitatem thoracis effusionem, demonstrant alia multa signa præter suffocationem: qualia sunt febris cum horrore, ab acrimonia puris mordente vicina corpora: sudores multi symptomatici, è capite & thorace, ab infirmitate virium; tussendi cupiditas, in qua nihil ingēs expuitur; calor acrior, & maior in latere vomicoso, quàm in sano; & alia quæ commemorat Hipp. in prognosticis. Quoad prog. Empyematis in vniuersum quatuor sunt termini: duo ad salutem; puris videlicet per sputa repurgatio, & per vrinas aut aluum excretio; per vterum rarissimè in mulieribus: duo ad mortem; suffocatio nempe, propter puris non repurgati copiam; & phthisis seu tabes, corrupto pulmone, propter mōram. Vtérque euentus dupliciter fit, aut enim celeriter aut tardè, vel seruantur vel moriuntur ægri. Seruantur celeriter, quibus febris statim eo ipso die post effusum pus desinit: signum enim est totum pus confectum esse, partibus solidis integris remanentibus: si cibi appetentia reddatur, restitutis videlicet, aut certè non impeditis facultatibus coquendi & appetendi in ventriculo, trahendi in hepate: si pus reiiciatur album, inodorum, leue, & concolor, sine igneo calore: quod ostendit facultatis tum animalis in expellendo, tum vitalis & naturalis in coquendo, integritatem, materiæ benignitatem, & meatus liberos: si denique alius pauca
& cocta

& coëta excernat. Quod certissimum iudicium est, nullo modo partes naturales, cum spiritalibus, in consortium mali adduci.

Celeriter moriuntur empyici quibus contingunt omnia signa mala supradictis contraria, & maximè, si perseveret dolor lateris, cum suffocatione, additis sequentibus pravis signis: si putum, nigrum nempe, aut biliosum simul, ac purulentum, aut multum, feruor in gutture, stertor: si cum iis æger vim morbi molestè ferat, magnum & frequenter spiret, aucto incendio in pulmone & corde, siti torqueatur, ac coëta & thorax insigniter præ cæteris partibus, propter magnitudinem inflammationis, caleant. Tunc enim mortem in propinquo esse est pronuntiandum. Tardè ægrum seruatum iri coniectabimus, si signa mala cum bonis permisceantur, bonaq; & valida superent. Tunc enim seruabitur quidem æger, sed difficulter: sicut si mala bonis præualuerint, tardè morietur. Quibus, ut certius sit iudiciū, addere oportet, temperamentum ægri, vires, tempus, locum & similia.

De prog. læsa respirationis ab affectibus diaphragmatis.

C A P. XXV.

INter alios diaphragmatis vsus, maximus ille iudicatur, quo liberæ respirationi subseruit.

Tenditur enim in inspiratione, laxatur in expiratione, cui functioni cum non possit satisfacere, quoties morbo aliquo laborat, non sine ratione tunc temporis respiratio diminutè, aut etiam depravatè læditur, pulsifica non omninò illæsa remanente: adde quod & cerebrum ipsum, cum quo magnum habet diaphragma consensum, in cōsortium huius malorum, etiam frigidorum adducitur. Ex multis itaque malis, quibus diaphragma, tanquam pars organica, cruciatur, duo potissimùm insignia notat Hipp. inflammationem scilicet, & palpitationem; à quibus præter læsiones actionum, partium thoracicarum, delirium sequitur: à palpitatione quidem, quæ soboles est flatuosi spiritus, agitata nempe circa septum transversum pituita putri, aut potius commotis quibusdam calidis humoribus, quibus inflammationes in hac parte fieri consueverunt. Quod tamen delirium leue est, licet continuum sit, & simile veræ phrenitidi, à qua differt hac ratione, ut respiratio in vera phrenitide sit magna & rara: in illo verò delirio, parua, densa, inæqualis. Addit Gal. aliud signum huius distinctionis, ut reuulsionem hypochondriorum, in principio affectus inflammatorij diaphragmatis, cap. 2. lib. 5. de locis affectis. Et quoad prog. diaphragmatis inflammatio, si magna sit, lethalis ut plurimùm est, ratione symptomatum quibus comitatur. Depravat enim
non

non solum respirationem: sed etiam cor, iecur, & ventriculum coafficit, propter viciniam. Cerebrum verò, propter insignem neruorū communionem, & insignem habituum euaporationem: vnde perpetuum ferè delirium, respiratio difficilis, tussis sonora, concussio vehementiùs thorace à diaphragmate, febris ardens, dolor & grauitas circa extremas cartilagines extremarum costarum, nausea, cibi fastidium: auget siquidem mortis certitudinem, vehementia symptomatum.

De prag. ex tussi.

C A P. XXVI.

TVSSIS species motus concussiu, quia est pulmonis malè affecti symptoma, nūquam excitatur quin pulmo ipse & arteriæ ipsius aliquo modo offendantur; siue propria affectione laboret, vt in asthma, peripneumonia, vomica, tuberculo; siue per consensum aliarum partium, vt in affectibus membrorum respirationi seruientium, musculorum nempe thoracis & diaphragmatis, gulæ, trachæ, arteriæ, vt in gibbæ hepatis phlegmone, in hydrope, vt in affectibus capitis ab illabente catharro irritantur pulmones. Est autem tussis humida vel ficca: illa habet vias expeditas, materiam sequacem, & vires validas: hæc contra siue ab inflam-

matione pulmonum & aliarum partium cruda, siue à tuberculo, siue à crassitie aut tenuitate materiæ, siue denique à virium debilitate pendeat : quæ tussis sicca vel vehemens est & coacta, vel exigua & non coacta, sed quæ facile supprimi potest. Quibus suppositis varia ex tussi pro variis circumstantiis prædici possunt : ab ætate quidem, vt in infantibus tusses deterri-
mæ iudicantur, quia impediunt respirationem & somnum, & aliquâdo suffocant, atque febres acutas & affectus comitiales in illis excitant: in senibus verò non quiescunt, donec vires exolutæ fuerint per aphor. 40. lib. 2. *grauedines & distillationes coctionem in valdè senibus non admittunt.*

Tussis quæ ab acri distillatione fit, tabem minatus, præsertim in iuvene. Quæ ab vlcere, sunt omnes lethales. Tussis quæ superuenit hydropi, aliquando mala est : adaucti enim morbi symptoma est, cuius materiæ portio è capacitæ ventris, per cæcos ductus, in pulmones regurgitat, & spiritales partes expugnat: aliquando non ita mala, vt si in hydrope adsit destillatio à capite complicata, vnde multa tussis cum multa expectatione; quæ cum non sit affectus hepatis symptoma, tussis per accidens dicitur. Tussis irrita, quæ à tumente & phlegmone affecto hepate fit, deterior est; deterrima autem si habeat hydro-
pem comitè. Eo enim tumore vel diaphragma opprimitur, vel suo pondere deorsum trahitur.

Alliga

Alligatur enim diaphragmati hepar quibusdā fibris, quibus deorsum reuulsis vnā septum trahitur & ab hoc membranæ quæ thoracem interiorem comprehendunt. Ex quo angustia spiritalibus instrumentis accidit, quæ mouet inanem tussiculam.

Tussis in febribus duplex solet contingere secundum Hipp. 6. epid. Vna ferina, sic dicta, quia fit ab acri distillatione à cerebro, aut ab ulcere in pulmone & thorace, aut ab empyemate: altera non ferina, quæ si habet leuem distillationem, ab externis causis, vt à frigore, aëre, vento, æstu, &c potius contracta est, quàm à vitio cerebri, vel partium spiritalium. Spiritus enim allisus in asperitate, quam vel intemperies febrilis in faucibus & arteria facit, aut blanda distillatio, aut cibus exasperans, tussiculam mouet. Quæ tussis, quia leui concussione à vicinis partibus benigniorem humiditatem exprimit, tum in pulmonem, tum in ventrē, sicque eas partes irrigando, ac spiritu frigidiori temperādo, sitim sedat: quam ob eam causam cōmendat Hipp. in febribus ardētibus aph. 34. his verbis: *Quibus sicca tussēs in febribus ardentibus paulū irritātes perseuerāt, ij non admodum sunt siticulosi.* Efficit enim ne ægri immoderatē sitiant pro ratione febris. Hæc igitur tussis quia non est ferina, leuiter & longioribus interuallis irritans, atque quia febrem & sitim remittit, nihil habet periculi. Ferina verò
quia

quia breuibus interuallis viget, nec leuiter, sed vehementer thoracem contrahendo mouet, lacerat, calefacit, somno etiam priuat; &, quod maximè est metuendum, vires celerrimè prostermit; periculi plena est, & causa semper pessima ac maligna, præsertim per exacerbationes, aut accessiones febrium; in quibus aliquando tanta vis est distillationis, vt initio accessionis suffocentur ægri.

Finis Libri secundi.

Laus sit Christo, & B. Virgini Mariæ.



OPERIS PRO-
GNOSTICI, QUI EST
DE LÆSIONIBVS OPERA-
tionum naturalium.

LIBER TERTIUS.

PRÆFATIVNCVLA.



ATVRA^{LI}S facultatis
vna est princeps & præci-
pua pars, in qua sanguis,
materia nutritionis omniū
membrorum corporis, fa-
bricatur, harpar nempe.
Cuius operi perficiendo,
adsunt multæ aliæ particulæ, in ventre infimo,
omnes circa iecur, cominūs vel eminūs positæ:
ventriculus scilicet, qui primus omnem ali-
menti materiam suscipit, cui primum coctionis
rudimentum præbet: intestina, quæ suis gyris
diutiūs chylum à ventriculo susceptum reti-
nendo, tempus idoneū distributioni præbent,
& huius primæ coctionis excrementa repur-
gant.

gant: Venæ mesenterij, meliorem chyli portionem ad hepar ipsum deducunt: Vesicula fellea, lien, renes, & vesica, sanguini repurgando sunt destinata. Quarum omnium partium vitia, plùs minùs, præcipuæ operationi huius potentia, quæ hæmatosis est, officiunt. De quibus malis secundùm nostrum institutum sigillatim agere consilium est, ab affectibus præcipuæ partis exordiendo.

*De prog. affectuum quibus diminutè vel abolitè
læditur sanguificatio.*

C A P V T I.

Sanguificatio, quæ est, vt diximus præcipua Siecinoris operatio, in multis eius affectionibus diminutè aut etiam abolitè læditur; vt in omni frigida intemperie, in scirrroso tumore, & maximè in qualibet hydropis specie; in aliis plùs, vt in ascite; in aliis minùs, vt in tympanite, hypofarca. Et quia omnis vis prælagij pendet ab exacta morbi, in quo euentus quæritur, dignotione: quædam in genere de hydrope priùs sunt supponenda, quàm de exitu cuiusque speciei certò possimus aliquid pronuntiare. Hydropis igitur (qui de ventre peculiariter, generaliter verò, de omnibus partibus, in quibus aqua colligitur, dici solet) tres ab omnibus constituunt

ſtituuntur ſpecies, ex triplici ſanguificationis diminutæ errore, loco & materia diſtinctæ, anafarca ſcilicet (quam aquam intercutem propriè appellant) aſcites & tympanites. Conueniunt omnes in tribus potiffimùm; vt ſcilicet in omnibus ſit hepar ſemper pars affecta; vna cauſa immediata, refrigeratio nempe: atque eadem actio læſa, ſanguificatio frustrata. Eſt autem illa refrigeratio aut poſitiua & præſens, calori qui vim habet agendi contraria; aut priuatiua, à priuatione & reſolutione caloris natiui & formæ. Dicitur etiam caloris natiui abſentia, quam calor præter naturam genuit. Ex qua refrigerationis diſtinctione, triplicem hydropis generiſim conſtituimus: vnā ex intemperie frigida; quæ vulgò poſitiua dicitur; ex copia & vſu immoderato rerum frigidarum, & humidarum; aut à multitudine craſſorum humorum, viſcus ipſum opprimente eiùſque calorem paulatim minuente & quaſi extingente, vt fieri ſolet in ſcirrho hepatis, in ſuppreſſa aliqua euacuatione ſolemni, in liene grauiter affecto, refluente ſanguine fœculento ad hepar: alteram ex immoderata euacuatione, vt in profuſione effrenata menſtruorum in mulieribus, quæ etiam in hydropem incidunt per fluorem muliebrem vocatum, in profluuiio immoderato hæmorrhoidum: tertia hydropis generatio eſt à refrigeratione hepatis, quam intemperies calida, à calore

calore extraneo, calorem nativum resoluendo, inducit. Non enim solum frigus refrigerat, sed etiam calor extraneus subtracto humido, & resoluta calore nativo: In qua specie refrigerationis hepar calore igneo torretur & exsiccat ac proprio destituitur. Nam cum hepatis calor sit sanguificationem perficere, non quia calor est, sed quia naturalis & in mediocri temperie constitutus; utrinque extrema habet pro contrariis; in excessu nempe, calorem; in defectu frigus. Hepatis itaque calor parum refrigeratus, loco boni sanguinis pituitam multam generat, parum auctus multam bilem: iam vero languescens & extinctioni proximus; ab excessu frigoris, accedente sanguificationis priuatione, in carnosum genus pituitam diffundit; quæ assimilari non potest: ab excessu vero caloris, humidum omne in flatu convertit, non aliter quam ignis aquam, unde pro sanguine flatu generantur: & tunc vel fit ascites, cum flatu à frigore concrevit, vel tympanites, cum omnino non concrevit: ascites enim fit, cum serosus sanguis & crudus, infirma expultrice hepatis, aut renum attractrice, in spaciū, quod inter peritoneum est, & partes ipsi subiacentes effunditur. Et hæc de generatione hydropis.

Quoad prog. non solum hydropis præsentis exitum debet medicus prædicere: verum etiam imminentem præcognoscere, hoc in genere demon

demonstrant, omnia quæ immodicè hepar refrigerant, aut valdè obstruunt, aut febrili ardore torrent, aut denique multitudine & crassitie obstruunt. Particulatim futurum hydropem arguunt, graues iecoris ipsius affectus, iam inpetetrati: renum imbecilla secretrix; vnde fit vrinæ suppressio vesica vacua, ex quo solo vitio hydropem interdum nasci putat Paulus: morbi acuti potissimum in ieiuno intestino, & mesenterio, qui neque crisi, neque suppuratione finem habent: & extra febrem malus corporis habitus, quem cachexiam vocant. Ex quibus vitiis alij tympanitem denuntiant; qualis est hectica intemperies ieiuni intestini, conflata ex dolorifica & diuturna inflammatione; alij hypofarcā, vt cachexia; alij ascitem, vt sunt peculiares iecoris affectus, & renum imbecillitas.

De exitu autem hydropis hoc in genere est prædicendum, vt solùm illum, vel naturæ beneficio, vel artificio medici curari posse putemus, qui ex sola feri collectione & suppressione, aut materiæ flatuosa copia, ortum habet: sine scirrho hepatis confirmato, aut sine corruptela substantiæ eiusdem, aut sine marasmo retorrido, aut hectica intemperie intestinorum: vbi enim ex his vitiis aliquod in visceribus latet, frustra flatus discutitur, aut aqua vacuatur, nisi vrgenti symptomati tantum occurras. Possunt enim aluo commota multa expurgari, indéque ven-

L

ter detumescere, vt melius habere per aliquod tempus ægri videantur. Verùm insanabili viscèrum manente vitio, recrudescit malum, eoque magis mortiferum, quàm ante, quò vires infirmiores sunt. Tum ex diuturnitate morbi, tum ex multa spiritus dissipatione in effusione aquæ, & viscera quæ circumfusa vndique materia tanquam fulcimento subleuabantur deorsum magis inclinant, simulque diaphragma & partes in thorace contentas reuellunt: vnde animi deliquia existunt & vires deiiciuntur, quarum iactura refarciri non facile potest. Et ob eam causam Hipp.aph. 27. libr. 6. præcipit ne in suppuratis vitione, neque paracentesi in hydropicis, vacuatio vniuersim & confertim fiat. Quare cum hydrops aliquantulum alleuari videtur, postea redit, desperatio est, quia ex perenni materiæ generatione pender.

Ex omnibus hydropis speciebus, grauissima ea æstimatur, quæ acuto morbo superuenit, siue sequatur ad inflammationem ilium & lumborum (quæ partes facile hepar in consortium trahunt) siue ad inflammationem ipsius hepatis. Priorem hydropem exitialem, duo superuenientia significant: tumor nempe pedum œdematosus, & longum ac pertinax alui profluuium. Illud quamuis symptoma sit commune omnibus hydropis speciebus: non tamen in aliis æquè est periculosus. Pendet enim hic à malignitate morbi,

morbi, quo natiuus calor tum in ventriculo, tum in hepate languens ex antecedente morbo, ferè resolutus est, adde quòd in hac specie hydropis, venter, crura & pedes intumescunt: non ex febris materia loco mota: sed à noui excrementi à iecore malè affecto, generatione. Permanet enim visceris flammea dispositio, quali fomes febris, noua interim excitata putredine, nouaque cachochymia generatione, per sanguificationis priuationem. Lethales sunt itaque hydropes huius generis, & dolorifici magis, quàm reliquæ species. Quia præter symptomatum vehementiam, & curationis difficultatem, calore natiuo penè extincto, in corpus liquatum alio morbo incidunt atque hominem iam confectis viribus celeriter extinguunt. Alterum symptoma huic hydropi succedens, erat longum & pertinax alui profluuium, iudicatorium non iudicans, perpetuò succrescente noua cachochymia, cuius causa est triplex. Vna imbecillitas venarum, quibus quasi manibus iecur ad se trahit alimentum: cuius imbecillitatis causa est intemperies hectica; & quod iecur in consortium mali adductum non conuenienter trahit, nec in mesenterio inchoatur amplius hæmatosis, vnde hoc profluuium ad lienteriam est referendum. Altera causa esse potest obstructio à putredine & phlegmone, quæ impedit distributionem. Tertia alimenti corruptio &

perennis biliosi excrementi coaceruatio, tum à putredine, tum ab inflammatione & vehementi calore ieiuni intestini & mesenterij: ex quibus vehementer morderi intestina, & irritari ad excretionem eorum quæ infestant, necesse est; & hic alui fluor diarrhœa dici debet: quo tamen fluxu symptomatico, nec dolores sedantur, nec ventris tumor sublidet, quia internus ardor & intemperies hectica manet. De hac specie hydropis extat aph. in coac. animaduersionibus.

Quibus ex ilibus oriuntur hydropes, iis pedes intumescent, & diuturna alui profluvia comitantur, quæ neque ventrem inaniunt, neque dolores solvunt, qui ex ilibus & lumbis oriuntur.

Altera erat hydropis species succedens à flammea dispositione hepatis. Cuius prognosis colligitur ex symptomatibus, quibusdam quæ progressu morbo contingunt. Qualia sunt tussis sicca, tumor pedum, & circa ventrem modò desinens modò exurgēs, & alui sicca. Quorum alia periculosiorem affectum significant, alia minùs periculosum. Tussis siquidem hydropi succedens, perniciosissimum signum est per aph. 35. lib. 6. *Hydropicis tussis si superueniat, malum.* Quod, ut intelligatur de qua tussi verificetur. Sciendum tribus de causis tussire hydropicos, vna est per accidens à distillatione à cerebro cum hydrope complicata; qua tussi multa extussuntur. Altera est vitiosi hepatis nota, & hydropis

dropis ab hepate propria : quæ tussis irrita dicitur, è qua nihil dictu dignum expuitur : in ea enim opprimitur diaphragma ab hepate propter tumorem ipsius hepatis, vel detrahitur propter grauitatem. Tertia tussis hydropicis superueniens, vera, vehemens, & difficilis dicitur à materia contenta in pulmone, quæ vi morbi & præ copia è capacitate ventris cæcis ductibus eò regurgitat, & præsidia vitæ ac spiritales partes expugnat : quæ tussis hydropis desperati est signum, per aph.47. *Si hydropicum tussis habeat, desperatus est.*

De prog. Hepaticorum.

C A P. II.

HEpatici propria significatione medicis dicuntur, quibus hepar ita infirmum est ut iam desit suo officio fungi, neque sanguinem naturæ conuenientem gignit : nullo tumore, non scirrho, non œdemate, aut nullo manifesto in viscere malo. Quod ubi accidit, vniuersum corpus pati necesse est, quia deterius alatur, unde cachexia & hydropis metus. Diminutè ergo aut etiam depravatè in hepaticis sit sanguificatio. Huius imbecillitatis causa, est intemperiei calidæ aut frigidæ excessus, non quidem omnis, sed sub quo humores qui venis & arteriis

continentur, qualitate aut copia plurimùm à natura recesserunt: vnde visceris integritas, vel propria substantia, quam parenchyma Græci vocât, dissoluitur, labefactatur, & corrumpitur.

Duo signorum genera consideramus in hepaticis. Vnum eorum quæ pathognomonica dicuntur. Alterum eorum quæ epigenimata & superuenientia, illa ad diagnosim pertinent. Sumunturque à colore albicante, subcitrino, aut subuiridi & fusco, atque ab excrementis alui & vesicæ: nam in sanguificatione, infirma attractrice, chylosa deiiciuntur; alteratrice & retentrice, rubra alui proluuies loturæ carniū aut sanguinis aqua diluti similis. Hæc verò ad prognosim spectant: quia vi adacti morbi superueniunt, & è quibus de salute aut morte præsagium sumitur: cuius generis sunt ea, quæ cum excrementis alui & vesicæ excernuntur, & quæ in toto corpore apparent, atque quæ à partibus vicinis ortis & coniunctis mali primigenij contagio eueniunt.

Hepaticos igitur deploratos iudicamus, in quibus colliquari corpus, aut hepar tantum & particulariter, ex vrinis & deiectionibus videmus. In principio enim colliquationis vrinæ oleosæ apparent. Cum verò colore & consistentiā quid veluti oleum fuerit, tum affectionis status signum est. Differunt autem hæ vrinæ oleosæ, ab his quæ excernuntur à resolutione pingue

pinguedinis renum : hîc enim vniuersum & celeriter excernuntur , propter minùs interual-
lum: at in pinguedine totius, non celeriter , sed
tardè & paulatim, pingui scilicet colliquato per
longos venarum amphractus tandem ad renes
perueniente. Quam distinctionem notat aph.
35. lib. 7. his verbis: *Quibus in urinis adipalis super-
ficies & conferta, iis nephriticum & acutum morbum
significat.*

Vrinæ in particulari colliquatione hepatis,
excernuntur cum orobea substantia & pulta-
cea : quia à febrili calore, molliori carne in te-
nuem humorem soluta , partes solidæ ac duræ,
perinde ac in sartagine torrentur, arefactæ con-
tabescunt. Idem est iudicium de deiectionibus,
quæ tandem in hepaticis nigræ apparent. Assa-
tur enim sanguis, vel excedente propter calo-
rem coctrice (siue à putredine in frigido affectu
fiat calor præter naturam, siue aliter) vel substi-
tente plus æquo sanguine in iecore, nec distri-
buto, quoniam modicus etiâ calor mora exic-
cat, vrit, & indurat.

Hepaticis quoque superuenit raucedo & tuf-
fis, cum è supernis partibus colliquatio, guttur
& asperam arteriam irrigat, signo suspecto. He-
paticis succedit venarum prominentia : non
quia sanguis multus generetur ; sed quia in car-
noso genere virtus imbecilla, ex venis & arte-
riis corruptum alimentum non trahit, vnde ve-

næ vitioso sanguine plenæ & liuidæ apparent. Non secus atque in suppressis mensibus, & hæmorrhoidibus. Hepaticis tandem superuenit sputum cruentum lethali signo: Cùm enim in hoc affectu sanguis sit semper vitiosus, si serosior sit, facilè transcolatur; si calidior putrescit, aut vritur, facitq; vt tum particula in qua inest, tum quæ vicina sunt, calidiora sentiantur, & venas irriter, aut tumorem aliquem, aut vlcus excitet: Sputur autem sanguis hepaticis, vi ad aucti morbi, tribus de causis, venarum imbecillitate (condolescunt enim iecori malè affecto, vt potè suæ origini) sanguinis praua qualitate, & plenitudine ad vires in venis. De qua spuitione extat aph. in coac. his verbis: *Quibus hepaticis multum sputum cruentum, siue subputridum, siue biliosum meracum, statim lethale.* Magnum siquidem affectum esse oportet, in quo, neque hepar per loca conuenientia expurgari potest, & partes supra septum omnes in consortium mali adductæ sunt.

De prog. inflammationis hepatis.

C A P. III.

DEprauatè læditur sanguificatio ab inflammatione hepatis, siue in caua, siue in gibba parte fiat. Corrumpitur enim sanguis, & limites

mites coctionis excedit, dum iecur inflammatur, sicut in affectibus frigidis huius visceris recrudescit & imperfectè coquitur. Demonstratur vtriusque loci inflammatio, diuersis symptomatibus. Caua enim pars quæ ventriculum & intestina contingit, inflammatione obsessa, in ventriculo parit cibi fastidium, nauseam, vomitum biliosum, ingentem sitim, singultum: in intestinis tormina fiunt, in lateribus grauis & laboriosus decubitus sinister, tumor tactui minimè obuius. Conuexa verò parte inflammata, thorax, cui pars illa communicat, magis afficitur, ac spiratio læditur per oppressionem diaphragmatis & membranæ succingentis tensionem, ut inter respirandum ponderis sensum ægri percipiant, tussiant, nec tamen quicquam excreant, ac dextræ partis iugulum detrahi sibi putent: estque his hepaticis decubitus dexter difficilis & dolorificus. Et quoad prognosim, multiplex est exitus huius visceris phlegmones, pro natura inflammationis, copia humoris, & varietate loci, in quo præcipuè sanguis feruet, membranæ, nempe, carnis, & venarum portæ, & cauæ. Nam phlegmone crisypelatodes, propter febrem vehementissimam, in marcorem desinit, quia ardor cordi proximus est & alimenta deurit. Post vigesimum diem si febris maneat nec resideat tumor, in suppurationem conuertitur, è qua pus, siquidem intra tunicas contineatur,

nihil patiente substantia hepatis, vtiliter & superflite ægro vacuari potest. Sin ad carnem vsque corruptio peruenerit, ex incocta putredine, fæci olei simile pus exit, quod planè lethale est. Inflammatio conuexæ partis hepatis iudicatur vel hæmorrhagia per nares, vel suppuratione, ut dictum est, vel sudoribus bonis, vel vrinis multis. Cauæ, deiectionibus biliosis, sudoribus, nonnunquam vomitu, aut abscessu ad coxas & crura. Et quemadmodum aliquando contingit, ut gibba parte inflammata profit hæmorrhagia, sanguine ad superiores partes propter feruorem ascendente; ita in caua per mesenterij venas, aut hæmorrhoidas, è vena caua sanguis interdum commodè in aluum deponitur: aduenit tamen interdum, ut per eiusmodi hepatis inflammationes cruenta deiectio non modò non liberet ægrum, sed morbum & periculum grauius augeat. Quod si hæc duæ inflammationes conferrantur inter se, quæ conuexam partem occupat, quamuis minùs vulgus terret, plus tamen periculi habet; quia nobilior pars iecinoris phlegmone laborat, in qua videlicet coctus iam purgatusque sanguis continetur, & quæ magis thoraci ac cordi communicat.

De

*De prognosticis corruptæ sanguificationis à
vitiis lienis.*

C A P. IIII.

Lienem ex aduerso hepatis natura construxit, vt expurgato fæculentis sordibus hepate, sanguis syncerior & purior euadat. Sunt autem varij affectus, quibus illud ministerium lienis impeditur, vnde sequitur sanguificationis deprauatio. Eius imbecillitas nempe: tumor laxus sine scirrho, nec admodum renitens, ex aquoso & crudo humore, aut melancholico ac terreno cum multo flatu: obstructio venarum & arteriarum, à crassiore humore, cum solius grauitatis sensu, aut totius substantiæ cum tumore duro: Scirrhus durus & valdè renitens: inflammatio cum febre acuta, quam significat linguæ nigredo, sitis implacabilis, sinistri hypochondrij distentio, tumor & dolor pulsans, atrabilis in liene vicinisque locis congesta, sine tumore, cum multo flatu, tactuque quasi ex lebetis aqua subdito igne, cum palpitatione cordis, faciei per intervalla rubore, metu, tristitia. Quorum affectuum quolibet qui afficiuntur, dicuntur ab Hippocrate & Galeno, splenici. De quorum prognosi Areteus in libro de causis & signis morborum diuturnorum, ait: omnes lienis morbos esse diuturnos, quia tendunt potius ad

ad scirrhum, quàm ad suppuratum. Auicennas quoque existimat, morbum calidum lienis esse rarum, quia vi caloris sanguis incrassatur, & induratur lien. Inflammatione tamen tentari lienem, probat experientia, & autoritas summi Hipp. quibus accedit ratio ab ipsius lienis compositione: constat enim substantia tenui & rara, arteriarumque multitudine: adde quod nutritur parte tenuiore sanguinis melancholici, & fluxionibus extrinsecus contingentibus facillè tentatur. Quod etiam affirmat cap. 3. libr. 3. de crisibus, vbi ait Gal. acutam lienis inflammationem finiri fluxione sanguinis per narem sinistram, & sudoribus. Aliæ autem lienis ægritudines quæ ex crasso succo sunt, egent euacuatione, per aluum scilicet, per hæmorrhoidas, per ventriculū, nonnunquam per vrinas, facta viæ per cœliacam arteriam, aut refluyente humore à liene ad hepar. Cui tamen sententiæ repugnat Gal. cap. 17. 13. libri methodi medendi; vbi docet ex situ partis lienem expurgari per alui fluxum, non autem per vrinas. Vrinæ tamen nigre, quæ à liene inflammato excernuntur, priorem sententiam confirmant. Hipp. 6. epid. inclinationem humorum in liene peccantium, deprehendit, ex figura & situ tumoris: ita vt existimet, tumorem, qui in parte inferiore lienis, durus est, quia deorsum vergit, aut quia prauos humores quos in se continet, in partes inferiores

res propellit, per inferiora solui, & de hoc tumore intelligatur illud Hippocratis. *In liene catarrhopi genua & pedes calidos esse, nares verò & aures frigidas. Tumor autem rotundus simul est anarrhopi & catarrhopi.* Quare humor quo intumuit liem, interdum abscessum facit in crure sinistro, sæpissimè per hæmorrhoidas, aut per intestina expurgatur: interdum è directo sursum versus per nares hæmorrhagia euacuatur, præsertim si sit tumor inflammatorius. Ad prog. quoque pertinet illud Auicēnæ fen 15. tractatu primo, lib. 3. cap. 2. Splene intumescente, hepar & vniuersum corpus arefcere, vnde sequitur pauca hematoxis cuius bonam partem lien inflammatus trahit: quo fit vt reliquum corpus destitutum alimento, tabescat: & hoc est quod Hipp. inquit, *Lienosos esse humeris, iugulis, & facie tenues.* Huius partis tumores raro in suppurationem terminantur, cuius rei hæc est demonstratio. Quatuor in suppuratione concurrunt, loci nempe conditio, vt sit pars mollis & calida, humor calidus temperamento, febris continua, & facultas valida: at lien paulò durior, & minùs calidus eius humor, febris intermittens est: idèò minùs suppuratur. Et tandem si splenicus eò deuenierit, vt color corporis sit plumbei formis & parua vlcuscula in tibiis emanantia tandem magna fiant: sintque, quæ per alium excernuntur sanguinolenta & eruginosa, sitque venter & splen ipse durus

durus vt lapis: additis quibusdam aliis signis superuenientibus, affectum necessariò lethalem esse pronuntiabimus.

De prog. læsæ sanguificationis à vitiis ventriculi.

C A P V T V.

Sanguificationem malè fieri ex malis quæ ventriculo accidunt, quibus diminutè, abolitè, vel deprauatè se gerit circa cibos ingestos, probatur ex his quæ scribit Gal. cap. vltimo lib. 4. de sanitate tuenda. Quibus nititur demonstrare, vitia primæ concoctionis non posse in secunda emendari, & huius in tertia, quæ fit in carne & membris, hoc argumento: Quemadmodum se habet ea præparatio quæ elixatione, aut assatione fit ad coctionem ventriculi, ita hæc ad coctionem hepatis, se habet enim hepar ad ventriculum, sicut ventriculus ad externam præparationem: cuius partis tanta est vtilitas & dignitas, vt ea sola affecta, per medium hepar, totum corpus immutetur, & alterationem suscipiat. Quod intellexisse videtur Hipp. sect. 4. libr. 6. epid. non procul à fine, his verbis: *Ventriculo calidi, carne frigidi & tenues eminentes venas habent, & iracundiores sunt.* Quem locum ita interpretatur Laurentius doctissimus in operibus anatomicis, capite de ventriculo: ventri

ventriculus, inquit, æstuosus chylum gignit nidorulentum & semiputrem: ex prava chylosi non fit laudabilis hæmatosis: impurum sanguinem carnes non trahunt: ita suo genio & viuifico nectare defraudatæ, refrigerantur, quia tantum habemus caloris quantum sanguinis: venæ autem impuro sanguine oppletæ, turgent. Hinc iracundia, accensis & putrescentibus succis, prohibita transpiratione. Huius membri dignitatem ostendunt etiam hæc Hipp. verba, ex libro de humoribus circa medium accepta: *Quemadmodum arboribus terra, ita animalibus ventriculus, nutrit & calefacit, & refrigerat, & sect. 3. lib. 6. epid Ventris segnities omnium confusio vasorumque impuritas.* Ex quibus colligimus, quoties vel minimùm afficitur vētricus, vel diuturna officij vacuitate ignauior redditur & quasi sui immemor, corruat statim & labatur naturalis œconomia: cuius constitutionem ab hæmatosi pendere certissimum est: quæ quidem vix vnquam malè fieri potest, modò ventriculus cibos conuenienter appetat, deuoratos retineat, retentos concoquat & immutet, ac tempestiuè expellat quæ expellenda veniunt. Quæ munera multi affectus quibus est hæc pars obnoxia, vel diminutè, vel abolitè, vel deprauatè lædunt.

De prog.inappetentia vel cibi fastidij.

C A P. VI.

QVandoquidem non contingit animalibus quod & plantis, ut suo cibo semper hæreant: ideo natura sagax & providens, siue potius autor naturæ, animalia quadam particula muniuit, quæ sensum defectus alimenti haberet. Quæ nulla alia in toto animali, quàm stomachus esse potest, qui ob id constitutus est ex portione neruorum sextæ coniugationis. Læditur itaque animalis appetētia (ut ante ea dictum est) aut diminutè, aut abolitè, aut depravatè. Duorum priorum modorum varij sunt gradus: aut enim æger ita abalienatur à cibo, ut mori malit quàm aliquid gustare sustineat: aut quædam requirens, oblata fastidiosè respuit: aut denique nihil appetit, gustat tamen nonnulla. Cuius inappetentiæ, siue primaria affectione ventriculi, siue per consensum fiat, tot sunt causæ, quot in fame per contrarium coïre necesse est. Vna est minima inanitio, ut in frigido sicco habitu senum: altera languidus venarū suctus, ut in resoluta aut imbecilla facultate alente & naturali hepatis. Hæc enim facultas cum per venas mesaraicas (quibus tanquam manibus iecur utitur) amplius alimentum non trahit, nec suctus

nec suctus sensus ullus est, tunc grauissimæ inappetentiæ sequuntur. Tertia inappetentiæ causa est laxatio ventriculi ab humore calido in ipsum effuso. Quarta est extinctio suctionis sensus in ore ventriculi, vt in moribundis. Additur quinta à deprauata animali facultate, vt phreniticis. Quibus suppositis, non erit difficile, ex hoc symptomate prognosticum colligere, vt illa sit grauior & periculosior inappetentia, quæ à grauiori causa & periculosiori morbo sequitur, hoc in primis etiam supponendo, quòd nec ex integra, aut parum violata appetentia, de salute; nec ex deiecta, de morte statim sit præsagendum, sine aliorum superuenientium signorum additione: hoc quoq; in hoc symptomate considerandum venit, vt quemadmodum progrediente morbo ad salutem, vis appetendi paulatim reuiuiscit; ita inclinante ad exitum, paulatim elanguescit. Inappetentia in conualescentibus, qui quamuis nihil appetant, gustant tamen nonnulla, minatur recidiuam. Inappetentia siue anorexia, quæ alui profluuium coniungitur, lethalis æstimatur, inclinante malo ad exitum. Nam in quo multum ali corpus repararique celeriter debet, si natura quod sibi deest non sentit, vel impedita, vel extinctioni propinqua, ieiunitate, siccitate & inopia conficitur. Calorq; natiuus pabulo defraudatus, extinguatur.

M

De prog. appetentia deprauata.

C A P. VII.

Quemadmodum natura ad propagationem conseruandæ speciei, genitalibus membris quandam molestiam seminis retenti indidit: ita ad conseruationem indiuidui, alimenti necessarij sensum in ore ventriculi impressit. Cuius defectus querimonia, fames nuncupatur: quæ vel naturalis est, non pendens ab aliqua causa præter naturam, sed à sola suctione vasorum, partibus scilicet nutritioni dicatis, integris, & suo munere perfurgentibus: vel innaturalis, qua vel plura alimenta quam ventriculus conficere possit, expetuntur; vel absurdi alij cibi deuorantur: in illa fame deprauatio est circa quantitatem, in hac circa qualratem: hæc pica Latinis, citta & malacia Græcis dicitur, qua non cibos, sed prauas qualitates expetunt ægri, vt acida, acerba, acria, carbones, gypsim, &c. Illa canina appetētia & bulimus appellatur; quamuis canina sit generalior, bulimus magis particularis, habens deliquium animi. Quoad prog. canina appetētia & bulimus, quia habent causam magis vel minùs frigidam (vt intemp. frigidam, pituitam acidam, humorem melancholicum, superius orificium ventriculi corrugantem sua aciditate) vix vnquam morbis acutis

tis contingunt. Conualescentes autem plura appetunt, quàm conficere possint, duabus de causis: vna ob triplicis substantiæ deperditionem, & atrophiam in morbis diuturnis; quæ inanitio post adipem & carnes, ad solidarum partium natium humorem conuertitur: altera est excitatus suctionis sensus in ventriculo, à vitioso humore acido, vt in hac appetentia canina.

In omni igitur tali inconsueta appetentia, cibo non refici malum pronuntiat Hipp. aph. 3 1. lib. 2 & recidiuæ signum. Alimenta enim superfluè ingesta, quia cruda, non nutriunt, quia multa, grauant. Si verò perspirationem impediant, spiramenta obstruendo, calorem extinguunt, aut prauum humorem regenerant, & relictum augent, vnde recidiua. Auget naturæ infirmitatem, mutatio infensa naturæ, ab otio ad negotium, vt ait Hipp. libro de dieta in acutis, ex quibus confirmatur veritas aphorismi illius, *quæ longo tempore sunt extenuata corpora, lente reficere oportet.*

Desinit canina appetentia in celiacam affectionem, aut in dysenteriam, vt ait Paulus, aut in aquam intercutem. Si ad consuetudinem vomendi peruenerint ægri, cùm alios ingerant cibos, prioribus nondum confectis, atque si diutius perduret & in bulimum permutetur, interdum in soporem, aliàs ad mortem terminatur.

Malaciæ prognosis , alia in grauidis , quæ ferè à conceptu circa quadragesimum diem , in nonnullis ad quartum mensem vsque durat : alia in pueris & puellis colligitur ; in illis certo tempore , partim vomitione , partim coctione , partim quia grandiore facto fœtu , plurimo alimento indiget , finitur ; in his verò quia à corruptione in toto corpore , quæ ori ventriculi communicatur , contingit , in febrem syncopalem , quam vulgo humorosam vocant , desinit , cùm animi deliquio & virium exolutione , multo & crasso humore , ex multis cruditatibus in ventriculo redundante , qui caloris meatus intercipit & curationem difficilem reddit , virtute necessaria purgationi repugnante. Coniungitur necessario virium exolutio & infirmitas sanguinis corruptioni , propter spirituum & humorum paucitatem & prauitatem. Sunt enim vires in spiritu & sanguine ac partibus solidis , nihilque ferè aliud est natura quàm partium solidarum virtus.

De prog. à siti præter naturam.

C A P. VIII.

Quia eius partis est potionis penuriam percipere , cuius & cibi præfagia quæ sumuntur à siti non naturali , ponenda erant post famem.

mem. Quemadmodum ergo sitis, quā naturaliter stomachus incitatur ad potionis appetentiam, sequitur cibi solidioris assumptionem (cuius usus potissimum esse putatur, ut tãquam vehiculum cibi distributioni subseruiat, non ut resolutionem partium humidarum reparet) ita sitis præter naturam sequitur ad intemperiem calidam & siccam excedentem, qualis est in febre biliosa. Est autem sitis eiusmodi duplex: Vna superficialia, arescente tantum œsophagi ductu, aut incalescente, per quem humidum ex ore in ventriculum fertur. Quam sitim Hipp. sect. 3. 6. epid. appellat leuem & paruam, quæ neque in vniuerso corpore fiat, neque à magna partium affectione. Altera vehemens & inextinguibilis, qualis est in ardētibus & acutissimis febribus, in quibus lingua est perarida. Excitatur enim incendio febrili in toto corpore æstuate, & potissimum in ventriculo, pulmone, & ieiuno intestino, aut humore falso vel bilioso ventriculi tunicas perstringente. In hac æger calore & siccitate arescens, aut calidi & acri humoris morfu vellicatus, quāuis aquam gelidam bibat, releuari quidem aliquantulum potest: sed tamen expleri & satiari non potest. Illa faciliè tum sedatur, tum reuertitur sine periculo, nam ante somnum excitata, per somnum quiescit, sanguine intrò recurrente, & humescentibus interioribus. Ex somno autem orta

vapore calido cibi qui concoquitur, aut vino meraciori in cœna sumpto, per vigiliam vacuato ventre & vapore illo discusso, sedatur. Hæc ad prognosim erant prænotanda; ad quam pertinet etiam scire, ardentes febres & biliosas (quarum potissimum est hæc sitis) non semper siti respondere, ut in inflammatione oris ventriculi, quod magis arefcit, quàm cor aduratur. Sicut etiam in nonnullis febribus, ubi venter abundat humiditate, aut facultas sentiens extinguitur, minor est sitis, quàm pro febris ratione.

Ergo sitis, quæ in ardente febre paulò ante inexplebilis fuerat, sine artificio medici quicuisse videtur, manente febre cum lingua sicca & aspera, signum est, vel mentem laborare, vel facultatem sentiendi in ventriculo esse extinctam, per aph. *Sitis in acutis quæ citra rationem soluitur, omninò mala.* Minùs tamen malum est, si solum ad tempus sitire desinat æger, aut minùs fiat, quàm pro ratione febris, impedita tantùm non emortua appetendi facultate: perniciosissimum si potum & cibum omninò aduersetur. Est enim signum extremi langoris, in facultate naturali hepatis. Vtrùm autem eiusmodi sitis solutio falsò credita, pendeat à læsione mentis (quæ spem salutis omninò non adimit) vel ab extinctione caloris natiui & facultatis (quæ planè lethalis est) alia signa superuenientia ostendunt,

dunt; qualia sunt sudores diutissimi & perseuerantes frigidi, quibus extrema non recalescunt, sed liuida & frigida remanent; vrinæ nigræ, tenues, & paucae; alui suppressio; surditas confirmata; vigiliæ; lingua sicca & arida. Quæ omnia inualescentis morbi signa sunt, & naturæ fatiscentis. Quòd si æger modò sit expers sitis manente causa, modò vehementer sitiat; ea vicissitudo indicat suctionis sensum non fieri, aliò distracta mente & læsa, quæ per interualla tantum speciem apprehendit, prout magis vel minus vrgetur à causa sitifera. Idem enim in his contingit, quod in phreniticis, qui die ac nocte integra vrinam retinent, mente scilicet non apprehendente corporis affectionem, nisi vbi collecta magna vrinæ copia, ita distendit, aut irritat vesicam, ut mens ad se redeat. Non obmittendum quod quæri solet, utrum sitis defectus sit peior, quàm defectus appetitus. Respondetur, in morbis longis non appetere deterius est, quàm non sitire: in acutis contrà, in quibus ut plurimum est causa sitis.

De prog. lesionum primæ concoctionis.

C A P. IX.

PRIMA concoctio, (quæ nihil aliud est quàm caloris naturalis vetriculi actio, ad æquan-

dos cibos, vt alere possint, & in sanguinem conuerti, simulatque in iecur peruenerint) læditur diminutè, abolitè & deprauatè, aut per proprios ventriculi morbos, aut à vitiosis humoribus in ipso accumulatis, aut ab alimentorum qualitate. Diminutè quidem & abolitè, per frigidam intemperiem ventriculi, siue simplex sit, siue cum humore coniuncta, siue primaria eius affectione, siue per consensum cum aliis partibus, sit contracta. Hinc oritur vitium, quod Latini cruditatem appellant: quo nomine absolute hanc læsionem intelligimus, a pepsiam vocant Græci, cum coctionis adest omnimoda priuatio; dyspepsiam, cum sola imbecillitas & tarditas, quam imbecillitatem seu coctionis priuationem, sequitur lienteria & cœliaca passio: differunt enim sola maioris minorisque ratione. Deprauatè autem læditur hæc coctio (quod vitium Græci bradypepsiam dicunt) ab intemperie calida ventriculi, ab eius inflammatione, ab vlcere, ab aphthis, &c. hinc cholera morbus appellatus, diarrhœa, & alia alui profluvia, quæ etiam intestinorum affectus dicuntur.

De prog. lienteria & cœliaca affectionis.

C A P. X.

Lienteria & cœliaca passio, diminutæ & abolitæ coctionis sunt symptomata. Differunt

runt enim, vt dictum est, solum secundum magis & minus. Vnde Paulus Ægineta confundit lienteriam cum cœliaca passione, in qua tamen tanta cruditas non est, vt alimenti assumpti species apertè internoscatur. In cœliacis enim, alimentum quidem liquatur, sed nec integrè coquitur, nec distribuitur, ob idque per aluum ex medio chylosa descendunt, ex anadoseos interceptione. Differt etiam lienteria à diarrhœa, in qua humor deiicitur syncerior, vt biliosus aut pituitosus. Quæ distinctio facit ad prognosim, sicut causarum lienterix cognitio. Non igitur apud Hipp. lienteria semper est lenitas superficie internæ intestinorum, quæ cum rugosa esse debeat, à pituita hærente lubrica reddatur: sed potius est velox à ventriculo & intestinis alimenti incocti nec liquati exitus: vnde sequitur vt eiusmodi festiuus exitus causa sit cruditatis, non cruditas exitus intempestiui, siquidem coqui alimentum non potest, quia conuenienti tempore non retinetur. Alia ergo causa inuestiganda est, quæ nulla alia esse potest, quam imbecillitas cibi continendi, cuius tres præcipuas causas assignat Gal. comment. in aph. 12. libr. 4. in aph. 22. libr. 3. & comment. ad sent. 36. sect. 2. lib. 1. epid. Vna est intemperies frigida & humida ventriculi, & intestinorum. Altera est pituitosa è cerebro defluxio. Tertia exulceratio summas ventriculi partes occupans. Quibus

omnibus causis ventriculi munus retinendi debilitatur. Nam si ventriculus villorum beneficio, & siccitatis atque caloris, quo contrahit villos, temperamento, suo retinendi officio fungitur: sequitur ut vel impediatur, vel deficiat. Primò opposita intemperie frigiditatis & humiditatis, quæ vel adhuc fit, vel facta est & hæctica. Secundò pituitosæ defluxionis acidæ aut falsæ occasione; quæ vel intemperiem illam imprimit, ex qua resoluitur facultas retentrix; vel acrimonia admixta, irritat intestina ad præcipitem exclusionem; vel lubrica fluxaque conditione substantiæ, delabi facit alimentum. Tertiò exulcerationibus superficiem internam ventriculi occupantibus, quæ ut in stranguria vesicam, sic ventriculum & intestina ad exclusionem cibi præcipitem irritent. Quibus causis prænotatis, facilè est prognosim colligere, ita ut ea lienteria sit periculosior, quæ à deteriori causa oritur. Nam quæ malignam & venenatam causam habet in ventre, ut phlegmonem, vlcus, hæcticam intemperiem, quæ diuturna est & cum dolore, ac ventris tortione (diuturnitas enim ostendit causæ efficientis pertinaciam, sicut dolor flatus exitum non habentes, aut acrem humorem) talis inquam lienteria in malo est, nisi abscessu ad partes infernas finiatur, per aph. coac. *In lientericis dolores tormine soluti, quæ sunt circa articulos in tumorem attollunt; aut in hydropem*

dropem definit, si confirmetur. Lienteria, quæ ex catarrho acri & mordente, ut sero bilioso, aut pituita falsa excitatur, per se quidem non admodum maligna est: nam ut ait Gal. cōment. in aph. 1. lib. 6. Lienteria, quæ propter humorum acrimoniam, totius ventriculi & intestinorum abrasa fit superficie, si quidem humorum malignitas, adstringente tum potu, tum cibo, cessaverit, citissimè curatur. Si verò longiori tempore perseveret, in dysenteriam & intestinorum difficultatem mutatur: sicut dysenteria interdum in lienteriam, confirmata intemperie, & contracto iam habitu solutu difficili transit.

Lienteria cui coniungitur difficilis spiratio, & punctura pleuræ, ita ut vel hæc duo illi superueniant, vel his lienteria, aut simul inuadant, in tabem definit, per aph. *Lienterica vitia cum difficili spiritu, in tabem desinunt.* Quomodocumque accidat lienteria ex his modis res periculi plena significatur. Nam ex copia prauæ & acris è capite distillationis, cuius bona pars per guttur in asperam arteriam, pulmones, & pleuram illabitur, tabidas affectiones factura; alia portio in ventrem irruit, ubi tortiones & morsum excitat, & lienteriam facit, periculum colligimus. Si quidem humorum defluentium morsu & acrimonia, punguntur membrana thoracis, copia pulmo opprimitur, unde difficilis spiritus & punctura. Atque in superficie exasperantur intesti

intestina, ac aphthas quasdam patiuntur; unde alimentorum sine ullo coctionis rudimento exitus, non sine sensu mordicationis. Certius erit præsagium, si neque ex illo alui profluuium allevatio vlla sequatur; neque defluxionis ullus finis fiat.

De progn. cholera morbi.

C A P. XI.

Primam coctionem quæ in ventriculo perficitur deprauari in intestinis, ostendit illud symptoma deprauatæ expultricis, quod cholera morbum appellant. Nam excrementa quæ eruda sunt & phlegmatica, nisi putrescant, tantam vehementiam, quanta fit in cholera, non possent excitare. Cholera morbus igitur (in quo vomitus alicui profluuium coniungitur, propter acrimoniam & redundantiam humorum circa ventriculum & intestina, atque è toto corpore ad ventriculum & intestina confluxum, symptomatica excretio est, sæpe sine febre, aliquando cum febre, quod est malignum. Non enim larga illa utrinque vacuatio expurgando satis est: sed pars materiæ in venis putrescit, unde febris. Atteruntur itaque vires, & labefactantur, tum à febre, tum à cholera; malis ægri rebus. Sola namque cholera satis esset, ut proiectis viribus, paucis diebus vitam adiuuat. Augetur
suspi

suspicio, si cholerae superueniat malum circa fauces, assidua scilicet vomitione vel acri exhalatione è corpore aut à maligna distillatione à capite: si extremorum perfrigeratio, singultus, corporis prolapsus, & agitatio, pulsus paruus, frequens, vermiculans, formicans; si voces effractæ, abruptæ & ferè præcipitatæ ab imbecillitate naturæ efflationem facientis, quam facit superpurgatio; si conuulsio denique consequatur, quæ quia ab inanitione, lethalis est. Non est hic silentio prætereundum quod scribit Hipp. in coacis hoc aphor. *Lipyras febres non solui, nisi cholera superueniente.* Quod tamen difficile putat Hollerius in Comment. Tum quia in illa febre, viæ quâ bilis & excrementum corporis in intestina decurrit, præclusæ sunt: tum quia præclusi sunt etiam ductus, quibus alimentum è ventriculo & mesenterio in portas hepatis transluit. Ex quibus colligit difficile & rarum esse, vt lipyria febris cholera finiatur. Fieri tamen posse, si modo morbus sit salutaris, vires validæ, impetum materiæ concitatæ sustinere potentes, viarumque libertas per quas fiat corruptorum, crudorum, multarumque bilis pallidæ, flauæ, vitellinæ & eruginosæ, per vomitum & alui fluxum, liberalis expurgatio. Iacotius verò existimans lipyriæ febris causam inflammationem partium internarum, vt cimarum hepatis, &c. optimè tam ex loco affecto, quàm ex materia colligit,

lipy

Ipyriam cholera solui, alioqui interficere; Cholera nomine non morbum illum acutissimum, in qua vomitus & deiectio simul sunt, intelligēs; sed in quo materia per aluum expurgatur, nomine ab intestinis deducto.

De progn. diarrhæe.

C A P. XII.

Diarrhœa propria significatione accipitur pro illo fluxu, quo aluus profusè fertur, liquidis excrementis, seu prauis humoribus, qui ex toto corpore vel ex aliqua eius parte in aluum defluunt & vacuantur. Differt à lenteria, quòd hæc semper symptomatica est, & in malis habenda: Diarrhœa verò sæpè salutaris, & in morbis plerumque iudicandi vim habet.

Solet diarrhœa morbis superuenire criticè, vel symptomaticè, quatuor modis. Primus est cùm manifesta occasione, pleniore cibo vel potu sequitur, quod genus excretionis nullam humoris morbifici certam speciem repræsentat, nec morbi morem vllum ostendit: vnde colligimus, quia ab externa causa, non vi morbi contingit, non multum conferre ad præsagium. Alter modus symptomaticus est, in quo circa principia aut incrementa, ante signa perfectæ coctionis, à natura non mouente, sed coacta,
aluus

aluus deturbatur; qui modus, si nec febrem remittat, nec augeat, morbi diuturnitatem minatur. Tertius modus est planè lethalis, cùm scilicet feбри, vel primariæ, vel cum inflammatione alicuius visceris copulatæ, quæ ad summum iam pervenerit, diarrhœa superuenit, ita ut in consortium mali hepâr & ventriculus adducantur. Tunc enim signum est neque ampliùs ab hepate alimentum trahi, neque probè in sanguinem conuerti, neque à ventriculo concoqui. Quod non nisi progresso morbo & aucto fieri potest. Quartus modus criticus est, viribus naturæ excitatus, cum signis coctionis perfectæ præcedentibus, & symptomatum omnium remissione.

Morbi autem quibus alui profluuium vel criticè vel symptomaticè superuenire solet, sunt capitis, ophtalmia, pleuritis, peripneumonia, tabes, febris ardens, phlegmone hepatis, hydrops, internæ inflammationes & cætera. De quorum prog. secundùm nostrum institutum, pauca dicemus. In morbis igitur capitis, ait Hipp. libr. de morbis, *Aluum deicere multa & liquida iam morituris. Alioqui aluus in illis ferè semper adstringitur, ut in apoplexia.* Non enim excernuntur biliosa in pituitoso morbo, nisi accesserit vitium hepatis & ventriculi, in quo calore febrili & corruptione alimenti biliosa generantur.

Ophthaliæ bonis ægri rebus sæpè superuenit

nit alui fluxus, siue arte siue natura motus, per aph. *Lippieti alui profluuiū sponte natura motum utile.*

Parotidibus quæ non suppurantur (de quibus suo loco) interdum remedio est diarrhœa. Pleuritidi quandoque vtiliter superuenit alui fluxus, duobus modis: vno in morbi principio, ad materiæ antecedentis auersionem & expurgationem, vnde Hipp lib. de aere loc. & aquis scribit, *Rarò obnoxios esse pleuritidi, quibus aluus natura humidior est*: altero in progressu circa statum; modò signa coctionis in vrinis & sputis appareant, noxiùsque humor expurgetur, & maxime si leuiter morbum ferat æger, per aph. *Quibus febribus dolores lateris fiunt, iis alui multa aquosabile permixta deiciente remissio est, alias inutilis valde* Est enim diarrhœa in omnibus morbis thoracis vt plurimum noxia, per aph. *pleuritide aut peripneumonia detento diarrhœa superueniens malum.* Tabidis diarrhœa succedens, semper ferè lethalis est, & maxime si in statu, & iam progresso morbo contingat & diutiùs perseueret; siue à resoluta facultate ventris, siue ab acri & tenui sanie eò confluente, fiat: nihil quicquam enim de materia coniuncta educit, & vires iam fractas prostermit: In principio autem, aut etiam incremento, prodesse posse æstimatur, materiæ antecedentis expurgatione, modò diutiùs non perseueret.

Damnatur diarrhœa liquida & pallida superue

perueniens in febre ardente. Significat enim multam cruditatem, & virtutis naturalis infirmitatem, efficiturque tam multa deiectione, ut vires totius corporis exolefcant. Alui fluxus in phlegmone hepatis superueniens, magna ex parte suspectus est. Hepar enim inflammatum quandiu firmum adhuc est & robustum, immodicè fugit alimentum & adurit. Quod si ad phlegmonem accedat hepatis imbecillitas, quæ excernuntur per aluum sunt varia. Nam si alimentum hepar non trahit, chyli speciem referunt: quo differunt ab excrementis ventriculi affecti, quæ in chylum non mutantur. Si verò trahit quidem, sed non retinet, saniosa sunt & ichorodea: interdum cruēta, reſeratis venis meſaraicis. Quod alui profluuiū maximè prauum est. Omnino verò lethale redditur à colliquatione, & resolutione hepaticæ facultatis, propter igneam dispositionem oris ventriculi, & ſimarum iecoris. Quæ partes maximè omni m cordi communicant, alimenta vrunt, & marasum inducunt.

Diarrhœa denique hydropi utilis eſtimatur, ſi aſciti & leucophlegmaticæ ſuperueniat per aphoriſmum: *Si quis alba pituita detineatur, eiſque alui profluuium ſuperueniat, morbum ſoluit.* Modò vires ſint integræ, nec adhuc contractus ſit corporis malus habitus & cachecticus. Et in ſūma, notanda eſt ad prognofiſim, de omni alui proflu-

N

uio, hæc generalis distinctio. Omne scilicet malum esse, quod nihil iuuat: pessimum, quod non modo nihil iuuat, sed etiam ægrum auget symptomatis. Contra verò criticum esse atque utile, quod antegressis coctionis signis exoritur, humorem noxium vacuat, ægrum leuat; multoque adhuc certius, quod die critico incidit, & die iudice præmonstratum est.

De prog. dysenteria.

C A P. XIII.

DYsenteria nomine generaliter sumpto, quamlibet cruentam alui deiectionem intelligimus. Quamuis propria significatione illud nomen ab intestinis sit deductum: non ab vno tantum, ut cholera, & iliaca, sed ab omnibus: hinc duo constituuntur dysenteria summa genera. Vnum quod fit ulceratis intestinis superioribus, vel inferioribus: quod genus propria appellatione (ut dictum est) dysenteria intelligitur. Alterum est in quo cruor excernitur per intestina, sine tamen eorundem affectione: qui sanguis aliunde venit, ut ab hepate propter eius infirmitatem & resolutionem, quam dysenteriam hepaticam nominant, in qua sanguis qui excernitur, similis est loturæ carniū recēs mactatarum: aliquando manat à toto corpore: quæ

quæ dysenteria iis facilè accidit, quibus suppressa est insignis aliqua euacuatio sanguinis, aut qui sunt aliquo mutiles membro, nihil de cibo, aut potu deducunt, præsertim si in otio uiuant. Gal. 3. de symptomatum causis, quatuor cruentarum deiectionum species numerat. Vna est quam venosam dicere licet, ex immodico, sed minimè noxio sanguine, in qua repentè multum sanguinis reiicitur, adaperto nimirum vasis osculo. Et ob id ab Hipp. dysenteria hæmatodes nuncupatur. Altera propriè dicta, ab intestino vlcerato. Tertia atrabilaria, ex adusto in hepate sanguine, aut ad crism referuato. Quarta propriè hepatica est, in qua prærubra illuies excernitur: aliquando purus sanguis, sed non multus, interdum cum flaua bile commixtus: aliquando suppressione & æstu, velut fæx sanguinis exit. Et quoad prog attinet, ex his dysenteriarum speciebus, aliæ sunt omninò symptomatice & lethales per se, vt quæ ab atra bile, per aph. 24. lib. 4. *Dysenteria si ab atra bile incipiat, exitiosa.* Quoniam atra bilis acerrimos habet morsus, totumque erodit intestinum, & vlcus quod speciem præ se fert carcinomatis in eo excitat, & omne carcinoma est insanabile. Aliæ dysenteriarum sunt criticæ & salutare per se, ex euentu tamen possunt esse exitiales: vt quæ febribus acutis superuenit in senibus. Ea enim senes non minùs quàm iuuenes, aliquando hæ-

morrhagia liberantur, ex constitutione tertia lib. i. epid.

Dysenteria quæ lienosis accidit critica æstimatur, per aph. 48. libr. 6. *Lienosis difficultas intestinorum superueniens, bono est*, modò diuturna non fit, & lienteriam non adferat, aut hydropem, ex Gal. comm. in aph. 43. libr. 6. Salutaris quoque est dysenteria cruenta, quæ plethoricis aut mutilatis altero crure, aut mulieribus quibus suppressi sunt menses, contingit; si modò brevis sit & fugax, si nec appetentiæ deiectionem, nec lienteriam adferat, & in ea alius rarò & multum feratur. Quæ enim diuturnior est, etsi per se erat salutaris, euentu tamen fit lethalis & insanabilis; quoniam diuturnitate, & doloris acerbitate, frangit vires, & frequenti deiectione, naturalem facultatem, & vim intestinorum retentricem labefactat: quemadmodum quæ inappetentiam adfert, sinister est iudicij: denotat enim vitium ab inferioribus ad superiores partes ascendisse.

Dysenterix quoque alia superueniunt symptomata, quæ eandem funestam ostendunt. Qualia sunt larga sanguinis effusio, ab ulcere altius penetrante, conuulsio ab inanitione, singultus, vomitus, delirium, hydrops, lienteria. In hanc enim transit dysenteria confirmata intemperie, & contracto iam habitu solutu difficili.

Iudica

Iudicatur tandem dysenteria magis vel minùs periculosa , spectata excretorum natura. Nam quæ pingua tantùm sunt, periculo adhuc carent, curabilémque affectum significant: quæ ramētosa, non ita facilem, sed non desperatum. Quæ verò carnosa & ex magna portione intestini abraſa, lethalem significant.

Finitimus est huic affectui tenesmus, quem irritationem recti intestini dicunt, qui si à causa interna pendeat , plus minùs calamitosus esse dicitur. Doloris enim acerbitate, & desidendi assiduitate, somnũ adimit, cor & corpus facit infirmum , successionesque habet periculosas; Dysenteriam nempe, eámque pessimam; per affluxum corruptæ pituitæ, & exulcerantis; diarrhoeam & lenteriam , quæ ægrum ad exitium præcipitant ; stranguriam, per sympathiam partium urinx excretioni dicatarum; abortum, per aph. 27. libr. 7. Quia rectum intestinum in consortium suæ affectionis trahit vterum. Sæpè etiam ex neglecto tenesmo , vlcus relinquitur sordidum & purulentum, & tandem in fistulam ægrè remedijs cedentem vertitur. Visus est aliquando autumnò tenesmus magna ex parte contagiosus, maximè pueris, quibus tandem in dysenteriam lethalem est versus.

C A P. XIII.

Nihil magis sanguificâdi opificium labefactat, quam cum excrementa primæ concoctionis, per consuetas vias & ordinarias tempestiuè non excernuntur: quod in ileo seu voluulo contingere consuevit, in quo tanta est vomitus assiduitas & vehementia, vt neque potum continere possint ægri: & (quod deterius est) nihil infra deiiciant, præclusa scilicet via inferiore. Sæpissimè quidem ab inflammatione, modò tenuia & superiora intestina, modò crassa occupante. Interdum ab abscessu duro, aut ruptura peritonæi, prolapso in scrotum intestino. Rarissimè, à multitudine crassorum, & crudorum humorum obstruente. Cui febris remedio est. Vnum est eius signū maximè proprium & inseparabile, nihil scilicet infra descendere, nisi fortè quædam pauca liquida, & serosa, cum torminibus ventris & ructu inani. Quo duntaxat signo, distinguitur à colica affectione. Conferat quoque ad prognosim cognoscere, vtrum in tenuibus, an crassis intestinis sit morbus, cum longè sit periculosior affectus in illis, quàm in his. Quoniam angustiores meatus difficilius recluduntur, & nobilia viscera, hepar scilicet, ventriculus, lien, magis tenuiorum affectui consentiunt

tiunt & condoleſcunt. Eſt igitur hic morbus acutiſſimus, & ſecundo die aut tertio, acerbitate doloris & febris acumine, vt plurimùm dicitur interimere apud Hipp. Quod maximè oſtèdunt duo ſigna malo ingraueſcente ſuperuenientia. Vomitus tamen alius alio deterior eſt, pro ratione temporis morbi, in quo ſuperuenit, & eorum quæ vomitu excluduntur. Vomunt enim iliaci primò pituitoſa, poſtea bilioſa, tandem ſtercus. Nonnulli ſine vomitu ſunt: quibus minus impendit periculi. Grauis igitur cenſetur vomitus bilioſus; lethaliſ varius, niger, mali odoris. Mortis proximæ ſignum eſt, vbi vnà quoque per os ſterc⁹ reiicitur. Huius autè inordinatæ excretionis ratio, hæc eſt: facultas expultrix noxâ excrementi retenti ſentiens, contractione vehementi aggreditur excluſionem, & primùm quidè, ſeruato motu conſueto & ordine inſtituto, à ſuperiore parte inchoat contractionem; vbi nihil promouere poteſt, propter coarctationem ductuum, per iſtalticum ordinem inuertit, atque multa vi ſurſum excrementa regerit; & ita augetur exitus inferioris anguſtia, ita vt vomitione, tum alimenta, tum bilis, tum etiam ſtercus reddantur, lethali ſigno, & maximè ſi reſpiratio, ruſtus, flatuſ ventris, & vniuerſum corpus, grauiter foeteat.

De prog. doloris colici.

C A P. X V.

Propterea quod in opificio sanguificationis plurimum intestinatorum omnium ministeria subseruiūt, Benè concludimus laborantibus intestinis, hæmatosim non mediocriter lædi. Nulla autem est affectio quæ magis intestina affligat, quàm dolor. Cuius etiam partes propinquiores plurimū sunt participes. Hos dolores validos, colicos vulgus dicere solet: quamquam à parte affecta, vix vllum iudicium sumi potest, quod magis colon quàm tenue intestinum dolore affici demonstret. Verùm huius doloris frequentissimæ causæ sunt, flatus crassus, aut pituita hærens. Quæ duo in tenuibus intestinis ob membranarum tenuitatem, & adipis inopiam, facilè aut dissipantur, aut descendunt. In cæco ob eius paruitatem, locum non habent: sicut nec in recto, ob eius amplitudinem & facilem exitum. At in colo anfractuoso, crassis membranis tecto, ac multo intus adipe inæquali infarcto, means excrementum moratur & retinetur. Vtriusque materiei, flatus scilicet & pituitæ, causa intemperies est, eaque vel temporaria à recenti aliqua occasione, vel firmata & solutu difficilis. Hæc facit dolorem perseuerantem,

rantem, sine murmure, magis in tenuibus, quàm in crassis intestinis. Qui cum nullis remediis cedat, in hydropen siccum firmatur, per aphor. 11. lib. 4. Illa verò cum murmure & sonitu, solubilem dolorem efficit, flatu nēpe cum humore solidoque corpore permixto, deorsum per intestina anfractuosa & angusta, transeunte. Quorum excretionem natura molitur, vnde doloris solutio sequitur, superueniente voruorigmo.

De prog. nausea & vomitus.

C A P. XVI.

QVandoquidem nausea, vomitus & singultus superioribus ventriculi & intestinorum vitiis, ut plurimum coniunguntur. De his erat hoc loco agendum. Nausea igitur & vomitus, sunt symptomata motus concussiui ventriculi studentis rem noxiam excutere. In eoque duntaxat differunt, quòd in nausea inanis est quædam vomendi irritatio, quæ interdum citra vomitionem fit, interdum ad vomitum impellit. At in vomitu, ea quæ in capacitate ventriculi continentur & fluitant, citissimè per stomachum reiiciuntur. In utroque duo consideramus. Motum nempe concussium, à quacunque causa fiat, & humorem qui inde reiicitur. Hanc considerationem suo loco differentes, de

illa hîc agendum videtur. Quatenus scilicet nausea & vomitus sunt symptomata morus concussini, morbis acutis superuenientia: siue per se afficiatur ventriculus, siue per consensum: habent enim interdum in febribus nausea & cardialgia ortû à colliquatione materiæ quæ in venis est: interdum ab ichoribus tenuibus, qui à phlegmone partium vicinarum, in ventriculi capacitatem resudant; vnde nauseat æger, maiori vel minori molestia, pro vt multus aut paucus, post multam vel paucam perturbationem, vomitu reiicitur humor. Est autē vtrumque symptoma prauum, in morbis acutis, vt signum, & vt causa. Vt signum quidem quatenus indicat humoris malignitatem in ore vētriculi, qui non potest excerni. Vt causa verò, quatenus continuis lacerationibus, ventrem afficit, & grauitè lædit: vnde phlegmone vel generatur, vel genita augetur. Ex quibus colligimus, humores quoslibet commodiùs per aluum expurgari, quam per vomitum. Robustior enim requiritur natura in vomitione quàm in deiectione. per aph. 6. 7. 8. l. 4. vbi præcipitur robustos supra, debiles infra esse purgandos.

De

De progn. singultus.

C A P. XVII.

Singultus est etiam motus deprauatus ventriculi, concutientis sese, ut excutiat quod sibi molestum est. Cuius eadem omninò causæ esse dicuntur quæ & cōuulsionis, inanitio nempe & repletio. Addunt qualitatem venenatam. Nam cū ventriculus copia humorum opprimitur, aut acrimonia mordetur, aut flatu distenditur, aut frigore aliâque qualitate irritatur, aut resiccatur, aut reuellitur, motu concussio conuulsioni non absimili, noxam nititur expellere.

Est autem singultus ex his symptomatis quæ morbis superuenire consueuerunt, sæpius lethali signo, & maximè qui in febre laboriosa contingit. Cuius causam auget, auctam ostendit, & vires infirmas laboriosa concussione planè prostermit. Nam quomodocumque singultus fiat, magis periculosus est in deiectione virium, ut in senibus, quàm in aliis. Sunt enim tales singultus mali & lethales, siue spectes causæ magnitudinem, siue eius symptomatis vehementiam. Singultus frequentior in acuta febre, & prope continuo vrgens, malus indicatur, vnde rariò conualescit æger. Singultus inflammato ventriculo,

culo, & tenui intestino, valdè suspectus est. Damnatur quoque in inflammatione hepatis & ilei, per aph. 10. lib. & aph. 17. lib. 7. *Ab ileo vomitus & singultus, & desipientia, & conuulsio malum. & propter iecoris inflammationem, singultus malum.* Acri enim sanie lancinante stomachum, singultus & frequens vomitus mouetur. Augetur suspicio ex hoc singultu, propterea quòd à magnis duntaxat hepatis inflammationibus moueri solet; vel neruorum breuissimorum consortio, qui hepati & ori ventriculi sunt communes, vel sanie quadam & acri materia à parte inflammata in os ventriculi influente & illud com mordente; vel quia tumoris magnitudine ventriculum premit, viamque conclusis spiritibus intercipit; vel denique acri exhalatione stomachus incalescit, irritatur, & siccessit. At singultus à sola repletionem, minus est periculosus: quia euacuationibus solui potest.

De prog. ex lumbricis.

C A P. XVIII.

VErminationem vitio primæ concoctionis fieri, ostendit eiusdem generationis ratio & locus. Ex eruditatibus enim in intestinis gignuntur lumbrici: familiares facit Hipp. aph. 26. lib. 3. pueris tertiæ ætatis, quæ supputatur inter
tempus

tempus dentitionis & pubertatis : quibus ita
scatent hoc nostro seculo pueri , vt quibuscun-
que morbis teneantur , de vermibus semper sus-
picio est , & querimonia . Multi siquidem fiunt in
grandioribus & ablactatis : quia in his & mate-
ria sufficiens , & calor potens inueniuntur . Non
enim calor exiguus , nec sola putredo sufficiens
est , ad vermes generandos , ait Gal. comment in
prædictum aph. Qui calor quia in tenellis &
valde paruis non est potens , ideò in illis vermes
gigni non æstimantur . Adde quòd putredo in
tantilla ætate ante cibi sumptionem non colli-
gitur . Non enim à semine , sed à putredine fieri
vult vermes Aristoteles . Horum autem duo ge-
nera meminit Hipp. rotundorum nempe & as-
caridum . Quamuis lati lumbrici signa comme-
moret , lib. 4. de morbis . Et quamuis vermes pos-
sint gigni in omnib. capacitatibus in quibus
causæ generationis inueniuntur : in intestinis ta-
men potissimùm fiunt rotundi & longi quos tere-
tes appellant : rarò in ventriculo , ad quem ta-
men ascendunt , vbi cardialgiam & vomitum
pariunt . Sunt enim duo potissimùm symptoma-
tum genera , quæ sequuntur ad sæuitiã vermium .
Vnum ex fumis & vaporibus , qui exhalant ab
eis , ad cor & ad cerebrum . Alterum ex morfu
quem inferunt partibus vbi inueniuntur . Illius
generis sunt , animi deliquia , mentis perturba-
tio , conuulsio , epilepsia , palpitatio cordis , fe-
bris,

bris,&c. Huius verò anxietudo,alui fluxus, cibi fastidium, fames canina, fluctuatio ventris, eius torsiones, flatus, & inflatio. Quæ symptomata potissimum vermium rotûdorum in ventribus puerorum stabulantium esse dicuntur. Quibus adduntur masticationes, quæ in pueris dormiētibus aliquando animaduertuntur, quasi musculis masticatoriis imaginata quædam mordicationum lumbricorum exprimentibus. Alterum genus vermium tenuiorum & casei vermibus similium: quos ascarides, quasi perpetuo pungentes, nec quiescere sinentes, appellant: gignuntur potissimum in recto intestino, pituita putri, quæ ibi ut plurimum cunctatur; ad ventriculum nunquam perueniunt, & amaris faciliè interficiuntur. Quoad prognosim ex vermibus Hipp. 2. prognost. ex eorum exclusione in morbis acutis duntaxat, prædicit. Malum enim esse putat si superius ascendunt, & per os eiiciantur. Malum etiam si in principio morbi, cuius vi potius, quàm natura operante excluduntur. Significant enim magnam crudæ putrisque materiæ copiam, ac putridi caloris vim, in superiori intestino, presertim si viui & soli deponantur, aut mortui à malignitate materiæ. Bonum si in fine morbi ac crisi imminente, cum excrementis, viui descendant. Spem enim salutis adferunt: quia inde, & naturæ robur, & materiæ bonitas declaratur.

De

De prog. ab hæmorrhoidibus.

C A P. XIX.

QVoniam hæmorrhoides secundum Hipp. (sect. 3. lib. 6. epid. vindicant corpus à furunculis, therminthis, phagedenis, pleuritide, peripneumonia, lepra, & ab omnibus morbis melancholicis, qui cum sint corrupti sanguinis soboles, & læsam sanguificationem significant, optimo iure, secundum nostrum institutum, inter affectiones ad depravatam hæmatosim spectantes, reponuntur. Quod ex eo magis perspicuum est, quod aliæ hæmorrhoides expurgant hepatis gibbam partem, renes & totum venosum genus, euacuant à vena caua. Et hæ sunt quas externas appellant. Aliæ lienē, iecoris cauam partem, totum mesenterium per venam à ramo splenico venæ portæ ortam & ad rectum intestinum mediante mesæreo exporrectam. Quæ omnes partes sanguificationis munci sunt dicatæ.

Conueniunt hæmorrhoides omni homini, ætati, & tempori. Eas tamen Hipp. aph. 30. lib. 3. sextæ ætati, quæ numeratur à Gal. à 35. anno ad 49. proprias facit. In qua ætate plurimum humoris melancholici (cuius hæmorrhoides sunt soboles) cumulatur. Fiunt enim rariùs à sanguine,

ne, sæpiùs ab atra bile & melancholico humore qui ad venas sedis copiosius irruit. Et sic plethoram & cachochymiam deplere dicuntur. Vnde de duobus modis prodesse, & totidem obesse æstimantur. Profunt quidem aut ratione euacuationis tantum, ut in plethoricis; aut ratione euacuationis simul, & humoris qui euacuatur qualitate, ut in melancholicis, per aph. 21. lib. 6. *Melancholicis hæmorrhoides superuenientes, bono sunt; & insanis si varices aut hæmorrhoides superuenerunt, insanie solutio.* Profunt quoque apoplecticis si à sanguine, aut atra bile fiat apoplexia, per aph. coacarum: *Apoplecticis hæmorrhoides supernate, vtile.*

Obsunt verò sanguinis immoderato profluvio præsertim si floridus fuerit sanguis, & in his qui non multum humoris melancholici cumulant. Obsunt etiam suppressione & adstrictione ex toto, ne vna quidem servata. Illuc, idest, immoderato fluxu, aut repente homo tollitur de medio, aut in hydropem, vel cachexiam, & malum habitum incurrit. Hic verò insanabiles morbi & vari superueniunt, pro varietate partium, quas refluens sanguis appetit; & pro humoris melancholici varia putredine, vstione, acrimonia; nisi occurratur aperta vna hæmorrhoides, aut bilis atræ purgatione. Frequentius tamen hac suppressione & facilius hydrops aut tabes consequi solet. Quia cum venæ illæ in sede

fede propter plenitudinem apperiantur, ad quas fœculentus sanguis reiicitur à iecore : si via illa præcludatur, iecur scirrhum contrahit, & multitudine ac crassitie opprimitur, vnde calore ipsius paulatim debilitato, & quasi extincto, generari bonus sanguis non potest, frustratâque hæmatosi aquam intercutem facit. Eadem ratione cum iecur plenitudinem in venas pulmonis protrudit, ex qua vas aliquod rumpitur, tabes generari solet. Proinde, priusquam hi morbi euenerint, maturè occurrendum est artificiosa euacuatione, quæ fit aut venæ sectione, aut medicamento, aut (quod tutius est) hæmorrhidibus reſeratis. Vbi verò iam facti sunt, liberantur ægri, si hæmorrhoides superueniant, aut si vna aperta relicta sit. Dux tamen sunt huius generis affectuum species, quibus nec hæmorrhoides, nec purgationes artificiosæ possunt mederi. Vnū est in quo habitus intemperiei partibus impressus, sanguinem vitiat, & accedens alimentum corrumpit; vnde perennis corruptæ materiæ generatio sequitur: vt in elephantiasi, cui cum fieri incipit, hæmorrhoides profunt; quia à superficie & centro corporis, melancholicum humorem in venas recti intestini deriuat. Cum verò facta est, & habitualis hæmorrhoidum fluxio, morbi malignitatem sequitur potius, quàm naturæ expellentis robur. Alterum genus morbi, in quo prædictæ euacuationes nihil conferunt, est vis-

O

ceris alicuius corruptela , aut pravi humoris
fæx, & infixus seu in spongia vapor, aduenien-
tem sanguinem corrumpens; non secus atque
modicum fermentum alimoniam inficit: In quo
hæmorrhoides quidem vitiosam materiã edu-
cunt, affectum tamen sanare non possunt, ma-
nente totius mali fomite.

*De progn. læsæ sanguificationis à vitiis partium
vrinæ dicatarum.*

C A P. XX.

Dictum est antea renes & reliquas partes
vrinationi dicatas, eatenus sanguificatio-
nis operi ministrare, quatenus sero secernendo
& expellendo sunt dicatæ. Quod opificium,
cùm quarumlibet supra dictarum vitiis, malè
fiat, ex his hæmatosim lædi plus minus, propin-
quius vel remotius, existimamus. Totum igitur
vrinationis munus, in omnibus suis partibus na-
turale est, excepto musculo cervicis vesicæ.

Primi enim renes operantur, qui quandiu be-
nè habent, sanguinem suo seroso excremento
purificant. Secundò adfunt duo vreteres, qui
meatus sunt seu tubuli, è renibus obliquè ad
vesicam tendentes, per quos secum illud ad ve-
sicam descendit. Tertio loco interuenit vesica,
quæ vrinam excipiens, & quodam tempore re-
tinens, tandem eiusdem morsum, molem &
pondus

pondus sentiens, excitatur ad naturalem, voluntariam, aut etiam inuoluntariam excretionem. Quartò præsto est musculus in ceruice vesicæ existens; qui cùm obliquus sit, & fibris obliquis nitens, arbitrario motu meatum claudit; & ita eiusmodi musculi actione & contractione, ab electione pendente, vrina retinetur, otio & laxitate effluit. Quintò & vltimò occurrūt musculi abdominis, maximè medij, compressionem iuuantes: vnde fit, vt cùm vrina vel deiectiones supprimuntur, hos musculos manibus comprimamus. De vitiis igitur omnium prædictarum partium, à quibus lædi cōsuevit hæc vrinationis operatio, ordine est agendum.

De progn. læsæ actionis renum.

C A P. XXI.

Renum propriam, & peculiarem actionem paulò ante diximus esse sanguinis expurgationem, & serosæ portionis ab eo secretionē. Quæ operatio aut diminutè, aut abolitè, aut deprauatè læditur. Duobus quidem primis modis, renibus debilitatis, non fit feri debita attractio, aut attracti expurgatio. In postremo copiosius trahūt renes. Vtrumque sequitur ad varia morborum genera, variæque causas. Maximè ad magnam aliquam intemperiem, extenuationē, meatuum dilatationem, & carnis relaxationem.

In tribus postremis , quia imbecillitatis (quæ sola est doloris experta) sunt effectus, nullus dolor percipitur, nisi rarò & per accidēs. In intemperie autem vix dolor abesse potest, nisi hæctica fuerit. Morbi autē renum, secundum Aræteum, aut sunt acuti aut longi. Acuti semper habent febrem comitem. Imò in febribus plerunque dolor circa renes oboritur : quia incalescunt propter decubitum , aut partibus pinguioribus incenduntur, à calore febrili. Interdum à feruēte sanguine , in magna vena & arteria , ac redundante. Nonnunquam à musculis, & spinali medulla simul cum renibus, dolor originem trahit. Acutè pariter laborant renes phlegmone, quam demonstrat febris inordinata. Initio enim phlegmone non insigni , lenis febris est : transacto verò principio , atque inflammatione in peius proficiente, vehemens dolor est, cum remissione & exacerbatione, horrore quodam, & refrigeratione manuum & pedum. Morbi renum diuturni sine febre & inflammatione sunt ut plurimū, senibus magis familiares , cum dolore tamen magis vel minùs graui. Horum primus est calculus, dolore vario designatus , prout scilicet, vel in carne, vel in ventre renis generatur: aut ratione temporum generationis , permutationis, & exclusionis. Secundus morbus diuturnus renum est vlcus, siue primario genitum, siue alteri morbo succedens. Tertius morbus est abscessus,

ſceſſus, vel ab vniuerſali plethora, aut particulari membri conſocialis cum renibus factus, vel à cacoſchymia, calculo erodente, à ſuppreſſione vrinæ. Quartum morbum addit Hippocr. lib. de internis affectibus, quem phthiſim nephritidis appellat, Cornarius vertit tabem renalem, Auicennas extenuationem & arefactionem renum; cuius tres ſtatuuntur cauſæ: vnā procatharticā, quæ eſt immoderatus coitus: duas antecedentes, immoderatam ſcilicet euacuationem, & intemperiem deprauatam. Addit Auicennas morbum in cōformatione & magnitudine. His prænotatis affectibus, alia in genere, alia in ſpecie ab illis eſt præſagiendum. In genere quidem omnes morbi renum & veſicæ in ſenibus difficilius curantur, per aphoriſ. 6. lib. 6. Sic morbi qui in ſolo corpore renum ſunt, non ſunt periculofi. Et ſi mortem ſint allaturi, erunt in morte inferenda minimè crudeles. Interficiunt enim ſenſim, & longo tempore, vt ait Ruſſus Medicus Ephēſius. Qui verò morbi conſiſtunt, vel in interceptione actionis renum, vel in vitio ſubſtantiæ, quæ excernitur, hi ſunt periculofi. Hoc quoque in genere de doloribus regionis renū pronuntiat Hippocr. in coacis animaduerſionibus: *Dolor lumborum ſine cauſa manifeſta ſæpius impetens; maligni morbi ſignum eſt.* Tales ſiquidem dolores, aut ab inſigni aliqua intemperie partium oriuntur, aut ab occulto & latente vitio. Fræquentia

enim illa, maligni & pertinacis morbi ſignum eſt. Nam frequentia cauſæ ſtabilitatem & magnitudinem oſtendit: dolor verò qui remediis conuenientibus non alleuatur, malignitatem. Adde quod dolores qui à cauſa manifeſta manant, faciliùs remediis quieſcunt.

In ſpecie de morbis renum alia de acutis, alia de diuturnis ſunt prædicenda. In febris quidem periculoſiſſimus eſt ille dolor regionis renum, quem inflammatio ſpinæ, aut ſanguinis ingens æſtus, in maioribus vafiſ, efficit; tum propter viſcerum proximorum ſympatiã; tum propter ſymptomaticæ translationis periculum; tum etiam quia ex hac oppreſſione & ex lumborum æſtu, magna corporis iactatio ſequitur. Renum autem inflammatio peracuta affectio eſt, qua ſimul inflammantur venæ à iecore in renes diſcurrentes, & cum illiſ iecur ipſum. Cui inflammationi ſi vrinę ſuppreſſio ſuperueniat, eiſ vehementiam auget, vnde mortis periculum impendet. per aphor. in coacis: *Quos lumborum dolor cruciat, eoſ malè habere, &c.* Quod ſi coctione phlegmone ſuppuretur (quod puriſ & ſorditiei eruptio cum vriniſ oſtendit) vacuato expurgatõque abſceſſu, vlcuſ manet diuturnũ, ac plerunque immedicabile. Cuiuſ vlceriſ prognofiſ certior eſt, hac animaduerſione prænotata, quòd ſcilicet vrinæ purulentę, per ſe vlceriſ renum aut veſicę fallaciſſima ſigna ſunt. Potest enim

enim pus, aut à thorace & pulmone, aut ab inflammatione hepatis, aut aliarum partium in quibus vehemens dolor præcessit, aut à toto genere venoso, per vrinas excerni. Quod in transitu dolorem mouet in rene, & in vesica, propter acrimoniam. *Quare neque dolor cum perulenta urina semper vlcus renum ostendit, aut vesica, neque semper dolent ulcerati renes.* Quia renum substantia nervorum est expers. Quamuis frequentior causa doloris & puris, vlcus est renum & vesicæ. Hæc erant prænotanda, ne falsa diagnosi falsæ prognosis causa esset. Vlcus igitur renum abscessu frigido succedens, nisi statim purgetur, difficile curatur; omnisque exulceratio tum renum, tum vesicæ, præsertim quæ ab erosionem ducit originem, ægrè curatur. Quamuis minoris malitiæ sint renum, quàm visicæ vlcera. Quoniam carnosæ partes, quàm nervosæ facilius sunt curationis. Vlcera renum recentia & vesicæ facilius curari cēset Ætius. Vetusta omninò incurabilia. Sicut quæ sunt atrii coloris grauisque odoris (quod ex purè & vrinis percipitur) cum cruciatibus impatibilibus. Et quæ ex remediis conuenientibus, magis exasperantur, lethalia omninò sunt. Quibus si alia funesta symptomata superueniant, mortem in propinquo esse, est pronuntiandum. Calculus siue in renibus, siue in vesica cum vlcere coniūctus curari nō potest. Nam quæ lapidem minuūt & frangunt, vlceri contra-

ria sunt. Item dolores ex calculo, qui nullis medicamentis sedantur, miseram mortem & calamitosam minantur. Quibus si frigiditas extremitatum & sudor frigidus cum pulsu formicâte superuenerit, mortem in propinquo esse significat. Ad prog. quoque spectare antè ea diximus, priùs quàm morbus fiat cognoscere, & eundem præcauere: valent igitur ad præcautionem à calculo, alui libertas & liberalitas. Nam qui habent ventres molles & liquidos, rarò calculis vel vesicæ vel renum vexantur. Vnde trauli, & balbi, qui per apho. 32. lib. 6. longo alui profluuiò corripuntur, rarò capiuntur calculis. Sic qui semel aut bis in mense vomunt, magna ex parte à calculi generatione præseruantur. Quoad tabem renalem spectat, siue à causis supradictis contingat, siue ab vlcere, siue à corrupto partis alimento, & propria eius temperie alienata, siue à defluxione à capite per spinalem medullam, à quacunque inquam causa fiat, nūquam bonum potest habere exitum.

De prog. lesionum urinationis à vitis vesicæ.

C A P. XXII.

VRinationis operatio, quatenus ad vesicam pertinet, multipliciter quoque lædi solet: aut enim diminuitur aut aboletur vel deprauatur.

tur. Vnde fiunt tria illa symptomata triplicem prædictam læsionem significãtia, Ischuria, nempe, dysuria & stranguria. In prima vrina omninò supprimitur: in secunda non omninò, sed cum magno conatu vel difficili tantùm motu, aut etiam aliquando cum dolore vrina redditur: non enim cùm meiere æger vult statim vrinæ excretio sequitur, parũ scilicet vesica (quæ sola in hoc affectu laborat) operante. Et ita differt Ischuria à dysuria tantùm secundùm magis & minùs. In tertia vrina deprauatè exit. Vrinæ siquidem stillicidium ad motum deprauatum facultatis excretriciæ vesicæ refertur: maturiùs namque quàm naturæ conueniat lotium deponitur. Idque intercisè & guttatim, vt nomen ipsum indicat. Quorum symptomatũ prognosis clarior erit prænotata singulorum natura. Supprimitur itaque penitùs vrina, vel ægrè & vi redditur, vesica plena vel vacua: si plena, sana esse omnia superiora est concludendum, maliq; causa vel in ipsa vesica vel in cole est perquirenda: sin vacua & inanis, in superiori aliquo ad vesicam loco. Supprimitur autẽ vrina vesicæ vitio triplici de causa; aut à resolutione siue imbecillitate facultatis naturalis vesicæ, quam facit aut nimia intemperies aut nimia vrinæ quantitas: non enim vesica se colligere potest mortua facultate excretrice. Sicut cùm diutiùs plena manet vix aut nunquam contrahi potest. Suppri-

mitur etiam à refrigeratione nerui sensifici, qui in vesicam dispergitur: aut ab obstructione cernicis; siue ab inflammatione, scirrho, abscessu partium circūstantium fiat; siue ab his quę meatum replent, qualia sunt lapis, grumus, pus, crassus lentusque humor; siue carnosa substantia in nascente, vt sunt carnositas, vulgo dicta, verruca, callus in meatu Sin autem in suppressione vrinę vesica vacua appareat, renibus, vrteribus, aut translationi materię causa est adscribenda.

Quoad progn. Si in morbis acutis vrina suppressatur, plena vesica & meatu vrinatio libero, certissimum iudicium est emortuę facultatis, & mortis imminētis, aut partis ipsius inflammationis, si dolor adsit; aut mentis perturbatę in phreniticis, qui interdū non mingunt nisi admoniti, sicut interdum inuoluntarię vrinam reddunt. Si verò vacua vesica; aut aliò conuersam esse materiam est coniectandum, vt in alui fluxu; aut translatam, vt in crisi vel rigore symptomatico; aut renes esse affectos. Deriuatio vrinę per alui fluxum caret suspitione. Translatio aliquando est suspecta & calamitosa, aliquando non, vt in crisi appetente, antegressis salutaribus iudiciis. Tunc enim neque frigore & rigore, neque vrinę retentione terreri oportet: vt annotat Hollerius in illum aphorismum coacarum animaduersionum: *Ex perfrigeratione vrinam intercipi, pessimum est.* Alioqui illa metastasis ferè semper lethalis est.

est. Quæ cognoscitur dum fit, per motum humorum qui ante obfirmati erant in aliqua parte, per rigorem frustra obortum superuenientem, & per symptomata propria partis ipsius in quam translatio facta est. Hinc ab urinae suppressione convulsio & torpor inuehuntur. per aphrodisiacum.

Intercepta cum rigore urinae, pravae, & convulsionem inuehunt, tum alias, tum si antea sopor inuaserit. Rapta nempe in musculorum genus & nervorum principum materia. Urina igitur pluribus diebus suppressa, serum, quod in vteras & vesicam permeare non potest, per vasa refluit ad superiora, iecur opprimit, sanguinem inficit & refrigerat: tandemque tracto in consortium mali cerebro, & spiritibus tum refrigeratis, tum interceptis, torporem lethalem inuehit. Est enim torpor (ut ait Galen. in 1. prorrh.) commune symptomata omnium, propter immoderatam intemperiem, morientium. In iis enim fit à summa virium infirmitate, & caloris extinctione. Non caret etiam suspitione urinae suppressio, quæ sequitur ad inflammationem lumborum, quibus renes & vesica facile in consortium trahuntur, propter nervos quos inde è proximo accipiunt, & maximè si grauia accidentia superueniant, ut

epidrosis, &c.

De

De prog. deprauate urinationis.

C A P. XXIII.

STranguriam referri ad motum deprauatum facultatis excreticis vesicę, paulò ante diximus: cuius symptomatis proprium est, vt vesica ad excretionem vrinę irritetur prius, quã valdè repleatur. Quod in vniuersum à duabus causis accidere scribit Galen. comment. in aphorif. 16. lib. 3. & aphor. 58. lib. 5. & in aphor. 48. lib. 7. Vna ex parte vesicę, vel calculo, vel tumore, vel ulcere, vel imbecillitate à frigore, vel siccitate, laborantis. Quibus causis grauatur, & ad excretionem proritatur vesica, etiam à pauca vrina: non secus atque intestina, alimentum nondum mutatum in lienteria propellunt. Altera causa ex parte vrinę ipsius, cuius morsum vesica ferre non potest; vt si biliosa sit, aut putrida alicuius materię permixta, quę ex renum corruptela ducat originem, aut hepatis, pulmonis, vasorũ sese expurgantium. Quę partes sæpe humorum suorum vitia, & pus quoddam ad renes transmittunt, vel criticè, vel symptomaticè: abscessus ad vrinas stráguriosos vocatos faciētes. Quoad prognosim periculosus est hic affectus & difficilis curationis, prout à grauiori causa pendet: vt si ab ulcere vesicę, aut eius inflammatione, vnde lethalia plerũque sequuntur symptomata.

Inflam

Inflammatiō siquidem vesicæ ea lethaliot est, in qua vehementior dolor, & febris acuta. Et maximè si non solum adest urinae difficultas cum dolore, verum etiam sit omnimoda suppressio, tum alui, tum urinae. Grauis etiam dicitur vesicæ inflammatiō, cum citissimè conuertatur in gangrenam, ob magnitudinem. Quantum ad prognosim vesicæ vlceris. Notatu dignum est quod dicitur apud Hippocr. & Galen. *Omnes fere qui vesicæ vlcere laborant ab indefinente dolore, febribus, vigiliis & colliquatione perimuntur. Alij quidem citius, alij tardius, & maximè senes. In quibus (vt ante dictum est) renum & vesicæ vitia difficulter curantur.* Præsertim si frigida intemperie, aut frigidorum humorum redundantia, ortum habeat. Quæ verò straguria urinae vitio pender, sequitur prognosim partium affectarum à quibus urina co-inquinatur.

De progn. inuoluntariae urinae excretionis.

C A P. XXIV.

Habet, vt ante ea dictum est, vriationis operatio multa instrumenta motu naturali agentia. Vnm autem duntaxat muscolum in ceruice vesicæ voluntariè operantem. Ille enim (vt etiam diximus) obliquis fibris nitens motu arbitrario meatum claudit, vnde sequitur urinae
reten

retentio, sicut eiusdem musculi otio & laxitate effluit. Ex quibus colligimus inuoluntarium urinae exitum proprium symptoma esse actionis resolutæ sphincteris. Habet autem eiusmodi resolutio causam interdum in nervo per quæ vis animalis fertur ad muscolum; ut si propter extinctum calorem, vel penuriam spirituum relaxetur, & flaccescat, nec amplius contrahi possit, nec urinam effluentem sentire; interdum in spinali medulla luxata ad externas partes; interdum in cerebro ipso perturbata mente, ut in phreniticis. Duo posteriores modi curationem admittunt aliquando. Primus verò omninò est desperatus, siue musculus & nervus nimio humore aut ulcere computruerint: unde tamen mors non sequitur: siue animalis facultas quæ contrahit sit extincta, quod lethale est, modò fiat nihil sentiente ægro. In pueris pariter humidioribus inuoluntariè exit urina; & in senibus, ab acrimonia irritante; ac in ulcere vesicæ, qui tamen desperati non sunt: in quibus excretrix acriùs irritata, aut nimio pondere pressa, musculo imbecillo, nō expectat voluntatis imperiū.

De prog. à partibus genitalibus.

C A P. XXV.

ET si quæ de partibus genitalibus, quoad nostrum institutum spectat, dici possunt,
ad


ad symptomata partium ex arbitrio motarum videbantur referenda (habent enim partes genitales virorum motum mixtum ex naturali & electorio.) De his tamen propter vicinitatem quam habent cum naturalibus hoc loco agere visum est, in quibus duo consideramus: musculos nempe quibus testes appenduntur, mouentur & colis tenditur erigiturque, vrina & semen emittuntur : atque nervos, venas & arterias. Quibus non solum cum partibus principibus, vt corde, cerebro, hepate conueniunt, sed etiam cum aliis, vt oculis, thorace &c. Propter quam naturæ communionem humorum migrationes fiunt : ex quo fit vt in morbis thoracis cum tussi testes interdum intumescant, & interdum abscessum patiantur. In acutis verò morbis (quorum gratia potissimum de harum partium affectibus hic agimus) contrahuntur, propter conuulsionem & dolorem, vel facultatis extinctionem. In moribundis siquidem & morbis capitis, pudendorum contractio, facultatis vitalis interitum causam vnā habet. Quæ facultas ad extremas corporis partes amplius extendi non potest : sed perturbata se ad suum principium colligit, vnāque secum partes trahit. Habet etiā hæc contractio alteram causam; dolores nempe vehementissimos, propter quos delati spiritus ad locum dolentem, secum rapiunt partes ipsas; aut denique habet conuulsionem musculorum,

à sicci

à siccitate & ardore febrili. Quæ contractio si
citra dolorem fiat, exitij signum putatur certissi-
mum. Quo tempore etiam obseruare licet, non
solum testes reuelli, & penem rugari. Sed & di-
gitos ac pollicem manifestè inflecti, vngues
curuari, labra dissidere, molliorem au-
riculam reflecti, duobus, tri-
búsue diebus ante mor-
tem, vel etiam
pluribus.

Finis libri tertij.

L A V S D E O.



OPERIS PROGNOSTICI.

QVI EST DE HIS QUÆ
RETINENTVR VEL

excernuntur à corpore
præter naturam,

LIBER QUARTUS.

CAPVT I.



ACTENVS tribus superioribus libris ea prædicendi ratio absoluta est, quæ ab actionibus animalibus, vitalibus, & naturalibus læsis sumebatur. Superest vt hoc quarto de ea agatur, quæ ab excretis vel retentis præter naturam colligi solet. Retenta dico, quia non minor læsio sequitur ex retentione eorum quæ excerni debent, quàm ex his quæ retineri debêt, si excernantur.

De excrementis igitur hoc in genere supponendum est ex Hippoc. Qualiacunque sint siue

P

cocta, siue cruda, siue foetida, siue liquida, &c. seu natura, seu arte mota, optimam significationem præbere, modò leuent morbum, & leuiter ferantur. Si verò dissoluant cum grauiori molestia, in malis semper esse ducenda. Hoc inquâ commune est omnibus, quæ ex corpore excernuntur: per vomitum, per deiectiones, per sudores, per hæmorrhagias, per sputa, &c. Debet autem in excretionibus iusta esse moderatio, quæ vel omninò soluat morbum, vel reddat leniorem. Nam largior expurgatio vires exoluit; parciore, imbecillitatem naturæ, & malignitatem morbi ostendit. Vbi enim sæpius sanguis è naribus stillatur, sæpius meitur, vomitur, aluus deiecitur, inanis naturæ conatus ostenditur, labefactantur vires, & ad solutionem morbi nihil commodi adfertur. De his igitur ex proposito instituto est agendum, quatenus earum partium à quibus emanant, œconomiam ostendunt, & morborum quibus partes vexantur exitum demonstrant, ab his quæ per aquæductu cerebri excernuntur, exordium sumentes.

De prog. ab excrementis à capite manantibus.

C A P. II.

DVplici ratione cerebrum multitudine excrementorum abundat; vna, quia insignem magnitudinem habet, multa alimenti copia indiget:

indiget: at in multa alimenti copia, multam excrementorum quantitatem colligi necesse est. Altera, quia, ut inquit Hippocr. lib. de glandulis, caput supra positum est, sursum cauum & rotundum existens, atque humiditates ex reliquo corpore complectens. Corpus enim vapores omnis generis sursum in caput demittit, quos caput rursus deorsum remittit. Bene etenim cerebro natura prospexit, ut multis ductibus quasi sentinis constaret, quibus multitudo suorum excrementorum exoneraretur. Duo autem potissimum excrementorum genera in cerebro generari dicuntur: vnum crassum, pituitosum, aqueum, serosum, biliosum, & melancholicum: Alterum tenue & vaporosum, quo multo etiam abundat cerebrum, propter situm. Illud per aures, per nares, per oculos, per palatum, per guttur & gulam, per venas in spinalem medullam expurgatur: hoc per insensibiles ductus, sua leuitate superiora petens, expirat. Crassa igitur excrementa (de quibus tantum hoc loco) cerebrum per ordinarios canales expurgat. Qui sunt palatum, in quod definit illud infundibulum, & nares, per quos ductus aqueus & pituitosus humor excrementitius stillat; atque aures, per quas biliosa quædam continuò expurgantur: à quibus sordibus aurium prognosim exordientes, in illis dulcedinem damnamus cum Hipp. sect. 5. lib. 6. epid. *Hominibus*, inquit, *sordes in auri-*

bus, dulcis quidem lethalis, amara verò non. Galen. in Commen. hanc dulcedinem ad colliquationem refert. Dulcescere enim non potest sordes illa, nisi cerebrum ægrotet. Dulcescit ergo colliquata cerebri substantia. De amaritudine sordium in auribus collectarum, vide Aristotelem prob. 4. sectionis 32. Huc pertinet illuuius, quæ aliquando per aures excreta, dolorem capitis soluit. per aphor. 10. lib. 6. *Pus aut aqua, aut sanguis per nares, per os & aures fluens, capite laboranti, & vehementissimè dolenti, morbum soluit.* Hinc oritur quæstio non omittenda. velint Hippocr. dolorem capitis ab inflammatione, puris excretionem solui, an verò sine inflammatione? Negat natura cerebri; quòd cum sit pars princeps, verendum est ne eius nobilitas, prius mortis periculum adferat, quàm ex inflammatione fiat puris generatio. Respon. Hippocr. hoc loco pus intelligere, quod sensim factum fuit, ex ea materia quæ dolorem capiti inferebat, citra tumorem inflammatorium. Sic Hippo. lib. 2. de morbis pituitam & bilem, serùmque biliosum in maximis doloribus capitis, in pus mutari scribit, nec veræ inflammationis meminit. Non solum hunc dolorem capitis terminat talis excretio; sed etiam alios plurimos eiusdem partis affectus. Sic ab epilepsia vindicantur & curantur infantes & pueri, per aures sordidas & purulentas. Per nares quoque (vt dictum prius) sua excrementa deponit

deponit cerebrum humore oppressum, ductu commodissimo: aliquando tenue & crudum, ut in corysa (grauedinem Latini appellant) in qua tenuis & crudus humor per nares excernitur. Quod prauum est ratione signi: quia cerebrum vel aliunde refrigeratum, vel vaporibus calidis repletum ostendit. Ut causa verò aliquid adfert utilitatis, quatenus è cerebro & pulmonibus, humorem excernit, & auertit: aliquando enim coctum & crassius, sine vltione, per nares excernitur excrementum, bonis ægri rebus. Quòd si diutiùs in ductibus cohibeatur: qualitatem, aut saporem odorémque alienum contrahit: si verò visco similia appareant, quæ excernuntur per nares, pessima sunt, quia permixtione aëris humidi talia non fiunt, ut sunt quæ verè coquuntur: sed exiccatione, & spiritus flatuosi à calore extraneo feruore, extra omnem spem coctionis. Fiunt denique fluxiones è capite per palatum in partes subiectas, Catarrhum Græci appellant, varios effectus producentes, pro humorum diuersa natura & partium præstantia, quæ distillatio mala semper est, ut signum: significat enim grauem affectionem à qua excitatur, & ut causa. Nam eius portio, præsertim si prauus sit humor, per guttur in asperam arteriam & pulmonem perueniens, tabidas affectiones facit: altera in ventrem illapsa cum morsu ventris, perturbationem & fluxum adfert: atque in transitu per

os ventriculi, cibi fastidium generat. Aliquando prædictæ fluxiones, per os spuendo demittuntur foras. Varia est prognosis earum affectionum quæ prædictarum defluxionum sunt soboles, suis locis quærēda. Sicut quæ de oculis lippientibus voluntariè, vel inuoluntariè lacrymantibus sunt dicta.

De progn. ex sputis sumptis.

C A P. III.

Varia sunt quæ per os excernuntur excrementa, non solum substantia, quantitate & qualitate distincta, sed etiam excernendi modo : alia enim vomitu è ventriculo reiiciuntur, alia excreatione, siue tussi, ex faucibus & gutture : quædam simplici spuitione, ex ore, ut cum liquida tenuisque pituita in os redundat, cerebro scilicet nimio humore fatiscente, & ventriculo inde laxiore, atque humidior, unde multa saliuatio & frequens sputatio : alia denique cum tussi, ab aspera arteria, pulmone & thora-
 ce. Ex quibus partibus, sine tussi nihil educitur : & quod educitur affectiones ipsius thoracis, & partium respirationi dicatarum, & in his materiæ naturam ostendit, de quorum prognosi hoc loco habetur sermo. Quæ ut secundum rationem educta iudicentur, has condiciones habere

bere debent ex Hippocrat. Vt scilicet sint bene permixta, flaua, mediocriter crassa, læuia, æqualia, quæque dolorem tollant, & minuant morbū: atque vt faciliè & citò, id est, sine multa tussi extussiantur. Quæ dotes, vt docet Galen. comm. in progn. facultatis, tum naturalis, tum animalis robur, materiæ benignitatem, atque asperæ arteriæ, ac bronchiorum pulmonum libertatem, demonstrant. Contrarium verò tanto deterius est, quanto pluribus conditionibus ab optimo recedunt. Exempli gratia, in pleuritide sputum album, quo ostenditur nihil educi de materia morbifica, est inutile. Quod si crassum immoderatè & lentum fuerit, vel tenue ac varium, inde materiæ vitium ostenditur. Si verò rotundum, colore flauo, eruginoso, vel nigro prædictum, caloris febrilis excessus, & malignitas humoris significatur. Si denique non nisi cum multa tussi educi possit, vel supprimatur omninò, omnes prædictas causas, simul cum bronchiorum obstructione colligere possumus: vnde prognos maior certitudo, additis circumstantiis initio huius capitis commemoratis, & aliis signis superuenientibus.

De progn. cruenta spuitionis.

C A P. I V.

SOlet sanguis è multis partibus prodiens, re-
siici per os, quod distinguitur aut per san-

P 4

guinem ipsum excretum, aut per modum excernendi, aut per alia partium propria symptomata. Quatenus scilicet solo sreatu, & sine tussi, aut pauca, aut multa excernitur. Primum significat sanguinem è cerebro prodire, paucum quidem & rubrum, referatis meningum venu-
lis, aut à calore & tenuitate sanguinis, aut vi frigoris expressis, aut nimio humore laxatis. Quamvis aliquando multus irruens in fauces & guttur, cum tussi reiiciatur. Quod imponit sæpe medicis putantibus à pulmonibus prodire. Sanguinem verò è capite elabi, ostendit absentia signorum, quæ affectû thoracem significant, & palati titillatio, creber excreatus, leuitas capitis post sreatum sanguinem, palati cruenta sordities, ore aperto cognita: ex gutture, hepate, liene, sanguis educitur pauca tussi. Sanguinem ex pectore & variis pectoris partibus prodire, in genere ostendit, non solum multa tussis, sed etiâ ponderis cuiusdam sensus, & respiratum magis vel minus difficilem, scilicet pro magnitudine causæ, sanguinis effusi copia, & locorum affectorum varietate. Siquidem sanguinem fluere è cauo pectoris, demonstratur eius exclusione, cum multa tussi & dolore ac coagulatione: coit enim sanguis facilè extra vasa, quia minùs calet, & ita concretus, difficilè in asperam arteriam migrat, nec nisi iterata tussi, & dolore membranarû potest educi. Additur quod per interualla recurrit.

recurrat. Sanguinem è membrana succingente, & mediastino expectorari, ostendit eius paucitas & tenuitas, exactaque permixtio, atque eiusdem cum molesta tussì, & dolore mēbranarum proprio, expurgatio. Sanguinem è pulmone educi significat sanguis ex toto expumescens, ex carne nempe visceris, cuius induit similitudinem: (est enim pulmo quasi coagulata spuma) spumæ rotunditas, & quod per intervalla intercifus separatúsque sanguis egrediatur color albidus, ex permixto plurimo aëre. Sanguinem è magnis vasis exire, ostendit eius copia multo maior quam quæ à thorace, frequentia, spirationis difficultas maior, calor & feruoris maioris intus perceptio, pondus à sanguine effuso & suppresso. Ab arteriis sanguis exit flauus, tenuis, spumofus, valdè calens, cum pulsatione cordis, & febre inseparabili. Hæc quia plurimùm faciunt ad prognosim, erant prælibanda. Quibus ad certio rem coniecturâ addendi sunt modi triplices, quibus è vasibus propriis sanguis solet exire. Quorû primus est, apertio oris venarum, anatomosim Græci dicunt, in qua quia sanguis exit sine dolore, sine febre, sine inflammatione vlla partium internarum, nullum portēdit periculum: imò magna ex parte eos iuuat, quibus hæmorrhoides vel mēses sunt suppressi. Secundus appellatur diapedesis, id est, venarum apertio. In qua sanguis serofus, veluti transco-

latus, aut sudoris modo transmissus, per rarefactas vasorum tunicas, facile diffluit. In hac enim ait Galen. de symptomatum causis, propriè non est sanguis qui effunditur, sed feri species quædam. Et hic modus medio modo se habet: aliquando enim iuuat eos quibus aliqua consueta euacuatio cessauit: aliquando non caret periculo, propter fluxus abundantiam, & vlceris remanentis difficilem curationem. Tertius modus est diaurosis Græcis, in qua sanguis per erosionem exit; cuius indicia sunt, nulla manifesta causa præcedens & antegressa & debilitata hæmatosis: in ea enim multus sanguis tussi eiicitur, interdum cum sanie, interdum cum carunculis quibusdam & ramentis, è substantia pulmonis, bronchiorum, venæ & arteriæ, qui modus omnium est pessimus. Soboles enim est acris humoris, in tabem desinens, & immedicabilis, propter pulmonum imbecillitatem, motum continuum & mollitiem.

De prog. spuitionis biliosa.

C A P. V.

Apparet sputū biliosum potissimū in pleuritide: fieri enim solet pleuritis ab humore tenui, & bilioso per aph. 33. lib. 6. *Qui acidum ructant raro sunt pleuritici.* In quo sputo sinceritatem

tatem damnamus, authore Hipp. sicut in aliis omnibus excretionibus. Quorum tamen si facilis sit expulsio, non auferunt salutis spem. Non enim tantum potest prauitas sputi ad significandum mortem, quantum prompta & facilis educatio, ad salutem: visi enim sunt multi, euadere cum sputis etiam nigris, sicut nonnulli cum bonis sputis mori, cum scilicet supprimuntur: quæ suppressio, si ullis aliis excretionibus, in hac maximè suspectanda est. Aqua & furorē & phrenitidem sequi existimat Hipp. Spectata bilis natura, quæ sua tenuitate facilè transluit, caloris vehementia rapitur, & qualitatis acrimonia, partes in quibus inest, ad expulsionem irritat, donec partem aliquam principem obsederit. Inde prognosis.

De prog. sputi crassi & tenuis.

C A P. VI.

Magni momenti est ad iudicium de morbis per excrementa ferendum, distinguere ea quæ à calore naturali alterantur, ab his quæ à calore præter naturam. Illa siue sputa sint, siue humores alio temporis progressu in illo coctionis tractu, quandam acquirunt crassitiem & viscositatem: permixto scilicet exactè succo liquidiore cum crasso, licet initio nullam habuerint.

latus, aut sudoris modo transmissus, per rarefactas vasorum tunicas, facile diffluit. In hac enim ait Galen. de symptomatum causis, propriè non est sanguis qui effunditur, sed feri species quædam. Et hic modus medio modo se habet: aliquando enim iuvat eos quibus aliqua consueta euacuatio cessauit: aliquando non caret periculo, propter fluxus abundantiam, & vlceris remanentis difficilem curationem. Tertius modus est diaurosis Græcis, in qua sanguis per erosionem exit; cuius indicia sunt, nulla manifesta causa præcedens & antegressa & debilitata hæmatosis: in ea enim multus sanguis tussi eiicitur, interdum cum sanie, interdum cum carunculis quibusdam & ramentis, è substantia pulmonis, bronchiorum, venæ & arteriæ, qui modus omnium est pessimus. Soboles enim est acris humoris, in tabem desinens, & immedicabilis, propter pulmonum imbecillitatem, motum continuum & mollitiem.

De prog. spuitionis biliosa.

C A P. V.

Apparet sputū biliosum potissimū in pleuride: fieri enim solet pleuritis ab humore tenui, & bilioso per aph. 33. lib. 6. *Qui acidum ructant raro sunt pleuritici.* In quo sputo sinceritatem

tatem damnamus, auctore Hipp. sicut in aliis omnibus excretionibus. Quorum tamen si facilis sit expulsio, non auferunt salutis spem. Non enim tantum potest prauitas sputi ad significandum mortem, quantum prompta & facilis eductio, ad salutem: visi enim sunt multi euadere cum sputis etiam nigris, sicut nonnulli cum bonis sputis mori, cum scilicet supprimuntur: quæ suppressio, si ullis aliis excretionibus, in hac maxime suspectanda est. Aqua & furor & phrenitidem sequi existimat Hipp. Spectata bilis natura, quæ sua tenuitate facile transluit, caloris vehementia rapitur, & qualitatis acrimonia, partes in quibus inest, ad expulsionem irritat, donec partem aliquam principem obsederit. Inde prognosis.

De prog. sputi crassi & tenuis.

C A P. VI.

Magni momenti est ad iudicium de morbis per excrementa ferendum, distinguere ea quæ à calore naturali alterantur, ab his quæ à calore præter naturam. Illa siue sputa sint, siue humores alio temporis progressu in illo coctionis tractu, quandam acquirunt crassitiem & viscositatem: permixto scilicet exactè succo liquidiorum cum crasso, licet initio nullam habuerint.

rint. Hinc excrementa per aluum redduntur crassa, his quibus coctio in ventriculo & intestinis benè fit. Sputa in inflammationibus thoracis. Pituita in distillationibus, in grauedine, in lippitudine. Hinc denique pus crassescit in vlceribus, &c. Ab eodem calore naturali, quæ lenta sunt, aut crassa, & sicca vt coquantur, æquari & ad mediocritatem duci debent. Contrarium autem aduenit his, qui à calore præter naturam resiccantur. In quibus non solum non permiscetur quod liquidum est, serum crasso, sed incendio febrili penitus absumitur. Vnde fit vt terrenæ substantiæ plurimum, aquosæ paucum remaneat, nec viscositas incidatur, aut crassities attenuetur: sed potiùs exiccetur, & induretur. Proindè Hipp. sputum laudat, quod neque sit admodum liquidum, aut aquosum, neque valdè crassum aut lentum, sed moderatum sine vtroque excessu. Tale namque facilè & citò expuitur, maximè si vires valeant, atque vegetum calorem ostēdit. Sputum igitur quod tenuius est adhuc, dum humor crudus est, nedum calefactus, aut permixtus crasso, difficilè extussitur. Quia cum inter tussendum subleuatur, à spiritu diuisum refluit: crassum verò, glutinosum, rotundum, quia tenaciter adherent, eorum est etiam difficilis expuitio. Et quoad prog. nihil certò statui potest de morbi exitu per sputum. Quale & quantumcunque fuerit.

fuerit. Sputa enim quantumuis praua, nūquam tamen omninò & necessariò mortalia sunt per se ex sententia Hipp. Ea enim simpliciter mala aut periculosa pronuntiat. Spectanda sunt ergo alia signa, ab his quæ ab sputis sumuntur; atque in omnibus, aliorum signorum consensum, firmandum est præsagium. Sunt enim singulorum vires diligenter inter se conferendæ, vt intelligatur quantum vel in melius corpus, profecerit, vel versum sit in deterius.

De progn. spuitionis spumosa.

C A P. VII.

DVæ sunt sputi spumosi differentia, vna à pituita, in qua sputum albicans, altera humoris biliosi, vbi sputum biliosum syncerum & spumescens expuitur. Prioris causa est flatus permixtus, interueniente agitatione, vt cum aqua hordeacea ex alto effunditur. Posterioris causa est calor igneus, feruens, & quasi incendio materiam fermentans. Perseuerat autem plus, minus vtraque spuma, pro maiore vel minore spiritus contenti crassitie, qui superius ferri nec erumpere potest, atque à lentore humoris, qui vi continet spiritum. Quoad prog. Sputum spumosum albicans, quia pituitæ tribuitur Galeno, in lib. i. de crisibus, quæ post sanguinem pleuritidem

tidem mitissimam inuehit, minus habere periculi æstimatur, presertim cùm pulmo, omnem ferè humorẽ quem excipit, album, spumofum, tumidumque reddere soleat. Quoniam plurimum aeris, quo abūdāt, perpetuo motu, humori necessario permiscet. Sputum autem biliosum & syncerum spumescens, quia calorem vehementem testatur, estque incendij interni, atque vehementis in corpore agitationis, & colliquationis signum certissimum, lethale æstimatur.

De prog. spuitionis purulenta & fætida.

C A P. VIII.

FOetidum cum purulento coniunximus, propterea quod Hippocr. inter notas boni puris fœtorem addit. Dicitur autem sputum purulentum in quo pus per os eiicitur. Cuius optimi quatuor notas ponit Hippocr. in progn. albedinem scilicet, quam integritas partium seminalium inducit. Aequalitatem, quæ vniufmodi materiæ rationem, in crassitie, tenuitate, colorem & coctionem significat. leuitatem, quæ vis caloris natiui sese æqualiter in omnes partes insinuantis, profert: & fœtorem nimium. Pus enim ex quocumque loco exeat, medium esse debet inter quod putet & grauiter fœtet, & quod

quod nihil graue expirat. Pessimum verò pus est contrariis qualitatibus præditum, aut omnibus, aut pluribus, vt nigrum, asperum, inæquale, cœnosum, valdè fœtidum. Nam cùm triplex sit in animalium corporibus alteratio, vna planè secundùm naturam, in qua alimentum coquitur & assimilatur: altera planè præter naturam, in qua humor omninò corrumpitur ac putrescit à calore præter naturā, sine vlla coctione. Tertia media inter vtramque, in qua humorem vincit natura prius, quàm corrumpatur: sed tanquam alendo superfluum & ineptum, expellit. In hac postrema fit pus, in quo efficiendo, quia modica putredo inuenitur, à calore extraneo resistente coctioni, modicus debet esse fœtor sicut in prima, in qua humor planè superatur à calore natiuo, nulla est graueolentia. Censetur itaque sputum purulentum grauiter fœtēs, pessimum, vt signum & vt causa: vt signum quidem, quia significat calorem natiuum omninò superari, & vinci à materiæ prauitate, in qua calor extraneus dominatur: vt causa verò, quia sua acrimonia partes ambientes exulcerat & erodit, humiditate nimia putrefacit, praua qualitate corrumpit: & halitu tetro deliquia animi, conuulsiones, & alia graua symptomata adfert. Quantum ad prog. purulenti sputi, spectandum est maximè in affectibus pulmonum & partium thoracicarum, & potissimùm in suppuratis, in quibus

quibus talis sputatio laudanda est multis nominibus. Primò, si facilitas morbi ferendi sequatur: eo enim virium robur in parte affecta, significatur, nec à morbo superari naturam, nec malignam esse materiam: quia nullam mouet inquietationem. Secúndò, si doloris allevatio contigerit. Testatur enim causam morbificam esse deuictam: maximè si cum signis coctionis, & critica aliqua excretionem fiat. Tertiò, si facilè expectoretur: quo colligimus facultatis animalis integritatem, musculorum intercostalium robur, humoris benignitatem, & liberos ductus bronchiorum. Quartò, si æger bene spirèt: habet enim bona spiratio magnam vim ad salutē, maximè in morbis pulmonum, & thoracis. His igitur omnibus consentientibus, non possumus nō bene de exitu ægritudinis sperare. Nam vt æger à graui ægritudine seruetur, multa signa bona concurrere necesse est: habet enim vnum signum malum plus virium aliquādo in necando, quàm plura bona in ægro liberando. Multos tamen inter signa grauia & lethalia euasisse obseruauit Hippo. in epid. quibus tria hæc integra aderant: pulsus nempe, respiratio, & appetentia, quod (vt alibi diximus) ad salutem magnam habere vim comperiantur.

De prog.

De progn. spuitionis liuidæ & eruginosæ.

CAP. IX.

Quemadmodum liuor in parte liuente, caloris natiui quādam extinctionem significat, à calore extraneo, aut à frigore, aut à putredine contractam: (liuida enim euadunt quæ perfectè putrent) ita in excrementis quæ nigra sunt ab atra bile pura, eum colorem cōtrahunt; quæ verò liuida ab eadem quidem, sed pauca. Ut igitur de liuore & nigrore spūti certior sit prognosis, distinguendum est illud quod euētu fit, ut à cibo, fuligine humoris melancholici, à sanguinis grumo, ab eo quod meracum ab atra bile, vel mortificatione oritur. Hoc enim sputum liuidum, in malis semper habendum, & maximè si fœteat. Omnis enim fœtor ex abundantia caloris extranei, in putredine oritur, sicut liuor defectus caloris innati est soboles. Sputum autem eruginosum non minùs funestum est: nascitur enim ex bile æruginosa, quæ est media inter flauam & atram, per calorem immodicum quo supra modum exassatur. Ob id, cū sit acerrima, erodens & malignissima, semper & materiæ ex qua gignitur, & loci vnde manat, vehementissimum calorem declarat.

Q

De progn. multa & pauca spuitionis.

C A P. X.

PAUCUM vel multum, frequenter vel rarò spuerè, ad quantitatem continuam, vel discretam refertur. Sputi ergo paucitas suspecta quidè valdè est in pulmonia & semper, in pleuritide non semper. Nam per totum spacium incrementi pleuritidis, si morbus est salutaris, humida & omninò cruda, eaque pauca spuuntur: deinde accedente incremento, pauca & cocta. denique circa statum & crìsim, exquisitè cocta: multa & facilia. Ex quo firmo progressu, eoque ordine gradatim factò, vincentis naturæ robur, constantemque actionemprehendimus: at in pulmonia siccitas, & omnis sputi etiam cocti paucitas, horrenda est. Primùm, quia commune est omnibus febribus, nullum paucum esse criticum. Secundò, quia hoc est peculiare peripneumonix, vt propter laxitatem & raritatem loci affecti, semper aliquid humoris debeat expectorari. Quod de pleuritide dici nò potest. In hac igitur pauca expectoratione aut nulla, facultatis vitalis & motricis imbecillitas, & summa pulmonis angustia, arguitur. Cuius paucitatis ratione sola, etiàsi coctionis signa appareant, à morte metus est. Non enim tunc aut loci distantiam, aut humoris cruditatem, possumus incusa

incusare. In hoc igitur morbo, & in aliis pectoris (in quibus potissimum sputa consideramus) maiorem esse vim ad salutem facili expectorationi tribuendum, quàm signis coctionis, sine quibus, solo beneficio animalis facultatis, multi liberantur, qui eadem collapsa cum signis coctionis intereunt.

De progn. à suppressione sputi.

C A P. X I.

AD sputi paucitatē spectat eius omnimoda suppressio, quæ fit aut quia materia omnis expulsa, aut quia humoris ad caput ipsum translatio facta est, ut de biliosa pleuritide diximus: unde vigiliæ, deliria, & furor sequuntur per aph. 5. 3. porrh. *Lateris dolor ex sputis biliosis, si absque ratione evanuerint, in furorem aguntur.* Quæ translatio perniciofa est duabus de causis: vna communi, quia quò plures partes & facultates sunt labe factatæ, eò perniciosius habent ægri: altera propria, quia in morbis thoracis facultatem animalem validissimam esse oportet, ut movendo thoracem, & materiæ expectorandæ sufficiat. Denique sputum supprimitur, quia vehementi illa thoracis compressione nō amplius potest commoveri: moriente scilicet facultate, & nihil mouente. Et hanc tussis & sputi suppressionem, mors necessario sequitur.

Q 2

De progn. sputi falsuginosi & dulcescentis.

C A P. XII.

SAlsum saporem facit terrena substãtia adu-
sta, & mixta cum aqueo humido. Ita vt sal
fieri possit ex eorum omnium cinere quæ vruntur,
effuso humore aquoso. Sic exhalationes calidæ &
siccæ, si magna copia fuerint mixtæ cum aqua,
ipsam falsam efficiunt. Sic pituitam falsam
arbitratur Auicennas fieri à putredine, aut
adustione. Dicunt etiam falsedinem fieri in spu-
tis, per admistionem bilis adustæ: cui falsedini
si addatur lentor in sputis, non solum erodunt,
propter acrimoniam, sed etiam vias, per quas
spiritus euadit, coarctant: pertinaciter enim,
propter lentorem, adhærescunt bronchiis pul-
monum. Vnde etiam densitatem membrana-
rum non possunt penetrare. Ex quibus colligi-
mus talia sputa esse praua, vt signum & vt causa:
vt causa quidem, quia pulmonem exulcerant;
vt signum verò, quia materiæ contumaciam, &
calorem vrentem significant, & si retineantur,
mortem imminentem ostendunt, maximè si vna
quoque tussis & halitus supprimatur. Et quoad
sputum dulcescens, in pleuritide biliosa, non
caret suspitione: sicut excrementa aurium quæ
amara esse debent, in malam partem accipit
Hippocr. si dulcescant. In affectibus autem pul-
monis sputa dulcia falsis solent succedere, tri-
bus

bus de causis. Vna salutari, ex coctione & apta temperie, in his qui sanantur prius, quàm omninò purulenti fiant: altera periculo, in illis qui exulcerato pulmone ad phthisim transeunt. In hac enim sputa vt plurimum falsuginosa sunt. Deinde pure dulci concepto, aut vase aliquo eroso, aperto, vel rupto, sanguine permixto pituitæ, dulcescunt. Quod Hippo. in malis habet 3. de morbis. Tertia prorsus lethalis, à colliquatione partium solidarum, vt in moribundis. Excrementa enim (inquit Galen. commen. in sent. 5. lib. 6. epid.) quæ amara esse debent, si dulcescant, colliquationem significant. Quòd si spiritum falsum sit, & interrogatus æger, dulce se percipere fateatur, non minus periculosum est. Id enim accidit, aut quia calor nativus in parte gustante extinctus est, vnde æger speciem veri saporis non ampliùs discernit. Tales enim cùm verum gustum non habeant, omnia putant esse dulcia: quoniam contrariorum saporum absentia, dulcedinis speciem refert, quorum ipsa absentia, priuatio quædam est.

De progn. spuitionis frequentis.

C A P. XIII.

DE frequenti spuitione varium iudicium afferri solet, quatenus aut consuetudine,

Q 3

aut sine necessitate, aut cum ea contingit. Aliquando enim his succedit, quibus metastasis materiæ fit, & abscessus ad aures, unde parotides. Cuius materiæ portio, si in oris capacitatem decumbat, tussim & frequentem spuitionem facit. Unde parotides subsidēt, & molliores fiunt, vacuata scilicet sensim materia. per apho. coac.

Quibus irritamenta in faucibus, iis clementes ad aures tumores. Aliquando mentis læsæ & delirij est signum: sed prius quàm frequens sputatio inter signa phrenitica numerari debeat, considerandum, num qui frequenter sputat, aut excreat, aliquid educat. Nam si educit, id à distillatione esse potest: sicut in sanis oriri solet, ab ore ventriculi, cum nimio humore madet, & imbecillū est: aut ab humidiorē cerebro: aut à partibus oris, è quibus humiditas superflua exprimitur. Quæ sputatio frequens, nihil phreniticum propriè significat. Adde quòd rarò in phrenitide, morbo siccissimo, & cū lingua adusta, hoc symptoma apparet. Si tamen fiat sine supradiçtis, vel magnitudinem inflammationis ostendit talis sputatio, è qua ichor in os exudat, similis tenui lacrymæ, quæ ex oculorum inflammatione manat; vel vomitum futurum prænuntiat, propter membranæ continuitatem, quæ ori toti interno communis est. Quòd si per excretionem, aut sputationem frequentem, nihil educatur, læsam mentē denuntiat, præsertim si aliud quoddam signum

signum adfuerit : quia voluntaria omnis actio quæ præter rationem , vel exuperans , vel deficiens, in qua decorum non seruatur, inter signa phrenitica numeratur, per aphor. in coac. *Facere quid præter consuetudinem , velléque ea quæ prius non consueuerat, aut contrarium iis quæ fuerant consueta, malum & proximum dementia.*

De progn. ab hæmorrhagia.

C A P. XIV.

HÆmorrhagia vel sanis fieri solet, vel ægris. Illa naturalis est, à copia & feruore sanguinis procedens : qui sanguis ineunte ætate, non solum in alimentum, sed in incrementum corporis consumebatur : & simulatque in pubertatem peruenerint, incipiunt hircire, inquit Hip. sect. 3. lib. 6. epid. In hæmorrhagiam incidunt: nunc per nares, si masculi, nunc per vterum, si femellæ fuerint; nunc per hæmorrhoides, aut per dysenteriam cruentam, vt in plethoricis, aut mutilatis. Quæ cõsuetæ & periodica euacuatio si supprimatur præter rationem, id est, nõ misso sanguine, aut aliter diminuta, aut vacuata copia, necessariò morbum aliquem plethoricum accersit. In parte potissimùm quæ cæteris imbecillior fuerit.

Hæmorrhagia ægrorum, aut critica est, & vel

Q 4

perfectè iudicans morbum, vel imperfectè; aut symptomatica est. Perfectè quidem iudicatur morbus hæmorrhagia, natura superante, antegressis coctionis signis, si die indicatorio crisis demonstrata sit, dièque critico è directo fiat euacuatio, si speciei morbi & magnitudini respondeat; si externis circumstantiis conuenientibus contingat, nempe, ætate, temperamento, victus ratione, loco, anni tempore & constitutione; denique si morbi & symptomatum leuatio sequatur. Imperfecta vero erit crisis, & cum periculo, si sanguis modò parum, modò largiter fluat, per interualla.

Hæmorrhagia symptomatica, aut in longis aut in acutis morbis fit. In longis sequitur ad vitiosam constitutionē partium internarū, & potissimum hepatis, lienis; interdū etiam capitis. In harum enim affectibus sanguis, aut profunditur copiosè, resolutio scilicet, aut obstructo hepate, vel liene. In lienosis enim sanguis tenuis sursum rapitur ac diffluit: crassior verò in splene relinquitur, quo repletur ipse & hepar replet, quia non expurgat.

Hæmorrhagia symptomatica in morbis acutis, paucas sanguinis stillas excernit, vi febris, crisi frustra tentata, & malignitate morbi, vitio sanguinis & cerebri debilitate. Quod stillicidiū indicatorium est non iudicans, & ideo prauum dupliciter. Primum, quia indicat materiam rapi
ad

ad caput partem nobilem, cui natura dominari non potest: deinde quia naturam copia, aut malignitate materiæ opprimi denuntiat, aut ad extremam infirmitatem recidisse. Quæ moliri aliquid tentans, prima statim aggressione superata, succumbat pugna. Quod omnium signorum est pessimum. Non minus quam si pustulæ, aut tubercula intrò foras erumpentia, celeriter dispareant.

De progn. vomitionis.

C A P. XV.

DE vomitu quatenus motus cõcussiui symptoma est, egimus libro tertio. Hîc autem tantum consideramus excrementa, quæ per vomitum reiiciuntur, vel criticè, vel symptomaticè. Criticus vomitus rarus quidem nostris, frequentior temporibus Hippoc. laudatur apud eundem Hipp. qui ex pituita & bile permixtus est, nec admodum crassus sero exhausto, nec paucus, aut copiosus & frequens, nec subputridus & fœdi odoris, nec liuidus, niger, aut his omnibus coloribus variegatus. Laudatur quoque vomitus & criticus æstimandus, qui morbi remissionem adfert, & à toto corpore manat. per aphor. in coac *Vomitio minimum molestâ est, quæ bile & pituita permiscetur, qua non valde multa & copiosa*

Q s

enomantur. Symptomaticus vomitus febribus superueniens, aut easdem concomitans, coniunctus est cum anxietate, quæ cum fastidio & nausea copulata, ostendit ventriculum affici; cum viscerum æstu, significat incendium in partibus circa ventrem; ubi oculus febris latet & materia exurit. Quæ anxietas praua est, ut signum & ut causa, ut suo loco declarauimus:

De progn. cruenta vomitionis.

C A P. XVI.

Sanguis qui per os reiicitur, à qua parte erumpat, ostendit modus excernendi (ut antea dictum fuit) & eius copia. Nam qui copiosus sanguis euomitur, aut à pulmonibus manare, aut à ventriculo, certum est. Illic tamen cum tussi, hîc cum nausea reiicitur. Ad ventriculum autem tantus sanguis redundare non potest, nisi ab hepate aut liene, aut ab utero, per venas, quæ ventriculi membranis inseruntur; idque in plethoricis, mutilatis, otiosis, & opiparè de gentibus. Atque in quibus suppressæ sunt hæmorrhoides, aut menses, aut grauis aliquis affectus iecur aut lien obsidet. Quorum vnumquodq; propriis symptomatis declaratur. Vtrû autem sanguis à proprio affectu ventriculi, aut aliunde effluat, tam per vomitum, quàm per secessum,

cessum, declarat sanguinis substantia & color. Liquidus & ruber de aluo exprimitur, Niger verò & *rumbosus* per aluū trāsmittitur. Et quoad prognosim, omnem excretionē sanguinis, quæ vel vomitu, vel deiectione fit, damnat Hippocr. Quamuis collecta copia sanguinis integris viribus, nullo ægri periculo, potest vomitu deijci. Quæ si retineatur, vel concrefcit, vel putrescit, & tandem veneni vim concipit.

De progn. meraca vomitionis.

C A P. XVII.

MEracum apud Hippocratem aliquando appellatur omnis humor mixtionis expers, ut omne excrementum fœtidum & crudum, quod suo sero dilutum non est. Cuius generatio facta est, vel partis alicuius vitio, vel feruore. & incendio febrili, exhausta scilicet aquosa, & serosa parte. Propria tamen significatione, per meracum intelliguntur, biliosa, atrabilaria, porracea, eruginosa excrementa. Nam bilis ipsa, quia inter omnes humores maximè aquea humiditate diluitur, cum nempe cocta est & naturalis, ideò prima fere accenditur in febribus, generaturque ex reliquis humoribus per incendium: idcirco Gal. per meraca biliosa interpretatur. Meraca igitur vomitio omnis mixtionis expers, quia symptomatica semper est:

est: & à labe partis officialis, lienis nempe, hepatis, ventriculi, sequitur, aut à febre ardente, cuius incendio serum absumitur, inter signa lethalia semper est habenda.

De progn. vomitus eruginosi & nigri.

C A P. XVIII.

PRognosis eruginosę vomitionis certius colligitur, præposita distinctione porracei humoris & eruginosi. Ille enim generatur sæpius ab alimentis corruptis in ventriculo, & peculiari quodam cruditatis vitio: quæ in infantibus torminosis multa colligitur. In adultis etiam ac fanis, statis certisque temporibus, vomitu vel deiectione repurgatur. Eruginosus verò ortum habet à flava bile supra modum exusta, aut à crasso sanguine, aut à succo melancholico, semper calore præter naturam interueniente. Atrabilis igitur & eruginosa, maximè quæ à bile adusta fit, quocunque tempore appareat, & per quencunque locum feratur, lethalis est, ut signum & ut causa. Ut signum quidem, quia caloris ignei inexplicabilis cuiusdam putredinis, & intemperiei inexpugnabilis viscerum nobilium, & partium vnde manat, est signum certissimum. Ut causa verò, quia tantum retinet acrimoniam in tenuitate partium calidiorum, ut viscera ipsa nobilia, ventriculum & intestina, erodat.

erodat. Crassitie autem aliarum partium vstarum ita contumaciter adhærescit, vt neque celeriter permeare queat, neque tota simul excerni: vnde cancri & vlcera immedicabilia nascuntur. Hipp. tamē aph. 22. li. 4. videtur velle atrabilem in progressu morbi posse salutariter excerni per vomitum aut per aluum, cū ait: *Morbis quibusvis incipientibus, si atrabilis supra infraue exierit, perniciosum.* Priorem sententiam confirmat Gal. in coment. Verum quippe esse & perpetuum atrabilem, per vstionem genitam, per quamcunque partem feratur, esse semper signū mortale. Sed verum quoque est eundē nigrum humorem & atrabilarium, cuius acrimonia & malignitas retusa est, per admisionem cæterorum humorum, vbi signa coctione apparuerint, posse bonis ægri rebus per vomitum & per aluum repurgari, & maximē si humor melancholicus à liene in ventriculum refluat.

De prog. vomitus in principio morbi contingentis.

C A P. XIX.

EXcrementorum quæ in principiis morborum excerni solent, multa sunt genera. Vnum est materiæ antecedentis, quæ in ventriculo, aut toto ventre inferiore cunctatur: quæ excrementa non inutiliter excernuntur in principio

cipio morbi, sicut diximus alui profluuium, in principio pleuritidis, interdum prodesse, ad reuulsionem materiæ antecedentis. Alterum genus est quorundam excrementorum tenuiorum partis alicuius affectæ, vt est ichor in vlceribus, à quibus nausea cum paucò vomitu, resudante scilicet sero à copia ex venis in ventriculum, aut ab inflammatione, vt tenuia sputa in principio pleuritidis. Tertium genus est eorum excrementorum quæ à partibus resolutis manant imò potius colliquamenta sunt, aut humores vtilēs earundem partium: qualis est hæmorrhagia, splene grauitè affecto; profluuium alui in tabe; proluuiēs rubra, in infirmitate iecoris; vrina cruenta, in affectis renibus. Et hæc excrementa à quacunque parte ferantur, lethalem affectum ostendunt. Quartum genus est eorum quæ ante coctionem à materia morbifica, natura fatigata secernuntur: quæ eò sunt deteriora, quò longiùs absunt à morbi statu. De quorum omnium excrementorum prognosi, hoc in vniuersum dicitur, nullam excretionem in principio morbi carere suspitione, propter rationes alio loco allatas.

De prog.

*De progn. vomitus, in putridis febribus
contingentis.*

CAP. XX.

NAuseam & vomitum fieri affecto ventriculo, aut per se aut per consensum, dictum est antea. In febribus autem putridis contingit utrumque symptoma fieri, aut propter resolutionem à venis, aut humorum confluxum ad ventriculum, aut à phlegmone partis alicuius vicinæ, rarò à primigenio affectu ventriculi, qui vomitus tunc sedatur venæ sectione. Quæ formidanda non est statim in principio, quamvis nauseabundi videantur ægri. Aestimatur autem talis vomitus prauus, ut signum, & ut causa. Nam quatenus indicat humoris malignitatem in ore ventriculi, qui non potest excerni, prauum signum est. Quatenus verò continuis lacerationibus & vellicationibus, venter affligit, & grauius lædit, phlegmonemque vel facturus est, vel aucturus, si iam sit facta malum aestimatur ut causa, per aphorismum: *Nauseantes citra vomitum, exacerbationibus tentari malum, & qui vellicantur citra vomitum,*

De progn.

De prog. vomitionis cum alui fluxibus.

C A P. XXI.

IN vomitu vim esse aluum adstringendi & Imouendi, colligitur ex illo Hippoc. 2. acutorum, *Vomitum ventrem compactum soluere, & egerentem magis quam oportet, sistere.* Idem sentit aph. 15. lib. 6. *Longo alui profluvio laboranti, superuenientem spontè vomitum soluere morbum.* Non tamen perpetuum est, vomitum vtilem esse in omnibus alui fluxibus sistendis. Dysentericis enim vomitus biliosus malus iudicatur Hippoc. maximè si in principio contingat. Primò, quia humor sursum fertur, qui per inferiora debebat euacuari. Secundò, quia in principio nihil benè excernitur à natura. Et semper prauum iudicatur, stomachum per sympathiam affici in dysenteria.

De prog. vomitus, vulneribus superuenientis.

C A P. XXII.

QVamuis in omnibus vulneribus, præsertim his quæ partibus neruosis infliguntur, vomitus superuenire soleat (habet enim ventriculus cum partibus neruosis nō modicam communionem) maximè tamen & frequentissimè con-

contingit in vulneribus capitis, potissimum cerebro sauciato, aut dura eius mēbrana diuulsa. Idque non solum initio propter dolorem, sed etiam post initia propter inflammationem & febrem. per aphoris. *Quibus diuulsum est cerebrum, iis febrem & biliosum vomitum superuenire necesse est.* Fit autem biliosus vomitus in omnibus vulneribus duobus modis: vno, per continuam bilis synceræ generationē à febre acuta, & per phlegmonem partis vulneratæ: altero propter alienationem loci sauciati, quæ tanta est vt per nervos ad cerebrum perueniat, & inde ori ventriculi communicetur. De exitu autem vulnerum, nihil certi statui potest per vomitum: alia enim signa certiora sunt suo loco quærenda. Per vomitum enim tantum dignoscitur, vtrum ex vulnere accepto cerebrum læsum sit, an illæsum. Læsum esse ostendit, vomitus à principio contingens, diutiùs perseuerans, aut per intervalla rediens, aut si simul cum febre symptomatice cerebri inflammati incipiat. Illæsum verò, si in principio tantum inceptus vomitus, diutiùs non vrgeat, neque quicquam ferè reddat, præter ea quæ alio continebantur.

De prog. à diæctionibus sumptis.

C A P. XXIII.

PER alui deiectiones demonstratur constitutio & œconomia partium naturalium. Pri-

R

mò , stomachi & intestinorum : secundò , simæ hepatis & consequenter cæterarum partium. Quarum deiectionum bonæ & laudabilis conditiones initiò ob oculos sunt ponēdæ, vt quantum ab his reliquæ omnes præter naturam distent dignoscamus. Optimæ igitur deiectionis notæ hæ sunt apud Hippocr. in prognosticis, vt scilicet sint molles, coagmentatæ, subrusæ, non valde graueolentes, hora consueta excretæ, & ea copia quæ assumptis respondeat. Quæ notæ robur trium facultatum aluinarum significant. In coquendo, retinendo, & expellendo : atque nullius aliunde humoris affluxu coinquinari.

De prog. liquidarum deiectionum.

C A P. XXIIII.

Longè abest deiectio liquida, ab ea, quæ naturaliter est coagmentata & figurata. Quæ tamen si copiosè, liberè, & rarò ducatur, sine stridore, crassescens excrementis, dum itur ad crisim, modò aluus solida sit, non distenta, aut contracta, bona spe medicum recreat, & consolatur. Est tamen in morbis acutis, deiectio liquida, aliquando magis damnanda, quàm aluus adstricta. Nam quamvis adstricta aluo metus sit ne caput lædatur, & febris augeatur : à liquida, nihilominus contingit febrē inualescere, & caput

put lædi, vt videmus in febre pestilēti, vbi aluus sæpè fluit, & vires exoluit, & tamen ægri delirāt, & grauius febricitant. Liqueſcunt autem deiectiones vel criticè vel ſymptomaticè. Criticè aluum turbari oſtenditur ex natura & motu morbi. Quibus addendum eſt, Si abſint hæmorrhagiæ, ſudoris, & vomitus notæ. Nulla ſiquidem ferè ſigna propria, & manifeſta excretionis criticæ habemus. Quo fit vt per negationem, in his eſſe præſagiendum, admonet Gal. Symptomaticè verò liqueſcit aluus, vel vitio partium naturalium, & primæ cōcoctioni dicatarum, quo vel non eoquitur alimētum, vel non diſtribuitur; aut vitio instrumentorum excretioni inſeruientium: vel denique liquidæ ſunt deiectiones à colliuatione, & reſolutione partium. De quorū prognostico actum eſt ſuo loco. Damnat Hipp. deiectiones liquidas in veternoſis iacentibus, in illis ſcilicet in quibus vires ita exolutæ ſunt, vt ampliùs ipſum corpus portare non valeant. Quod ſi veternoſi decubitus, pondus & oppreſſio oneris ſola ſit cauſa, non ſtatim damnanda eſt liquida deiectionis, quin potiùs ſalutaris æſtimanda, ſiue natura, ſiue arte moueatur.

De prog. siccarum deiectionum.

C A P. XXV.

DEiectiones siccae, circumscriptae proprio termino, & in globulos coactae, dicuntur ab Hipp. caprarum similes. Tales sunt aut vehementi resiccatione, aut humidi quo diffluunt abumptione. Cuius exiccationis causa duplex est, cunctatio nempe & mora in intestinis, atque caloris ignei abundantia. In illa interiores sinus omnem humiditatem, calore etiam moderato agente, amiserunt longo tempore. In hac, calor igneus vrendo, & humidum absumendo, exiccatur & indurat breui tempore. Vtra autem causa deiectiones exiccentur, nigrore distinguitur. Nam cum à moderato calore, laxando, attenuando, & resoluendo paulatim absumitur humidum, vstionis nulla nota apparet. Nigra autem & rectorrida, incendium viscerum atque intestinorum, referunt. Talia exire solent in causo, & inflammatione iecoris, quae prava sunt ut causa & ut signum. Non enim excluduntur, nisi ad necessitatem, artificio per clysmata aut glandes. Retenta verò, exhalant ad caput, & humorem sursum mouent. Significant etiam partes interiores praeter siccitatem & incendio exaruisse, magnamque naturae infirmitatem.

De prog.

De prog. albarum deiectionum.

C A P. XXVI.

Albescunt deiectiones, aut absentia bilis, aut mixtione alicuius materie. Absentie bilis tres sunt causæ: vna est raptus ad cerebrũ, à feruore & igneo calore, vt in quibusdam phreniticis, aut translatio, vt in ictericis. Altera est inflammatio connexæ partis hepatis, quæ ardore, vnà cum bile, sanguinem attrahit, instar cucurbitulæ. Tertia est obstructio meatuum, per quos bilis in intestina reiicitur, ab humore crasso, scirrho aut phlegmone. Quæ distinctio causarum in deiectionibus albis multum facit ad prog. Nam deiectio talis ab absentia bilis primæ causæ, suspecta est & plerumque lethalis ob causas alibi allatas. Secunda magis vel minus periculosa est, pro magnitudine inflammationis hepatis. Ingens enim, valde lethalis est, nisi intra primum circuitum, hæmorrhagia, aut post vicesimum diem suppuratione liberetur æger. Tertia non est per se periculosa. Albæ deiectiones à translatione bilis in ictero, icteri sequuntur exitum. Qui si antè septimum diem accidat, interficere dicitur, motu morbi symptomatico, (de quo copiosius suo loco) nisi succedat hæmorrhagia, aut vrinæ, aut alui profluuium, quæ naturam quasi victam exoncrat, quod tamen

R. 3

rarò contingit. Prog.albarum deiectionum per accidens, & mixtione alterius materiæ, clarior erit, notatis affectibus quibus fieri solent. In colliquatione siquidem, deiectio alba est exigua & tenax. Túc enim pinguedo igneo calore, qui tamen non admodum malignus est, colliquatur. Quod si eadem deiectio subpallida est & lenis, colliquationis maioris est indicium, in qua pinguedo à vehementiore calore absimitur, vel quia pinguedo vetus aut semiputris existit, grauiori periculo. De colliquatione à resolutione, dictum est antea. Albescunt deiectiones mesenterio suppurato, cuius abscessus sine doloris sensu, per venam proximam, in capacitatem recti aut coli intestini reiicitur bonis ægri rebus. Albescunt deiectiones à suppuratione thoracis, pulmonis, aut inflàmationis hepatis, & aliarum partiũ internarum, in quibus vehemens dolor præcessit, aut à toto venoso genere, salubriter & pellente natura. Albescunt denique deiectiones & genituræ similes redduntur in morbis longis & salutaribus, à vitrea pituita.

De prog. rubrarum deiectionum.

C A P. XXVII.

NON rubescunt deiectiones nisi à sanguine quæ communi nomine symptomaticis dysentericæ,

fenterix, non morbi, apud Hipp. intelliguntur. Cruentarū deiectionū quatuor differentiæ assignantur apud Gal. 3. de symptomatum causis. De quib. egimus proprio capite de dysēteria. Quarum prima, quæ à sanguine quantitate peccante est, plus periculi adfert à suppressione, quàm ab euacuatione opportuna. Quæ suppressio etiam importuna, valde suspecta est in deiectione verè symptomatica, metu translationis. Vnde merito Gal. medicos damnat, qui tales deiectiones adstringentib. medicamentis cohibere conantur. Suspectæ tamen sunt eiusmodi humorum noxiorū deiectiones, si in principio morbi conringant, in quo nihil benè potest excerni, aut sine signis coctionis, aut post crīsim frustra tentatam, aut denique ægro extenuato ad extremum & imbecillo. Quantum ad cruentas deiectiones in dysenteria hepatica, semper malæ sūt multis nominibus: Primò magnitudine causæ: Secundò nobilitate partis affectæ: Tertiò materiæ quæ alendo necessaria est, excretionē: Quartò spirituum simul effluentium resolutione.

De prog. nigrarum deiectionum.

C A P. XXVIII.

Humorū nigrorum multæ sunt differentiæ, quorum vnus naturalis proprio hu-

R 4

moris nigri nomine insignitur. Non naturales
 sunt quàm plurimi, omnes ab adustione geniti.
 Horum vnus fit à sanguine adusto & crasso, al-
 ter ab adustione prædicti humoris nigri & na-
 turalis. Tertius à bile flaua & vitellina, vehe-
 menter assatis; quã putant omnium sæuissimam.
 Quartam speciem addunt ab adustione pituitæ.
 Quæ humorum nigrorū distinctio confert plu-
 rimum ad prognosim, cùm alius alium superet
 malignitate. Nam multū differt atrabilis à quo-
 cunque humore adusto fiat, à sanguine nigro
 & succo melancholico: illa enim est multò te-
 nuior, calidissima, & eò calidior quò ex humo-
 re calidiore per adustionem facta est: quamuis
 mole terræ portione, frigida dici possit. Acerri-
 ma etiam est, & instar aceti mordax & erodens,
 ita vt terram excutiat & fermentet, nigra etiam
 est & splendens. Humor autem niger & melan-
 cholicus, contrarias habet qualitates: à quo etiã
 in eo distinguitur sanguis niger: quia hic so-
 lus concrescit, siue à fibris, siue à pinguedine
 qua refrigerata gelascit. Quoad prognosim hu-
 mor niger salubriter & per viã crisis sub finem
 morbi, & sine vlceratione intestinorum excer-
 nitur, præsertim lienosis, modò ne longa sit ex-
 cretio, & vacuet succum melancholicum &
 crassum, siue seorsim, siue aliis humoribus mix-
 tum. Deiectiones autem atrabiles, semper le-
 thales sunt, præsertim in principio morbi. Nam
 si quæ

si quæ adhuc crudo morbo excernuntur, vi morbi non naturæ prodeunt, & vitio dantur: Multo magis atrabilis quæ interno æstu atque incendio genita, vi morbi exclusa, dum per anfractus intestinorum deerrat, abradit, vlcerat, & cancrofa vitia imprimit. Imò perniciofa semper est humoris huius exclusio, siue suprà, siue infrà feratur per aph. 22. lib. 4. Atque si excretio talis humoris mala est, multò magis in corpore eius retentio damnanda. Cùm atrabilis propter malignitatem, & materiæ inhabilitatem à natura neque coqui neque vinci possit, & priùs quam vincatur, interficit.

De progn. biliosarum deiectionum.

C A P. XXIX.

DEiectiones biliosæ cum febre, aut sine febre, vel ortum habent ab alimentis valde biliosis, vel ab hepate, aut à genere venoso exurrente sanguinem, vbi coaceruatur bilis, quæ interdum in ventriculum confluit, si imbecillus fuerit, interdum in intestina, cùm ventriculus firmus est, & aliena excrementa suo robore facilè aliò regerit. Quod si tanta copia fuerit bilis, vt in ventriculum & intestina æqualiter influat: signum est plures partes simul affici, &

R 5

peius est malum. Gal. commen. in lib. 3. de mor-
bis acutis, duplicem deiectionis biliosæ natu-
ram agnouit: quatum vnā bonā appellat,
quæ non meraca est, sed suo sero diluta, non
abundè biliosa: Alterā malā, quæ valde syn-
cera est, à bile flaua, vel vitellina; præsertim si
spumer, non permixtione flatus aut agitatione,
sed à calore igneo, feruorem quēdam in illa
excitante. Sunt autem tales deiectiones soboles
pestilentis & colliquantis febris, ad talem per-
ducētes. Aut causi maligni, ab inflāmatione in-
terna, vel erysipelate, cum debilitate facultatis
hepaticæ. Malæ igitur sunt tales deiectiones,
non solūm magnitudine causæ, & perenni ge-
neratione, verūm etiam exitu & retētionē. Exi-
tu quidem, quia eo augent incendium, non ex-
tingunt, anxietatem cum fastidio pariunt, &
sedem ac intestina exulcerant. Retētionē verò,
dolores acerbissimos creant, vehementes æstus,
cordis morsus, vellicato orificio ventriculi, pal-
pitationem cordis, inflāmato & æstuate
corde. Deiectio itaque biliosa, cū neque desi-
nit, & in synceram & spumosa mutatur, mor-
bum exacerbat, auctique incendij indicium est.
Quod si in morbi declinatione aduenerit, ex-
purgat corpus, & critica est.

De prog.

De prog. variarum deiectionum.

C A P. XXX.

Deiectiones variae dicuntur multis modis, quatenus multis considerantur rationibus. In substantia quidem modò crassae, modò tenues & liquidae: in quantitate continua vel discreta, dicuntur modò multae, modò paucae, modò rarò, modò crebrò deiectae. In qualitate, cum modò nigrae, modò albae, modò virides, modò citrinae, aut alterius coloris, modò foetidae, modò sine foetore, modò foetidissimae excernuntur. Variae etiam sunt deiectiones ratione rerum quae immiscentur: ut nunc spumosae, nunc sine spuma; nunc cum pinguedine, nunc sine ea; nunc ramentosa, modò sine ramentis inveniuntur. Ex quibus variae praenotiones colliguntur, prout à variis affectibus & partibus affectis manant. Quantum ad varietatem colorum in deiectionibus (de quibus hinc praecipue est sermo) si in principio morbi appareat, & in diebus non criticis, irregularis est, & in malam partem accipitur. Quòd si cum robore virium iungatur, quia sic minuitur materia peccans, bona erit ut causa, mala ut signum. Quod etiam dicitur de omnibus excrementorum deiectionibus, per aph. 47. lib. 4. Praeterea haec varietas, quia copia diversorum

uerforum humorum fit longitudinis morbi indicium est : nisi à catholico medicamento, talis excernatur : à simplici enim & vni humori solùm destinato non laudatur. Quòd si successiue fiat eiusdem varietatis deiection, vt vnus malus humor post alium euacuetur, cum facili ægri tolerantia, salutaris est. Melius enim est seorsim diuersas materias educi , quàm si simul omnes vacuarentur.

De progn. deiectionum fetidarum & non fetidarum.

C A P. XXXI.

Quemadmodum graueolentia excedens damnatur non solùm in deiectionibus, verùm etiam in omnibus excrementis, *ita factoris* omnis absentia. Nam in præsagiis , non tantùm spectamus quid contra naturam ægri accidat, sed etiam quid contra naturam morbi. Est igitur graueolentia excedens ingentis putredinis soboles, quam incendium partium internarum, lethali causa peperit, & excrementorum diuturnior mora. Sic excrementa, quæ tum propter putredinem, tum propter ciborum varietatem atque moram fœtere debent grauius , si omnis fœtoris sint expertia, caloris natiui extinctionis, & febris languiscentis est signum certissimum:
febris

febris enim vnà cū vita exstinguitur. Sicut enim dulcedo in sordibus aurium damnatur & lethalis æstimatur ab Hipp. ita fœtor excrementorum grauior, in minùs grauem transiens, citra rationem.

De prog. deiectionum spumantium.

C A P. XXXII.

Spumantes deiectiones eò sunt deteriores, quò cum deterioribus coloribus coniunguntur. Copulantur enim ferè cum omnibus: nam cū excrementa spumantia fiant vel ab agitatione, vel à permixtione flatus, vel à feruore & calore igneo, certum est quæ ab hac postrema causa deiectiones spumant in malis rebus semper habendas esse; præsertim si meracæ fuerint, aut valde biliosæ. Tales siquidem deiectiones testes sunt febris colliquātis, quæ in tabem perducatur, aut pestilētis & causi maligni, ab inflammatione interna; aut denique erisipelatis, cum infirmitate non exigua facultatis hepaticæ.

De prog. deiectionum flatulentarum.

C A P. XXXIII.

Quamuis flatus & spiritus pro vno eodem passim vsurpentur in doctrina Hipp. distinguai-

stinguntur tamen, vt spiritus sit sanguinis purior pars, aut calor qui suas sedes habet in humido tenui. Pars inquam eius particulæ cui hæret, aliud ab ipsa specie, quantitate vnum, corporis & animæ copula, autor naturalis constitutionis, operum animæ instrumentum, qui habet suos affectus præter naturam, resolutionē nempe, extinctionem, alterationem, corruptionem, ablationem, caliginem, agitationem, torporem, stipationem, &c. Flatus verò est humor attenuatus à paruo calore, quem discutere non potest: qui calor paruus dicitur, vel per se, vt cum corrumpitur à contrario specie, vt à frigore, vel à simili; sed in excessu, vt calore febrili: vel comparatè quatenus opprimitur, vel ab alimento, aut à crassis, frigidis, & aquosis humoribus. Ex quibus colligimus flatus generari tribus modis, à flatulento alimento nempe, à crassis, frigidis & aquosis humoribus, & ab intemperie frigida; quæ vel adhuc fit, & restitui potest, vel facta est, hecticæque dicitur Gal. qualis est in hydropse sicco, qui succedit morbo acuto, per resolutionem caloris insiti, à febrili, & consumptionem humidi primigenij. Calor igitur naturalis in alimento, quasi aliud agens flatus excitat. Calor igneus & febrilis, in materia crassa & aquosa, idem facit. Calor autem qui spirituum inopia, aut qualitate frigida paucus est, siue sit cum febre, siue sine febre, ex omni humido in quod
agere

agere potest, flatus commouet. His suppositis, ita de flatibus pronūciabimus, vt eorum libera & liberalis exclusio, ostēdat vegetum calorem, materiam obsequiosam, & meatus liberos. Retentio verò praua sit, vt causa & vt signum. Vt causa quidem, quia dum natura frustra nititur flatus ad infernas partes propellere & foras eiecere, excrementa & flatus contrario motu, ab infernis sursum ferūtur, vnde cephalalgias, vertigines, spirandi difficultates, ab oppresso diaphragmate, sequuntur. Parit quoque eadem retentio alia mala in ventre, qualia sunt, dolor, à tensione & intemperie, tormina ab acri humore cum flatulento spiritu coniuncto & intercluso, dolores circa vmbilicum, propter cœcum & colon neruaceaque corpora quibus colon & renes inter se, & renes lumbis alligantur. Vt signum verò praua est flatuum retentio, quia per eandem stipatio meatuum, materia indomita & flatuosa, ac imbecillitas excretricis significatur. Aut, quod lethale est, resoluti caloris natiui in intestinis & mesenterio, est signum. Et ab hac causa incidunt ægri in tympaniam hydropem, & moriuntur, per aph. 1. lib. 4. At si ab humore tantum oriatur flatus, aut à refrigeratione non fixa & confirmata, aut ab obstructione meatuum, liberantur ægri enemate, purgatione, foru, balneo, & similibus.

De prog.

De progn. deiectionum coactarum & inuoluntariarum.

C A P. XXXIIII.

QUæ de deiectionibus hætenus dicta sunt, ad substantiam earundem, quantitatem, & quantitatem referuntur. Quæ verò de inuoluntariis coactis & cum crepitatione excretis hic dicuntur; ad modum deiiciendi spectant. Deiicit ergo aluus inuoluntariè multis de causis. Vna est resolutio & infirmitas musculorum sphinterem claudentium: viciat enim talis resolutio non expulsionem, sed retentionem. Altera læsio est sensus communis & mentis, quæ vis sentiens, quæ per neruos ferebatur, aufertur. Tertia est excrementi tenuitas sine morfu: facile enim labitur, quia non sentitur. Quarta est excrementi, cogentis naturam ad exclusionem, acrimonia. Et quoad prog. prima & secunda deiectio sine voluntate, malæ semper sunt in morbis acutis; & maximè si ab extincta sentiendi facultate fiant. Tertia verò & quarta per se nihil mali portendunt, nisi cum aliis prauis signis coniungantur. Coactæ autem dicuntur alui deiectiones, aut quia sicciores sunt & duræ, de quibus ante scripsimus; aut quia pituitosæ & glurinosæ, de quibus etiam capite de tenesmo.

Quæ

Quæ si putredine acriores & calidiores euaserint, intestina abrasunt, & dolorem inferunt; malis ægri rebus.

De progn. quæ sumuntur ab urinis.

C A P. XXXV.

VRina, quæ secundæ coctionis excrementum dicitur, sanguinis vehiculum est, virenum secretum. Estque non solum coctionis quæ in hepate conficitur testis fidelissimus, sed etiam omnium partium per quas fertur, affectus representat. In urina igitur (ut per eam de morborum exitu iudicium feramus) considerare debemus non solum colorem, sed etiam substantiam, quantitatem, qualitates alias, contenta, & excernendi modum; de quo actum est capite de læsa actione vriationis. Quoad eius substantiam, ea varia esse dicitur, pro ut variae res cum urina miscentur, vel non miscentur, dum à natura coquitur, vel cruda remanet. De quibus urinae significationibus secundum nostrum institutum fusiùs agemus, si priùs urinae optimæ ægrorum speciem ob oculos proposuerimus cù Hipp. 2. prog. Optima, inquit, urina esse censetur, cuius est alba hypostasis, levis & æqualis, & ut caloris natiui robur & humoris benignitas significetur, atque tota morbi historia talis perscuerans. Nam ut cocta optimè dicatur vri-

S

na, debet primò ab eo humore secerni, qui morbum facit. Secundò cocta apparere debet, non celeriter ac diebus prænuntiis. Nam cùm natura per gradus agat, certis temporibus moueat, diebus criticis quod coctum est aut proferat, aut excernat, optimè damnatur ab Hipp. vrina, quæ repentè, præter rationem & parum coquitur. Sicut illa quæ ex perniciosissima in meliorem subito mutatur: vt copiosius capite sequenti explicabitur.

De progn. ab vrinis modo coctis modo crudis.

C A P. XXXVI.

COctionem excrementorum cuiuscunque morbi, celeritatem & securitatem iudicij prænunciare & metum recidix auferre, asseuerat Hipp. primo epidim. Quod de vera, continua & propria, ac totius materiæ morbificæ coctione est accipiendum. Nam falsa & simulata coctio, speciem veræ sæpe repræsentat, medicumque decipit; vt crudus succus in vrina subsidens vero sedimento haud absimilis. Interrubatur autem & corrumpitur coctionis ordo, vel cùm natura superatur: aut non æquè agit in omnes partes humoris, existente scilicet materia contumaci & inæquali. Hinc aduenit, vt hodie appareant, cras delitescant coctionis signa, & vrinæ

& vrinæ interdum moderatè crassæ, mox tenues & crudæ funduntur. Cùm itaque ordinatus sit & compositus naturæ vincentis progressus, non repentinus, non interruptus, aut intercisus occurso noui mali. Hinc fit vt in omni morbo damnanda sit vrina quæ citò & paulisper cocta apparet, deinde cessans, quæ scilicet modò cocta modò cruda videtur. Ex quo etiam colligimus semel conspecta vrina, siue praua, siue bona, non esse statim de periculo aut salute, aut de alio morbi euentu pronuntiandum. Essèque obseruandas vrinas non solum manè, sed etiam vesperi: quod Hippocr. fecisse asserit Iacotius.

De progn. ab urinis crassis & perturbatis.

C A P. XXXVII.

VRinarum duplex est in morbis consideratio: vel quatenus peculiariter, renum, vesicæ & vræterum ac meatus vrinarij affectus ostendunt: vel quatenus ad acutos morbos totius pertinent; & maximè ad febres acutas. In quibus præcipuum cognitionis momentum ex vrinis pendere, ait Gal. ad sent. 10. sect. 1. lib. 6. epid. Crassarum igitur & subiugalium vrinarum duplex est differentia. Vna est moderatè crassa, quæ non subsidet, quæ cruditatem significat,

S 2

humoris crudi & crassi permixtionem, secretionis absentiam, caloris natiui humorem crassum agitantis, nec superantis, pugnam. Quæ vrinæ cum virium robore morbi longitudinem denuntiant; cum imbecillitate, mortem. Altera est crassissima & maximè confusa, quæ imbecillitatem caloris natiui indicat, ignei & febrilis dominatum, materie crude cum bile agitationem. Atque inde flatulentos spiritus, quibus humores cum suo sero in venis turgent, & quasi fermentantur vt mustum in doliis. Quod signum certissimum esse volunt phrenitidis, aut conuulsionis, aut mortis, & morbi pestilentis. Vrinæ autem turbatæ appellantur, in quibus quod coctum videtur, & crassum est, vnà cum humore permiscetur. Eo modo, vt ait Hipp. quo si quis vrinam totam agitando hypostasim turbauerit. Talis vrina triplex statuitur à Galeno. Quædam minguntur vrinæ lucidæ, quæ postea turbantur, & indicant primum coctionis rudimentum impendere. Quædam contra turbatæ minguntur, quæ postea euadunt limpidæ, quæ omnium optime iudicantur; significant enim naturæ victoriam, & tantillum flatuosi spiritus adhuc superesse. Quædam turbatæ minguntur & turbatæ remanent, quæ omnium sunt deterri-mæ: significant enim naturæ & morbi pugnam, ac ebullitionem humoris: vnde varij effectus sequuntur, prout ad varia capitis loca vapor à febre

febre manans peruenerit. Si enim mentis aciem occupet: hinc delirium: si biliosa acrimonia nervorum principium vellicet, hinc conuulsio. Et si talis motus cum virium debilitate coniunctus est, hinc mors. Tunc enim maior est cruditas quàm à calore nativo vinci possit.

De prog. ab urinis tenuibus.

C A P. XXXVIII.

VRinas artenuari in morbis tribus potissimum modis, obseruatur apud Hipp. multis in locis. Vnus est ab imbecillitate facultatis concoctricis: vnde sequuntur aliquando symptomatice, redundantis serosi excrementi, excretiones: quę vrinę nihil iudicatorij, nihilque commodi habent. Alter est cùm vrinę subito attenuantur, humorum symptomatice translatione ad caput, aut aliam partem phlegmone obsessam. Hinc eminēte phrenitide vrinas artenuari & expallescere videmus, signo perniciosissimo. Tertius modus est cùm ex paucis & crassis, tenues & copiose profluunt, natura per renes totius corporis superflua repurgante. Qui modus optimus & criticus estimatur. tunc enim cùm maior pars cachochinię vacuata fuerit, & reliqua cocta, non est mirum si bonis egri rebus vrinę prioribus tenuiores multo effluunt & co-

piofiores. Quod si sine ullo caloris augmento, crassis vrinis tenues succedant, multiplicis cruditatis potius signum est, quam naturę vincen-
tis. Febris enim crassam materiam attenuans, atque ad coctionem preparans, & ad equalita-
tem reducens, facit ut vrina paulò tenuior in bonis sit.

Omnis vrina aquea, quia procul abest à co-
ctione, in malis semper habetur. Ea autem pes-
sima est quę exquisitè aquosa est, à mortifica-
tione alteraticis & retentricis facultatis. Sym-
ptoma enim est desperatę salutis, presertim in
morbis acutis: & venosi generis affectus similis
exquisitę cruditatis, & lienterię in ventriculo.
Ea verò quę quamvis aquosa sit & tenuis, habet
tamen aliquid tenuis bilis mistum, cùm princi-
pium quoddam coctionis significet, non est ita
mala. Talis tamen vrina tenuis & aquosa, in
pueris, deterrima iudicatur ab Hipp. in prog.
quorum naturę maximè est aduersa. Cùm enim
habeāt pueri plurimùm caloris innati, alimen-
tūque concoquent, non solum quantum satis
est corpori nutriendo, sed etiam membrorum
incremento: vrinam habere debent crassiores
& copiosiores. Pręterea vrina tenuis & cruda
iamdiu talis reddita, cum aliis bonis signis, mor-
bum per abscessum finiturum, in partibus quę
sub septo transuerso sunt, significat. Sic vrina
quādiu fulua fuerit & tenuis, morb⁹ crudus erit.

De prog.

De prog. ab urina copia.

C A P. XXXIX.

VRINÆ quantitas vel continua est vel discreta. In illa redditur multa aut pauca in vna mictione. In hac vel sæpè & pauca, vel sæpè & multa, vel rarò & pauca, vel rarò & multa meitur; in quarû vtraque crassities aut tenuitas coniungitur. Copia itaque vrinæ cû crassitie copulata, sæpè Hippocra. critica est, & præcipuè in morbis longis. Quamuis interdû nihil cõmodi, nihil iudicatorij habeat, ex tertio epid. Quoniã multitudo omnium excrementorum, interdum symptoma est redundantie humorum prauorum, quam natura partium continentium ferre non potest, vt videre est in sudoribus & vrinis à copia serosæ substantie. Nonunquam critica est, natura excernente quæ molesta sunt, cum facili tolerantia egri. Vnde fit vt in solutione morbi pituitosi sæpè vrinæ repentè & multè affatim prodeant. Cùm scilicet naturæ non impeditæ vis ordinato motu & valido progreditur, cuiusdamque paulatim materiam simul & cum impetu tandem excernit. Sic vrinarum copia laudatur ab Hippocrate, si modò colore, substantia, & cõtentis laudabilibus prodeat. Talis enim expurgat iecoris partes conuexas. Atque omnes quotquot sunt in his superiores. Interdum etiam pulmonis abscessu.

De prog. ab vrinæ paucitate.

C A P. XL.

HAbet vrinæ paucitas apud Auicennam multas causas, potus nempe paucitatem, resolutionis multitudinem, alui fluxus. Minuit enim alui fluxus vrinas, sicut vrinæ multæ alui fluxum. per aph. 83. lib. 4 qui est vltimus. Habet etiam debilitatem renum in attrahendo, aut hepatis in discernendo, & emittēdo aquositatem, vt in hydrope. In cuius omnibus speciebus coniungitur vrinæ paucitas: non cum simili malo: nam in ascite semper minuitur vrina, quòd serum in abdomen transeat: in anasarca paulò minùs, sero ad membra cum sanguine pituitoso abeunte, minore malo. At in tympanite, in quo, quamuis non bona vrina esse soleat, tamen copiosior esse debet. Et si vrina vel minuatur vel supprimatur, grauē affectū esse oportet, per quem, quæ propinqua sunt & societate coniuncta, in mali dolorisque consensum veniunt. Damnatur quoque pauca vrina, cum paucò sedimento, in morbis humoralibus: quod crassa intus cohibita nec transcolata, propter obstructionem renum aut hepatis, aut propter crassitiem: tūc enim & crassitie & multitudine morbum auget. Interdum talis vrina cruditatem & ali-

alimenti defectum in partibus solidis denun-
 riat. Pauca denique redditur vrina in strangu-
 ria, siue à proprio vesicę affectu fiat, siue per abs-
 cessum stranguriosum ab Hipp. sic appellatum,
 in historia agri primi lib. 3. epid.

De prog. vrinarum rubrarum.

C A P. XLI.

AD vrinas pertinet, in humoralibus morbis
 præsentem materiæ dispositionem, naturæ
 victoriam aut expugnationem, partium, hepa-
 tis nempe, renum & vesicæ affectus demonstra-
 re, vt alibi diximus. Prætereà vasorum sangui-
 nem continentium & virtutis humores gene-
 rantis tum robur tum imbecillitatem ob ocu-
 los proponere. Vt igitur de illis rectè & vera-
 citer pronuntiare queamus per vrinas rubras,
 scire debemus earum esse tres gradus obser-
 uandos in morbis. Primus est vrinæ subrubræ,
 quæ laudatur tanquam salutaris, solius morbi
 diuturnitatis index. Secundus gradus est præ-
 rubræ vrinæ, quæ videlicet intensè rubra est,
 qualis est multa bile saturata: & hæc cruda est, &
 omni coctione destituta: habetque tantum pe-
 riculi, quantum prima securitatis, & eò securior
 est, quò cum hypostasi alba & leui fuerit con-
 iuncta: si verò cum subrubra, talis sit copulata

ypostasis, critica excretio expectanda est, modò naturæ contentio fortis fuerit. Tertius gradus est urinx cruenta, qualis in nephriticis multis excernitur, à labore, vehementi motu, vt affecto iecore, ab imbecillitate renum, vt in senibus, à dilatactione meatuū per quos ex vena caua vrina in renes percolatur. Et quoad prognosim, si vrina referat proluuicm prærubram carniū quæ assando liquantur, mortem in propinquo esse significat: si verò prærubra fuerit & multabile saturata, aut rutila ab inflammatione serosi humoris, signum est non longi, sed brevis & funesti morbi. Si denique vrina subrubra sit, à liquore seroso sanguinis, longioris morbi signum est, non funesti. Ratio est, quia sanguis omnium humorum mitissimus, facilè vincitur & mitificatur. Non tamen tam citò, quia humiditas eius nimia coctioni resistit.

De prog. ex variis vrina coloribus.

C A P. XLI.

PROPTEREA quòd vrina miscetur cum humoribus (est enim, vt alibi diximus, sanguinis vehiculum, aliud à sanguinis sero) ab iisdem colorem accipere, & eorundem idem repræsentare æstimatur, siue crudi, siue cocti fuerint humores.

mores. Variè igitur coloratur, pro varietate colorum qui in humoribus esse solent, quorum laudabilis esse putatur Gal. lib. 1. de crisibus cap. 11. subruffus; à quo quò reliqui omnes longius recesserint, eò peiores iudicat. Ab eo ergo rufo colore, quia niger distat longissimè, ideò nigræ vrinæ omnium pessimæ sunt æstimandæ: quod tamen sine distinctione non est concludendum. Nam cum duobus modis nigrescant vrinæ, vno per admixtionem humoris nigri & melancholici, aut sanguinis crassi & attri, vt in quartanariis, lienosis, morbis longis, nephritide, suppressis mensibus, ictero nigro; altero per adustionem ab incendio febrili, aut à mortificatione caloris insitipartium: manifestum est, priori modo vrinæ minori periculo nigras ferri, & sæpe esse salutare, præsertim si ad tenues & albas sequantur, copiosè, liberè, & liberaliter fluant, ac cum alleuatione ægri: vrinæ autem posteriore modo redditæ, esse planè lethales, & potissimum si tam substantia quàm contentis nigræ fuerint. Quibus tamen peiores sunt, quæ cum nigredine tenuitatem habent, vehementiorem inflammationem internam, testantes. Gal. lib. de vrinis scribit se vidisse multos, quibus solo sedimento vrinæ nigræ meiebantur, euasisse: quibus verò tam substantia quàm sedimento reddebantur tales, neminem. Funestæ sunt ergo tales vrinæ ex quibus tria lethalia signa colliguntur; humo-
ris

ris nempe malignitas, caloris ignei vis & vehemens impressio, atque venosi generis infirmitas summa. Non tam longè distant à laudabilibus vrinis, illæ quæ herbaceæ & virescentes dicuntur. Quæ tamen si in febribus acutis appareant toto liquore virides, magnum mortis periculum significant: fit enim talis vrina ex flaua bile, maiori incendio in venis maioribus & hepate. Quòd si non in toto liquore, sed in superficie tantùm, appareat herbaceus ille color, minus periculum portendit: significant enim tales vrinæ febrem, quæ quamuis acuta sit, non tantam ramen vim habere, quæ possit totam vrinam immutare: vnde non omittitur omninò spes cōtentionis.

A colore subruffo & laudabili vrinæ, distat etiam oleosa: quæ tamen (vt concludunt nonnulli Hippocratis interpretes) si toto liquore talis est, non adimit spem secundæ criseos, modò cætera omnia consentiant; quia (vt aiunt) à febris cachoetia & malignitate non pēdet. Quòd si oleosa in superficie tantùm appareat, malitia febris inde concluditur. Vtrùm autem huiusmodi vrinæ à renibus affectis duntaxat, vel à pinguedine totius corporis, calore igneo semper dominante, prodeant, ita distinguit Gal. comment. in aph. 35. lib. 7. in renibus, inquit, celeriter fit & vniuersim excretio, propter minus interuallum: in pinguedine totius corporis, non celeriter,

celeriter , sed tardè & paulatim ; pingui scilicet liquato per longos venarum anfractus , tandem ad renes perueniente. De vtriusque prognosi suo loco egimus, & hæc de variis coloribus vrinarum quæ grauiores affectus demonstrant, quæque ad prognosim plurimùm conferunt, sufficiant.

De prog. ab vrinarum hypostasi.

C A P. XLII.

Hypostasis , cuius nomen in omni doctrina Hippocratis ad vrinam tantùm pertinet nihil aliud est quàm illa portio succi alibis quæ in sanguinis confectione virtutem naturæ effugit, in vrina residens: cuius plures sunt species ; quarum illa præstantissima , & cæterarum tanquam regula est, in cuius colore, loco & situ, perspicitur materiæ bonitas, partium solidarum integritas , & vis natiui caloris , sese in omnes materiæ segregatæ partes æqualiter insinuantis. Talis hypostasis Hippocrati est alba, levis, & æqualis : Albedo enim partium spermaticarum à quibus manat integritatem , & materiæ benignitatem significat : æqualitas & leuitas , naturam nihil intactum relinquere ostendit. Debet autem esse tale sedimentum non interruptum, sed

sed perseverans, ut vera non falsa coctio demonstretur. Quæ enim coctio interruptur, aut naturam exolui, caloremque nativum extinguere, aut materiam contumacem esse & inæqualem denuntiat, cuius pars quædam coquitur, alia manet incocta: unde aph. in coacis animaduersionibus. *Vrina bonum sedimentum habens, & derepentè non habens, laborem mutationemque significat.*

Sæpius quidem hoc expertum est, ut quæ initio sedimenta apparebant, in sequentibus diebus desinere: unde aut longitudo morbi, aut anceps iudicium colligebatur. Vbi enim varia materia est, & inde multiplex morbus, varia naturæ cōcertatio, & anceps pugna esse solet. Et quemadmodum leuitas, æqualitas, albedo, sunt notæ laudabilis hypostasis; sic & nigredo, asperitas, dissipatio & concretio, sunt sinistrae & pravae significationes. Referunt enim hæ notæ violentiam caloris febrilis, morfici succi corruptionem, atque naturæ imbecillitatem. De variis generibus hypostasis consulendus est Rondeletius, in libello de vrinis.

De prog. sumptis à sudore.

C A P. XLIII.

SVdor (cuius materia facit in venis febrem, in habitu phymata) est exclusio humoris tenuis & super

& superuacanei intus foras per meatus cutaneos, cuius expulsio vel expressione fit, vel excretionem, vel exolutionem partium solidarum. Qui tres modi à diuersis causis fiunt, vt post hac docebitur. Gal. libr. 10. de facultatibus simplicium medicamentorum testatur eandem esse materiam sudoris & vrinæ, hincque fieri vt cum futura iam est crisis per sudores fiat vrinæ interceptio, eundemque generationis modum. Materia autem sudoris triplex est; vna tenuior portio alimenti humidi; altera serum humorum; tertia colliquatio seu resolutio solidarum partium. Fiunt sudores vel in sanis, vel in ægris: in sanis quidem, alimenti copiam, potum largiorem, plenitudinem corporis, raritatem cutis, iecoris ac lienis copiosum calorem & humorem denuntiant. Quod enim in corpore incaluit, & biliosæ substantiæ aliquid accepit, magisque elaboratum est quàm vrina, vt ad cutem in aquæ speciem per omnes partes transmissum possit peruenire, id sudor est. De quo sudore extat aph. *Sudor multus per somnum factus copiosiori cibo corpus uti significat.* In ægris qui sudor fieri consuevit, vel periodicus est, vel symptomaticus, vel criticus. Periodicus, in sola febre intermittente simplici, aut coniuncta continua, vt sunt semitertianæ; si multus fuerit, naturam resoluit, aut copiam humorum, aut contumaciam indicat; si frigidus, materiam frigidam & morbi diutur

diurnitatem; si calidus, calidam & mitiorem ostendit, per aph. 42. libr. 4. *Sudor multus frigidus calidusve semper fluens, frigidus grauiorem, calidus minorem morbum significat.*

Criticus sudor in febre continua, his notis cognoscitur: si incidat antegressis coctionis signis, si die critico & vigente natura, si toto corpore diffluat, si ita moderatus sit, ut vires non exoluat; denique si inde febres & omnia symptomata acquiescât: quæ nota est certissima omnium sudorû vtiliû; cuius futuri hæc sunt signa & indicia, ad prognosim, obseruâda, nempe urinae suppressio, alui omnimoda cohibitio, deliriû incrementum accessione, calor diffusus in superficiem, atque inde corporis rubedo antea non cognita, vapor calidus diffluens in cutem, pulsus mollis, magnus, vndosus, febris acuta, motus rigoris, atque omnium aliarum excretionum signorum priorum omnimoda priuatio.

Symptomaticus sudor, vi morbi non naturæ factus, duplex est; vnus motu morbi frustra tentata crisi: alter à resolutione partium solidarum, cum raritate cutis & virium imbecillitate. Qui tamen non ita copiosus esse solet. Vtérque interdum lethalis est: interdum difficilis & cachoëtes. Lethalis quidê, si symptomata augeantur, si fiat metastasis in caput aut in alias partes nobiles, si sudor frigidus sit, & morbus acutus fuerit. Cachoëtes verò & difficilis, ac diurni morbi

morbi signum, si tenuior humoris peccatis portio excludatur, crassa & glutinosa remanente, cum robore facultatis. De utroque extant aph. 37. & 56. lib. 4. Tales esse solent sudores qui febres non finiunt, qui cum prauis signis, mortem, cum mitioribus morbi longitudinem ostendunt. Et hæc de sudoribus in genere: quibus si addamus quos morbos soleant sudores iudicare & quibus contingere, multum erit ad prognosticum utile. Familiares igitur sunt omnibus febribus, præsertim ardentibus. Iudicant etiam quotidianas, si multi à toto corpore moueantur: modò pituita cerebri & ventriculi vacuetur cum vomitionibus, & deiectionibus pituitosis: quartanas, si atra simul & varia expellantur: semitertianas, si biliosa simul & pituitosa deiciatur. Finiunt pariter sudores multum feruentes, phlegmonas partium internarum: modò multi, calidi, e toto corpore, & præcipuè à parte laborante, die critico oborti, respondentes morbo, antegressis signis coctionis, manauerint. Hoc tandem de crisi in vniuersum addere lubet, ut quamuis semper respondere debeat speciei morbi, sit tamen sæpe ut eadem morbi idea diuersis excretionibus iudicetur. Exempli gratia febris ardens, tum hæmorrhagia tum sudore, post vehemētem rigorem, tum vomitu & biliosa deiectione finiatur; tertiana vomitibus, deiectionibus biliosis, & sudoribus

T

iudicetur; phrenitis sudoribus bonis, maximè, si è capite multus & calidus profluxerit, vniuerso reliquo corpore sudante, aliquando hæmorrhagia narium. Inflammationes omnes calidæ & acutæ, tû hæmorrhagia iudicantur, tum sudore multo: sin minùs, aut interficiunt, aut ad suppurationem veniunt.

De prog. sudoris multi & pauci.

C A P. XLIIII.

SVdoris multitudinem vel paucitatem metimur, ratione quantitatis continuæ vel discretæ. In continua quantitate multus sudor vna vice prodit, in discreta, multus quoque pluribus, sicut paucus vicibus singulis emanat. Vtroque ergo modo sudoris multitudo contingit, quorum primus quoties febrem non soluit, valde perniciosus est: vires enim celeriter prosternit, & mortem imminentem denuntiat, si febris sit acuta. Secundus modus in quo sudor multus quantitate discreta tantum effunditur, morbi longitudinem portendit, non tamè mortem. Nisi simul cum ipso aliquod symptoma lethale superuenerit. Interdum enim sudor frequenter & paulatim effluens, iuuat, quamuis febrem perfectè non iudicet. Nam ex his quæ non iudicant, alia lethalia sunt, quæ symptoma-
tis

tis augment ægrum, alia difficilis indicij, quæ ne-
 que augment, neque minuunt. Tertius modus
 sudoris, in quo multus est vtraque quantitate,
 nocuus æstimatur Hippocr. per aph. in coacis.
Sudores si paulatim fiant, iuuant: si affatim & subito,
nocent. Feri enim non potest, ut vires diu possint
 sudorem multum, id est affatim & assidue effu-
 sum sustinere. Sudores pauci in morbis acutis,
 siue à toto corpore manent, siue circa caput &
 thoracem tantum ac collum appareant, omnes
 prauisunt. Deteriores tamen qui fiunt in supe-
 rioribus partibus. Tales enim sudores & exuda-
 tiones inutiles denuntiant vel copiam in par-
 tibus sudantibus, vel facultatis retentricis im-
 becillitatem. Gal. comment. in aph. 47. 2. prog.
 non solum de sudoribus, verum etiam de om-
 nibus excretionibus paucis, atque abscessibus,
 præceptum facit, his verbis: *Praua omnia esse, siue*
per nares, siue deorsum per ventrem, siue per vomitum,
siue per sudores, aut uterum, excernantur. Paucitas
 enim ostendit ea quæ excernuntur, vel ferri non
 posse ob copiam, & ob id à partibus affectis
 diffuere, vel moueri quidem à natu-
 ra non tamen tota excerni pro-
 pter eiusdem imbe-
 cillitatem.

T

De prog. sudoris partium superiorum & pectoris.

C A P. XLV.

NON est mirum si partes superiores & pectus tam facile sudent: abundant enim ferosis humiditatibus, & in his raritas est cutis & porositas multa. Accedit quod in facie musculi ita adhærent cuti, ut nihil inter carnem & cutem interpositum videatur. Hic perquisitione dignum est, unde calor & sudor in pectore, ventre & partibus superioribus magis vigeant, rigores verò per dorsum potius inuadant. Causa huius effectus petenda est à natura partiũ: licet enim cor in medio thorace collocatum sit, non æquè tamen posteriora & anteriora calefacit, infringitur enim calor ipsius cordis retrò, non solum propter crassitiem musculorum interpositorum, & ossium, verum etiam propter frigiditatem spinalis medullæ, & vertebrarum. Ad datur quod mucro cordis antrorsum vergit magis. Contingunt igitur sudores circa collum & claviculas, suppuratis, pleuriticis, ut ait Hippo. hique multi, non quantitate continua, sed discreti: multi enim dicuntur, quamvis pauci, sed continui & breuibis interuallis redeunt. Accidit autem illis talis sudor: quia cor anxium, & à multa materia oppressum, humiditatē & spiritus

rus ex agitat, & ad partes superiores spiritum vitiosum transmittit, malis ægri rebus. In moribundis, ait Gal. 6. epid. sect. 7. in comment. sudor frontis, colli, & partiū pectoralium, facultatis animalis imbecillitatem, atque infirmitatem indicare plerumque videtur. Fiunt etiam sudores eiusmodi in febribus horrificis, sed pauci: quibus tamen contingunt magis in principio, cū materia adhuc cruda est. In quo differunt à sudoribus suppuratorum: in quib. multi huius generis sudores fiunt; non solum ab humiditatibus tenuioribus, sed etiam ab alimēto abeunte, quod diductum discutitur, propter virium imbecillitatem, lethali signo.

De progn. sudorum modò incipientum modò desinentium.

C A P. XLVI.

HOc de omnibus excretionibus natura motis dicitur verè. In malis semper haberi, maximè in morbis acutis, si postquam fieri ceperint, protinus cessent: satius enim esset si natura nihil moliretur (modò non quiescat, quia extincta est, sed quia coctioni dat operā) quàm si malignitate materiæ irritata, excretionē frustra aggrediatur. Sudores itaque hoc modo facti, si die critico appareant, quia tunc multi esse

T 3

debent, viriū magnam imbecillitatem arguunt: si verò ante coctionem à materia morbifica scernantur cò deteriores sunt, quò longiùs absunt à statu morbi: est enim semper talis sudoris profusio, malignitatis morbi indicium certissimum, maximè si cum hypochondrij tensione coniungatur, per aph. in coacis: *Quibus non intermitit febris, & frequens desudatio, cum hypochondrij tensione, ut plurimum malignus morbus est.* Vel saltem longitudinis, si vires sufficiant, vbi notandum est nomine hypochondrij dextrum intelligere Hippocratem, propter excellentiam.

De progn. sudoris frigidi.

C A P. XLVII.

DE sudoribus frigidis extat aphorismus 37. *lib. 4. Frigidi sudores cum febre acuta mortem, cum mitiore verò morbi longitudinem significant.* Hic ad prog. supponendum est frigidum esse in corporibus duplex: vnum per absentiam caloris innati, quod priuatiuum vocāt, quale in externis corporis partibus sentitur in his febribus in quibus interiora æstuant. per aph. 48. 4. alterum præsentiam & copiam humoris frigidi, quod vocant positium frigus: in hoc enim qualitas & refrigeratio præsens est, calori contraria: in illo verò est caloris natiui & formæ priuatio quædam

quædã, siue resolutio, aut caloris absentia utroque modo sudor frigidus dici potest, etiam in febre acuta. In qua tamen quærit Gal. commentum in prædictum aph. Quo modo sudores frigidi esse queant frigido positiuo. Respondet, non esse à ratione alienum humoribus putrescentibus in vasis, ardorem illic esse, atque interea calorem naturalem in partibus extinguere & exolui eodem tempore, cum sudoribus frigidis, signo exitiali, siue per excretionem & expressionem frigore positiuo, siue per resolutionem fiat. Illic enim significatur naturam esse grauata copia, quam neque regere, neque continere potest: hic verò calorem innatum exolui & dissipari. Vbi autem frigidus sudor febre mitiore fit, modo vires valeant, posse hominem seruari pronuntiat Gal. concocta scilicet humorum multitudine, & à natura superata.

Finis libri quarti ad gloriam Dei.



PROGNOSEOS

MEDICÆ, QUI EST

DE IIS QUÆ SUMVNTVR

à qualitatibus mutatis, quas affectus

specialiter præter naturam

Galenus ap-

pellat.

LIBER QUINTUS,

PRAEFATIO.



NIHIL à medico de morbi exitu prædicturo, consideratur circa ægri corpus, quod nomine symptomatis non intelligatur; cuius cùm sint Gal. tres præcipuæ differentia, functionum nempe lationes, excretorum & retentorum immoderationes, atque corporis affectus, de duabus primis satis abundè, secundùm nostrum institutum, egimus quatuor libris superioribus. Superest vt de tertio in hoc quinto discurremus, cuius Gal.

Gal. omnium primus quinque statuit species, provt singula vel visu, vel auditu, vel gustu, vel odoratu, vel tactu percipiuntur. Sed quia huius generis symptomatum, alia tantum & primò ab ægro sentiuntur, alia medicus ipse sine vlla relatione ægri considerat: de illis quia ad actiones læsas magis pertinent, easque certius demonstrant, primo libro est actum. Sunt enim illa visus diminutiones, cœcitates, depravationes, surditates, auriũ tinnitus, dolores, sapes, &c. Hæc verò sunt calores præter naturam circa totum corpus vel circa aliquas eius partes tantum, voces, strepitus, voruorigmi, fœtores, durities, mollities, asperitates, læuitates, &c. de quibus, secundum consuetam methodum est scribendum.

Quid de vario colore circa corpus sit colligendum.

C A P. I.

BONUS & laudabilis est color cutis ex albo & nigro permixtus. Talis enim, ait Galenus optimum temperamentum demonstrat : nam cum cutis sit pars spermatica, ex probè confecto semine producta, exactè alba est, sicut lac optimè coctum candet. Sanguis verò exactè coctus, nulla vitiatus cachochymia, ruborẽ floridum, ex hepatis commercio, repræsentat, qui ad

cutem accedens, alimenti gratia, pulchro rubore faciem suffundit. Ex quibus duobus optima proportionem mixtis, nascitur prædictus color : à qua integritate coloris, tātū abest cutis, quantum à perfecta coctione deficit utrunque principium. fiunt autem ægri decolores duobus modis; vel sanguinis penuria, quos reficiendos vult Hipp. lib. 4. de acuris, calefaciētibz nempe, vel exercitatione, vini potione, cibis calidis, &c. Alij sunt mali coloris homines, quibus corpus malè affectum est, aut quia in eorum partibus solidis est alimenti corruptio, aut quia sanguis qui ad eas partes pervenit, est coinquinatus: habet enim sanguinis vitiū causas antecedentes, ut cordis, vel hepatis, vel lienis affectus quosdam præter naturam; cor siquidem ut totius corporis moderatur calorē, sic & toti impertitur colorem, splendorem, & viuidum quendam spiritu florem, unde in affectibus cordis mutatur color. In affectibus quoque animi & cardiacis, fiunt vicissitudines coloris & caloris, ab agitato spiritu & calore in ipso. Hepatis etiā vitio fiunt ægri decolores; interdum colore plumbeo, aut magis fusco: interdum pallore albicante; nonnunquam aliis quibusdam ineffabilibus colorum proprietatibus, quæ, iecore suo munere non probè fungente, sine tumoribus præter naturam, accidere solent. Sic propter lienis vitia tales colores fiunt, multò tamen nigriores, quàm

quàm qui ab hepate proueniunt. Sequitur pariter aliquando color cutis intemperiem muscutorum, non reliquarum partium: nec semper color naturam succi dominantis indicat, præsertim cùm humores in profundum recesserint.

De progn. à rubedine faciei.

C A P. II.

NVlla est in corpore humano particula, quæ tam facilè colore rubro suffundatur, quàm facies, & hoc quia rara & laxa eius cutis est, & quia sic coaluit carni, ut separari non possit; aut quia eo loco sita est, quo ferè vapor & exhalatio totius corporis euadat, & ubi subsistat. Rubet autem facies sine febre, aut cum ea; perpetuò, aut per interualla; cum pustulis, & sine pustulis. Rubor perpetuus, feruidioris sanguinis nota est, ex interuallo recurrens, solius vaporis eo sublati, aut tenuioris humoris nondum impacti, est signum. Rubet igitur facies pulmone inflammato, & ex calido humore, multis vaporibus in caput elatis, qui replent cerebrum, atque interdum phrenitidem faciunt, semper verò faciei ruborem inuehunt. Rubere facies solet in omni difficultate spirandi, si vehementior sit, eo quæ magis si vnà dolor capitis adit cum multa caliditate. Si rubeant ambæ maxillæ, signum

gnum est insignis inflammationis internæ , aut melancholiæ morbi , aut translationis materiæ ad caput , vt cùm imminent parotides . Rubet facies & oculi , imminente profluuiò sanguinis per nares ; quòd si non sequatur, existente morbo acuto, furor , & extinctio naturæ aliquando succedunt. In morbis ergo acutis , rubedinem faciei non carere suspitione aiunt : fieri enim non potest in morbo bene colorentur ægri secundùm naturam , quos morbus decolores faciat. Quare subesse aliquam causam præter naturam necesse est , quæ ægros bene coloratis similes reddat. vnde Hipp. sententia 14. 2. prorrh. scribit , faciei colorem bonum , & moestitiam multam malum esse. Et in coac. *Faciei color bonus cum tetrico aspectu in acutis , malum.* Nam quoties sine crisis expectatione, florida ac rubens facies apparuerit, in febre essentiali ; idque præter peculiarem naturam ægri : si quidem æger valdè tristis deprehendatur, cum tetrico vultu, & perturbato , quædam in cerebro valdè calida affectio suspicatur , quæ sanguinem exurit, & bilem atram generat: vnde certò phrenitidem, in acutis, & melancholiam, ac etiam maniam licet præsagire.

De prog.

De progn. rubedinis pectoris.

C A P. III.

COntingunt rubores pectoris aliquando in morbis acutis & malignis pulmonum, in quibus nihil coctum expuitur, aut paucum, quamvis coctum, & quod paulatim vix excludatur. Quibus siquidem rubores in pectore, non in fastigium collecti, sed effusi oboriantur, qualia sunt erysipelata iuxta fauces, ex tenui & acri sanguine, horrenda res est & lethalis. Hoc enim morbo adhuc crudo, & circa principia & incrementa, criticè fieri non potest, nec notas habet salutaris abscessus.

De progn. rubedinis manuum & partium extimarum.

C A P. IIII.

Rubent & inflammantur manus & pedes aliquando febre, subsequente signo non lethali, nec admodum periculoso: aliàs præcedente febre idque duobus modis: vel criticè, cum scilicet longissimè à foco morbi abscessus fit, cum signis coctionis præcedentibus, signo salutari: vel symptomaticè, quod perniciosum est ut signum & ut causa; ut signum, quia naturam
omnino

omniñò infirmam, aut copia materiæ tanquam stimulo concitatam, aut aliquod nobilem viscerum grauissime affectum, significat: vt causa, quia partes eiusmodi totam materiam, aut excipere non valentes, aut exceptam coquere, sunt causæ interdum syderationis partis, & symptomatum quæ ad effluxum humorum ad interiora consequuntur: vnde aph. in coacis animaduersionibus: *Rubores in manibus & pedibus lethales.* Quos deteriores nigroribus æstimat Aui-cennas. Nam nigrore manuum & pedum, materiæ solùm decubitus, & spiritus vitalis interceptio, monstratur. Rubor autem præter hæc germen habet in partibus nobilibus. Tales igitur rubores cum sensu ponderis contingentes, quia significant calidissimi sanguinis suffusionem, atque facultatis animalis & vitalis extinctionem, quæ onus materiæ morbificæ & membri amplius ferre non potest, mortem in propinquo esse denuntiant.

De progn. coloris nigri & liuidi quarumlibet partium.

C A P. V.

Color omnis eò perniciosior putatur, quò à naturali magis discesserit: vnde Hipp. in prog. colorem totius faciei nigrum, & liuidum
maximè

maximè damnat, tanquam omnium pessimum, ut qui sanguine refrigerato proueniat. Pallidum verò & plumbeum, initium quoddam esse nigritiei & liuoris, à frigiditate. Hinc venulae in oculorum albis liuidæ & nigræ, quia extincto calore natiuo refrigerantur, in propinquo mortem denuntiant. Liuidum tamen colorem omninò lethalem esse sine distinctione, nō est pronuntiandum: nam liuor interdum fit sola interceptione spiritus vitalis, & caloris influentis, qui propter paucitatem & ad interiora recessum, diffundi in membra non potest: ut in syncope, in febribus diuturnis, in quibusdam accessionibus. Ex quo liuore seu pallore, potius periculum, non propinquum exitium est prælagendum. Liuor autem qui in acutis febribus contingit, ab eiusdem caloris vitalis extinctione manat. Modus quo liuiditas contrahitur est duplex. Vnus, cū calor igneus floridiorem ac spiritu lucidiorem sanguinis partem exhaurit; terrenam concretamque exurit, & subtrahit humidum quod caloris insiti subiectum est. Alter est cū frigus tenuiorem sanguinis partem exprimendo, inducit liuorem, & nigrorem, caloremque natiuum extinguit. Apparetque hic liuor præcipuè & primò in facie, palpebris, ungibus, digitis & pedibus: tum quia à caloris fonte longo intervallo disiunctæ sunt partes: tum quia arteriæ & venæ multæ ibi finiuntur.

De

De quo liuore verificatur aph.in coac. *Liuida facta corpora in breui mortem denuntiant.*

De prog. vicissitudinis caloris & coloris.

C A P. VI.

Quemadmodum in calore & frigore est vicissitudo, sic in colore esse solet: sequitur enim vtrumque vel humoris motum, & naturæ vel victoriam, vel casum. Quæ vicissitudo siue in sanis, siue in ægris fiat, cordis semper affectionum soboles est: cum enim operatio cordis in corpore sit, calorem totius moderari, simul & toti impartiri colorem, splendorem, & viuidum quendam ex spiritu florem, meritò in cordis affectibus illa mutantur, seu cordis opera. Sic color totius & calor augetur in febris generatione à sanguine: vel immodicè remittuntur in rigoribus, retrahente corde à toto calorem. Similiter in animi per sanitatem affectibus, vt in cardiacis alterato corde, frequens est caloris vicissitudo. Ex qua quantum ad prognosim attinet, in ægris cordis oppressionem & magnam ac frequentem variæ multiplicisque materiæ agitationem, colligimus, tantò deteriorem, quantò illa mutatio longiùs à natura discesserit. Interdum etiam caloris natiui extinctionem. Quod si antegressis coctionis signis, & die critico contingat ista caloris & coloris mutatio,

mutatio, utilis erit. Et critica perturbatione accidisse, dicendum est. Sim minus, aut mortem, aut morbi diuturnitatem significat. Hoc tandem de huiusmodi coloribus in vniuersum est pronuntiandum : nullum esse non naturalem, qualiscunque sit, qui cum virium langore non sit funestus. Nullumque esse tam atrum & horridum, qui si vires validas habeat, aliquid salutis spei, non possit relinquere.

De prog. à coloribus linguae.

C A P. VII.

Linguae affectus sunt in gustu, motu, sermone & colore. De tribus primis actum est libro primo. De postremo hoc loco agendum quatenus ex colore linguae, aliquid de exitu morborum acutorum possumus praedicere. Lingua enim, quia flaxida est, laxa & mollis, cum vasorum amplitudine, manifestiora indicia praebet de humoribus, & de natura morborum, quam vrina: est enim vincenti materiae, aut coniunctae concolor: quo fit vt medico, veniat crebro spectanda. Nam non solum pulmonum & ventriculi colorem, substantiam & exhalationem humorum refert, sed etiam succorum nutritioni dicatorum, & seruum humorum, ac vapores è venoso gutture, ac toto corpore suscipit,

V

& oculis repræsentat. Et hoc quidem per venas & arterias, illud verò per continuitatem tunicæ interioris, quam habet communem cum pulmone & ventriculo. Quibus duabus partibus malè affectis, promptissimè immutatur lingua. Colores autem quibus lingua intingitur, sunt flauus, pallidus, æruginosus, niger & ruber. Primus à bile sero exusto: secundus à bile sero immixto: tertius à bile, sero vehementer torrido: niger verò color, bilis nigræ & fuliginis, caloris febrilis sanguinem exurentis, soboles est, & quoad prognosticum. Quamvis nihil certi statui potest de morbi exitu ex solo colore linguæ, iunctus tamen cum aliis signis, plurimum præbet certitudinis, præsertim in morbis acutis. In quibusdam quidem febribus, nulla signa ex lingua eduntur, quia vel hæ sunt leues, vel in venis quæ ad infernas corporis partes pertinent, aut non ita linguę consentiunt, qualis est lien & vterus. Quantum autem ad colores linguæ in morbis, considerabiles maximè sunt, liuidus, niger & ruber. Liuor semper damnatur ab Hipp. quia sequitur ad solam calidi extinctionem. Ita vt si digito contingatur lingua liuida, frigida sentitur, lethali signo. Niger, non semper: interdum enim sequitur ad decumbentem humorem nigrum, interdum ad eleuatū vaporem humidū vltum, vnde nigricant etiam dentes & sputa, tuncque
lingua

lingua humida est & nigra, sine periculo. Sed nigredo linguæ quæ sequitur in ardentissimo causone, aucto incēdio, post siccitatem, ariditatem, & scabritiem, vnde lingua cuti sole exustæ similis sit, malignitatem febris ostendit, & lethalis est. Ex linguæ etiam nigredine, celeritas & tarditas indicij definitur, quod vel principio, vel post principium nigrescit: ita inualescens incendiū se prodit, & celerior morbi motus. Quò enim celerius mouetur morbus, eò celerius indicium expectandum. Rubra verò lingua, multis peripneumonicis, multis quoque maligna & lethali febre laborantibus apparet. In morbo siquidem vbi oportet nigricare linguam, si ea rubeat, admodum periculosum est.

De progn. Icteri.

C A P. VIII.

Habet icterus nomen à qualitate mutata, id est à calore, qui ad flauum aut subniridem tendit, cuius causa proxima est bilis effusio per cutis meatus exiguos. Apparetque primo in albo oculi, quæ pars est omnium albissima, deinde in cæteris detegitur. Causa effusionis eiusmodi duplex est: vna externa, qua coinquinatur sanguis citra hepatis affectum insignem, ut à veneno, à catharticis non purgantibus, ab intem-

peres iecoris, & venosi generis calidiore : à quibus causis icterus sine febre est , & rarò contingit. Altera interna , eaque multiplex : aut enim effunditur bilis laborante iecore, vel vesica fellea obstructa ; aut sine vlla iecoris affectione, vt fit in febribus. Quibus suppositis colligimus icterum esse triplicem : vnum planè symptomaticum, à iecore, scirrho, obstructione, inflammatione, grauitè affecto : alterum criticum, sed imperfectum, aut prauum ante septimum factum : tertium criticum & perfectum. Qui sicut ante septimum fieri non potest, ita post septimum, nonum nèpe, vndecimum, decimum quartum, criticus hoc sensu dicitur, modò sequentibus circumstantiis coniungatur : vt scilicet die critico, antegressis coctionis signis incidat ; sine hypochondrij duritie, aut inflammatione, atque cum puritate vesicæ, & alui excrementorum. His notatis, licet ex doctrina Hipp. colligere, icterum aliquando malum, aliquando ambiguum, aliquando mortiferum, aliquando salutare signum esse. Salutaris quidem est, qui post diem septimum ; prædictis conditionibus fit : exitialis, qui symptomatico motu morbi ante septimum : eo enim tempore flaua bilis cruda, in sudorem abire non potest : habetque malignitatis signa, malâ crîsim significantia, aut malum iecoris, aut vesicæ felleæ affectum. Ex quibus malis, cùm vltra septimum diem possit etiam bilis

bilis suffusio fieri : sit vt non necessario concludi possit, bonum esse icterum factum post septimum diem. Sic icterus vitio hepatis factus, non æqualiter est perniciosus. Nam qui à simplici obstructione fit, cuius causa facilè interdū mouetur, cibis, medicamentis extenuantibus, deinde catharticis bilem purgantibus, & sæpius iteratis, minus periculi habet. Qui verò ab ingenti hepatis inflammatione, lethalis est. Et si in febre ardente fiat, cum singultu die quinto, nisi intra primum circuitum, hæmorrhagia, aut post vigesimum diem, suppuratione liberetur æger à mortis periculo : at qui icterus ab scirrho hepatis fit, in hydropem ducit ægrum. Prætermitto icterum nigrum, qui fit non solum affecto liene : sed etiam ab hepate calidiore, quod sanguinem assando mutat in atram bilem : quia eius prognosis facilè ex affectibus lienis, & ex supradictis potest colligi. Icterus verò qui à causis procatharticis, vt ab exhaustu veneni, vel morfu bestię venenatæ, habet suum prognosticum ab accidentibus quæ tales causas sequuntur.

* * *

V 3

*De progn. à qualitatibus mutatis quas medicus auditu
percipit circa ægrum.*

C A P. IX.

QVæ de aurium vitiis diximus lib. primo, de modis erant quibus auditus lædebatur, ab ægris tātū recensitis. Hic autem de vocibus & sonis, quos medicus circa ægrum considerans, prognosim firmat, siue voces clangeres sint turbidæ, tremulæ, rācæ, siue soni & murmur intestinorum, siue strepitus dentium & similia. Accidunt igitur voci læsiones deprauatæ, diminutæ vel abolitæ, tum per multas affectiones facultatis animalis, laryngis, faucium, nervorum recurrentium, cerebri, diaphragmatis ventriculi, &c. Tum maximè, per affectus pulmonum. Minuitur siquidem, exigua & obscura fit vox, infirma facultate in cerebro, aut per musculorum & nervorum affectum. Aliquando subitò intercipitur, multa euaporatione à commota materia, aut catarrho præforante. Deprauatur & fit rauca, distillatione è cerebro, multo humore fauces imbuente, & guttur irrigante. Deprauatur dum acuta & clangosa fit, angustia vocalium instrumentorum. Quæ si naturalis fuerit, vt in pueris, spadonibus, & mulieribus, nihil mali portēdit: si verò præter naturā, siue

siue primò & per se muscoli laryngis ac vocalia instrumenta phlegmone obsideantur, vt in angina, siue absente phlegmone, in febribus acutis, & ardentibus calore vrente & exiccâre, fiat eiusmodi angustia, periculosum affectum ostendit. Deprauatè etiam læditur vox, cùm tremula fit. Quòd si in morbis acutis contingat, resiccata aspera arteria, propter viciniam cerebri vehementer resiccati, & æstuantis, summam virium imbecillitatem significat, vel inchoatam quandam conuulsionem præmonstrat. Vox autem tremula in morbis acutis copiosam humiditatem causam habet aliquando. Quæ si superficiem instrumentorum tantum madefaciat, vocem raucam duntaxat facit. Si verò altius in musculos vocales sese insinuet, eorumque motum impediat, instrumentis præ multitudine titubantibus, vocem tremulam efficit. Ita enim balbutiunt ebrij. Ac tandem crescente supra modum effectione, vox in totum destruitur, musculis scilicet paralyti quadam affectis.

De progn. ab stridore dentium.

C A P. X.

HAbent dentes consensum cum omnibus præcipuis partibus corporis, cum cerebro nempe, per neruos à tertia coniugatione, cum

corde & hepate, per arterias & venas quæ inferuntur parti penitiori ipsorum dentium. Et ob id præfagia ab eorundem affectibus sumuntur, præsertim ab stridore. Strident ergo dentes musculis temporum aut maxillarum, vel conuulsoriè motis, vel propter imbecillitatem trementibus, idque sine febre, aut cum ea. Sine febre quidem, ut in apoplexia, conuulsione, capitis vulneribus, ab oppressione: sic propter debilitatem natuam muscoli mouentis maxillam, sine febre strident dentes, ut in pueris dormientibus euenit, quibus nerui sunt imbecilliores, tum etiam muscoli breuiiores. Cum febre verò strident dentes, non à peculiari vitio dictorum musculorum, sed malè affecta neruorum origine, siue ab oppressione & copia, siue ab inanitione & siccitate conuellantur. Quare, quoad prog. si dentes à natura & peculiari vitio instrumentorū strideant, nihil aliud mali denuntiant: quia lenissima de causa homo ita constitutus afficitur, ut à solo vapore incluso, sicut in principis accessionum, aut à putri euaporatione è vermibus, aut à facultatis animalis contractione ad interiora inter dormiendum. Per febres autem prædictos musculos malè affecta sua origine conuelli, perniciosum signum est, quia affectus est exhausti humidi primigenij, & immoderate siccitatis cerebri, aut oppressionis. Exiccati enim nerui contrahuntur ad suam originem,
& im-

& imbecilla facultas motrix mouere , vt ante,
non potest.

De prog. ab strepitu.

C A P. XI.

AVdiuntur strepitus dormientibus dum
stertunt & in sanis & in ægris. In vtrisque
fit ab exeunte flatu in arteria, vt vox in guttore
quando hoc otiant per partes & angustatur &
distenditur, aut humore repletur arteria, aut
pulmonum bronchia obsidentur. Ex quibus so-
lis in ægris nihil certò potest prælagiri de mor-
bi exitu. Exauditur strepitus aliquando in ægris
bibentibus & sanis; in vtrisque quidem sine pe-
riculo, cui potui occursans spiritus in causa est.
In ægris autem & acutè febrientibus, quibus il-
lud contingit à vehemènti siccitate (vbi enim
per angustum & siccum canalem liquor moue-
tur, sonitum & strepitum facit) letale signum
putatur Hippocrati, & vulgo. Auditur strepi-
tus in pectore pleuriticorum, & purulentorum
cum stertore quodam; qui, quia materiæ feruo-
rem & agitationem, ac eiusdem & contuma-
ciam, aut copiam, quæ ad laryngem redundat,
vel bronchiorum obstructionem, vel facultatis
imbecillitatem arguit, in malis habetur, & ple-
rûque lethalis est, maximè si adsit facies tristes,

cum oculis eruginosis & turbulentis per apho.
In coacis quibus pleuriticis strepitus in pectore multus,
& facies tristis, oculus eruginosus, & turbulentus, moriuntur. Percipitur quoque strepitus in aluo,
 cum flatuosus spiritus per anfractus intestino-
 rum circumuoluitur, nec alterutra parte erum-
 pit, modò tenuis & sonorus, per angusta & te-
 nuia intestina, modò, cum quodam murmure,
 per crassa & ampliora, unde interdum inflatio &
 distentio exoritur. Illic, si flatuosus ille spiritus,
 tormina cum dolore, & sine sonitu adferat, in
 hydropem siccum terminatur, maximè si dolor
 nullis remediis cesserit: inde enim significatur
 intestinorum intemperies hæctica, & inflam-
 matio aliqua interna, hîc verò alui deiectionis
 futuræ est signum per aph. *Quibus ructus, flatus,*
strepitus ventris exuberat venter atque perturbatur.

*De progn. qualitatum mutatarum odoratu
 perceptarum.*

C A P. XII.

Velit nolite medicus, tetros odores ple-
 runque præsentire cogitur, qui in transpi-
 ratione & respiratione ab ipso ægro & adstanti-
 bus deprehenduntur, siue ex toto corpore, siue
 ex naribus, auribus, ore, siue axillis tantùm spi-
 ritus ille olidus exhalet. Est enim fœtor putredi-
 nis

nis soboles, cuius ratio ex supra scriptis ad duos in vniuersum modos referri potest. Vel enim ex omni genere superfluitatum , ex toto corpore redundantium, quæ derelictæ ab opere facultatis coëctricis, in putridum odorem & molestum, transpiratu perceptum, vertuntur: vel à propriis & particularibus membris corruptis , putrefactis, aut vlceratis prodiens, tetrus ille olidus spiritus, ægro etiam ipsi insensibilissimus est. Et quoad prognosim , quemadmodum odoris absentiam in purè & excrementis vituperamus cum Hipp. ita fœtorem intolerabilem in morbis acutis ex toto corpore expirantem, suspectum iudicamus: & cum aliis signis coniunctum, lethalem. Significat enim tantus fœtor , non solùm ingentem putredinem: sed etiam febrilis caloris malignitatem, potius quàm magnitudinem. Quantum ad qualitates mutatas, quæ gustu percipiuntur, quia non decet medicum excrementa gustare, quæ de læsionibus gustus dici possunt in hoc instituto, quærenda sunt capite vndecimo libri primi huius operis.

*De progn. qualitatum mutatarum quæ tactu
percipiuntur.*

C A P. XIII.

TAëtiles qualitates molestiam adferentes, aliæ sunt quæ ab ægro tantum percipiuntur,

tur, ut dolores, stupores. Aliæ sunt, quæ medicus etiam manu admota discernit, cuiusmodi sunt caliditates, asperitates, lenitates, dūrities, molli-
ties, &c. De quibus omnibus satis abundè scrip-
psimus primo libro, cap. de læsionibus sensus ta-
ctus, ex quo quæ ad hunc locum spectant pe-
tenda sunt, ad quæ pertinere quodammodo vi-
dentur & hoc loco inferenda veniunt, quæ de
habitu ægri sensibus ipsis indicat medicus, &
maximè in morbis acutis. Rationabile quippe
est in febribus corpora non multum extenuari,
nec etiam in eadem habitudine persistere, qua
ante morbum erant prædita. Illud enim nisi ab
aliqua causa externa contingat, vigiliis scilicet,
inedia, insigni aliqua euacuatione, à magnitudi-
ne morbi accidisse intempestiuè, dicendum est.
Non est enim tam suspecta extenuatio quæ se-
quitur febris magnitudinem (rationabilis enim
est) quàm ea quæ à debili & exigua febre. Tunc
enim caloris nativi langorem, non potentis præ-
debilitate coctionis, ne minimum quidem eius
quod consumptum est, restaurare, accusandum
est. Non est etiam mirum si corpus non mul-
tum collabatur in exigua febre. Si verò magna
est febris, nec eam ob rem corpus attenuetur,
aut immutetur, inquit Gal. comment. in aph.
28. lib. 2. Tunc non parvam humorum abun-
dantiam crudorum in corpore redundare, si-
gnum est, quæ si vires permiserint, morbi longi-
tudinem

tudinem portendit. Notandum hoc loco est
celeriùs, vel tardiùs fieri; faciliùs vel difficiliùs
ratione temporis & ætatis, hanc extenua-
tionem. Celeriùs quippe extenuan-
tur infantes & senes, quàm
mediæ ætatis homines;
æstare, quàm
hyeme.

*

*Finis libri quinti ad gloriam Dei
Opt. Max.*





PROGNOSEOS

MEDICÆ, DE AFFEC-
TIBVS AD CHIRVR-
giam pertinen-
tibus,

LIBER SEXTUS.

De abscessibus in genere.

CAPVT I.



RAEDICENDI facultas,
non solum ad morbos in-
ternos tam acutos, quàm
longos; verum etiam ad
externos omnes extenditur.
Et maximè ad eos, qui ex
collectione humorum gi-
gnuntur, & ad reliquos etiam, quorum excre-
menta conspici possunt. Illius generis sunt, apo-
sthemata & abscessus omnes: huius, vlcera &
vulnera. Quibus addenda putamus, quæ ad
membrorum compositionem pertinent, qualia
sunt quæ de fracturis & luxationibus haberi
possunt

possunt prognostica, de quibus sigillatim agere in animo est, ab abscessibus exordiando. Nominine igitur abscessus in medicina nihil aliud significatur, quàm translatio, siue motus humoris, siue separatio ab vna parte in aliam. Et quia huiusmodi humoris transmigratio solet tripliciter fieri, per materiæ nēpe decubitus & prolapsum ab vna parte in aliam, vel per secretionem & egressionem eiusdem extra corpus, vel per transitum alterius morbi in alterum. Hinc tria abscessuum genera notantur à medicis: in primo quorum, & in postremo, materia morbifica in corpore retinetur, ea tamen differentia, ut in illo cumuletur materia in loco particulari & sensibus perspicuo, in hoc verò minimè. In eo enim abscessus genere, aliquando materia naturam tantum mutat, aliquando etiam locum, licet imperceptibiliter.

Abscessus autem apud chirurgicos dicitur de omni humoris productione & expulsionem manifesta & particulari, à partibus internis ad exteriores. Quo nomine non solum tumores præter naturam: sed etiam pustulæ & exituræ pruriginosæ comprehenduntur. Ea tamen differentia, ut tumores ab humoribus sola quantitate peccantibus generari putentur. Pustulæ verò & exituræ ab humoribus non naturalibus, & qualitate potius quàm quantitate peccantibus,

Absces-

Abscessuum duplex consideratio hoc loco anno tанда, vel quatenus scilicet sunt soboles febrium vel quatenus febres ab his habent originem. De utrisque nobis agendum est, à parotidibus auspicando.

De progn. parotidum.

C A P. II.

PArotides de abscessibus sunt qui febribus solent superuenire, in quibus humorem noxium in aurium glandulis natura reponit: facile enim partes illæ, ob laxitatem venarum, & articularum, illac ad cerebrum ascendentium amplitudinem, fluxionem excipiunt, modò à capite, modò à reliquo corpore. Non sunt tamen parotides omnium febrium soboles: Non enim fiunt in causone legitima, ab inflammatione nobilis alicuius visceris: vel à putredine humoris biliosi, in venis maioribus iecoris, pulmonis, orificij ventriculi. Tales enim febres iudicantur potius hæmorrhagia, aut sudore, aut vomitu, aut deiectione biliosa. Quòd si in prædictis & acutis morbis interdum parotides appareant, symptomaticè magis, quàm criticè fieri putandum est. Non fiunt etiam in diuturnis febribus à materiæ contumacia, tum propter frigoris & crassitiam humoris, tum propter virium longo temporis

temporis spacio imbecillitatem. Finiuntur potius tales febres abscessu in crura, & partes inferiores, modò ne vrina crassa & multa, cum multa hypostasi subducatur materia abscessus. Sunt igitur febres quibus superuenire solent parotides mediæ, & ita longæ, vt secundam periodum vniuersalem, quæ in quadagesimum diem incidit, superent, dicunturque tales morbi acuti per decidentiam. Ex quibus colligimus tria esse necessariò concurrentia vt parotides fiant. Primum, materia crassior & copiosior, quàm sit in verè acutis. Secundò calor paulò vehementior, quò materia attenuetur, penetret & sursum efferatur. Tertiò naturæ robur, quo deficiente, symptomatica translatio conuulsionem aut aliquid simile accersit. Varios siquidem affectus parit humorum ad caput transmigratio, pro varia eorundem qualitate: calidi siquidem & tenues, ait Gal. comment. in sent. 37. 3. prorrh. dissipantias, & sanguinis eruptiones, procreant: Crassi verò & frigidi, comata & parotidas. Prognosis igitur parotidum ex arte colligi poterit, præmissa consideratione in quantum distant à bonis & salutaribus abscessibus. Habent enim boni abscessus, tres potissimum conditiones. Vna est, vt maximè deorsum fiant: altera, vt quàm longissimè à morbi foco absint: tertia, vt appareant cum signis coctionis. Ex quibus conditionibus, cum duæ priores absint à parotidi-

bus, non est mirum si raro salutare esse soleant. At tamen quæ sunt laxæ, molles, sine dolore, sine rubore, sine inflammatione, quæ vel facile discutuntur, aut commodè & expeditè ad suppurationem ducuntur, innoxie & salutare esse consueverunt. Soluuntur itaque parotides aut quia discutuntur, ut quæ molles, laxæ ex caliginosa & flatuosa substantia sunt: aut quia per alios ductus expurgantur, ut per hæmorrhagiam, per aluum & urinas. Quæ solutiones laudabiles æstimantur, si inde sequatur remissio, tam febris, quàm symptomatum. Præcesserintque signa coctionis, aut finiuntur recursum humoris ad interiora. Quo refluxu, modò esse mortem in propinquo pronuntiandum, modò recidivam, ex Hipp. sect. 4. 6. epid. illud quidem, si augeantur symptomata, ut coma, delirium, dolor capitis & febris, hoc verò, si neque augeantur, neque minuantur prædicta. Terminantur denique parotides, quia suppurant. Cui suppurationi fidendum quidem erit, si febris materia etiam in venis victa fuerit: non fidendum, si contrarium sequatur. Potest enim fieri coctio in aliqua parte, toto morbo crudo existente. Ad prog. quoque pertinet scire, parotidas quatuor nominibus esse periculosas. Primò, ratione loci. Secundò, si diebus criticis non appareant, & cum signis coctionis. Tertiò, si fiant à materia lenta & crassa, ita ut non possit superari, aut

ri, aut si cum phlegmone & dolore (vnde vires deiiciantur) coniunctæ sint. Quartò, si infirmis viribus superueniant : tunc enim neque parua, neque magna aliquid prodesse possunt ; illæ, quia nihil conferunt, cùm habeant materiam copiosam, & nullum paucum criticum; hæ, quia vires debiles suffocant : abscessus enim facti in multa copia crudorum humorum, siue parui, siue magni fuerint, sunt semper lethales.

De prog. abscessuum pectoris.

C A P. III.

SVperueniunt abscessus in pectore ab affectis pulmonibus , vt ab inflammatione eorundem , à plenitudine , à fluxione pituitosa & falsuginosa , à raucedine. Nam aliquando à tumente pulmone & corrupto , qui costis agglutinator est; interdum à multa sanie partibus internis conclusa, nonnumquam à noua fluxione in musculos externos decumbente , quòd pulmo propter plenitudinem, angustiam, & obstructionē , nihil admittat ampliùs, attollitur pectus & abscessu corripitur. Qui abscessus , quia vi adaucti morbi succedunt , & eius victoriam significant , in malis habentur per aph. in coac. *Cum raucedine sputa viscida, falsuginosa, malum. Quòd si aliquid exurgat ad pectus, in his malum.* Pessimis au-

tem sunt si ad interiora subsideant. Et quæmadmodum abscessus illi omnium optimi censentur, qui (vt antea diximus) maximè deorsum & longissimè à morbi foco discedunt, ita perniciosissimi sunt contrarij. Quod si abscessibus apertis, sanguis cum purè è thorace prodeat, morbus non est ita periculosus, nec tam curatu difficilis quàm vlcus pulmonum, tum quia thoracis motus minor est multò quàm pulmonis, imò nullus, in respiratione naturali. Secundò, quia extra ad pectus prompta est auxiliorum admotio. Tertiò quia non modo recens in eo vulnus agglutinari potest, teste Galeno, sed & diuturnum veram potest admittere cicatricem.

De progn. tumorum ventris.

C A P. IIII.

TVmores in multis ventris partibus solent fieri, qui variis notis depræhenduntur, siue in alterutro hypochondrio, siue in omento, siue in mesenterio & pancreate, siue denique in musculis abdominis generentur. Manifestiores tamen sunt & tactui ipsi occurrunt potissimùm, qui in supradictis musculis fiunt tumores. Dolent enim siue premantur manu, siue non. Est enim pars sensu prædita. Cùm vt plurimum inter narum

ternarum partium tumores indolentes sunt. Et quoad prognosim, hoc de omnibus tam internis quam externis tumoribus vëtris, dici solet, ut qui duri sunt & dolentes, vel molles sine dolore, sunt ad suppurationem apti: molles enim & dolentes nulli esse solent. Sic tumores qui sub umbilico fiunt, & qui in imo ventre, tardius & difficilius suppurantur, qui verò in hypochondriis celerius, per aph. in coacis animaduersionibus. *Eadem est ratio in tumoribus qui circa ventrem excitantur, atque prescripta in hypochondriis. Sed hæc, quam illa minùs suppurant, minimùm verò que sub umbilico.* Ratio in promptu est: quia quò tumores longiùs ad infernas partes recedunt, eò ferriùs & minùs suppurant. In hypochondriis autem caloris vis maior inest; propter vicinas partes contentas: idèò eorum tumores celerius in pus conuertuntur, sub umbilico tardius.

De progn. abscessuum inguinum & adenum.

C A P. V.

ABscessus qui fiunt in adenibus & gládulis (fiunt enim in eis facîle inflammationes & tumores, cùm sint partes molles & nullius actionis, solùmque ad diuisionem vasorum dicatæ) nomine bubonis intelliguntur, qui causam manifestam internam vel externam habet.

Interna est defluxio in articulos aut pedes, menses suppressi, &c. Externa verò contusio illarum partium, vlcus articularū, aut tumor. Sunt autem bubones eiusmodi aliquando absque febre, aliàs cum febricula vel diaria. Plerumque putrida, prout corpus impurum fuerit. Prognosis horum abscessuum tota posita est in cognitione causarum ex quibus fiunt, cum nihil plus adferant periculi, quàm affectio ipsa, quæ illorum est causa. Superueniunt ergo abscessus eiusmodi morbis criticè aut symptomaticè. Illi fiunt motu naturæ, aut magnitudine morbi, aut celeritate, aut irritamento alio cōcitatur, cum quodam ordine, aut signis alicuius, vel obscuræ, vel manifestæ coctionis. Si quidem manifestæ, finiuntur febres putridæ crisi perfecta. Si verò obscuræ, crisis imperfecta erit, longitudinemque morbi significat. Duabus de causis. Vel quia relinqui materiam intus ostendit. Quæ si maligna est, & malignis signis significata, de morte est suspicandum. Si vero copia tantum vrget, cæteraque salutaria appareant, solius diuturnitatis est periculum. Vel quia pars quæ excipit, propter imbecillitatem, crudam materiam vincere non potest, nec totam excipere: vnde fit materiæ intro recursus, aut ibi corrumpitur. Bubones verò symptomatici apparent sine ordine dierum criticorum, sine signis coctionis, potius à diffusionē putredinis, quàm à naturæ motu.

motu. Sequuntur enim interdum inflammatio-
nem alicuius visceris. Interdum venenatæ qua-
litatis sunt germina, vt in peste, aut corrupti
nobilis alicuius visceris. Celerrimeque sine cer-
tamine naturæ hominem rapiunt. Virtus enim
valde deiecta, vt in peste, non excitatur ad pu-
gnam contra materiam venenatam. De bubo-
nibus qui non habent causam ita occultam, &
reconditam, extat aph. § 5. lib. 4. *Ex bubone omnes
febres male præter ephemeræ.*

De progn. pustularum & phlictenum.

C A P. V I.

Varij sunt abscessus, prauorum humorum
& propria substantia corruptorum, sobo-
les. Qui generali significatione exanthemata
dicuntur, in doctrina Hippocratis. Suntque læ-
nes humorum eruptiones cum tumore. Quas
peculiari appellatione, pustulas & phlictenas, ab
ebullitione intelligimus. Sicut per exanthemata
maculas minimè exuberantes, & in summa cu-
te efflorescentes. Pustulæ igitur ab humoribus
qualitate peccantibus factæ, variæ sunt, earum-
que natura diuersa, propter diuersam humo-
rum malignitatem: modò enim exulcerantur,
modò partes vicinas exedunt, &c. Quarum ge-
neratio hæc est. Corrupta sanies feruore cordis

ebulliens, exhalat à centro ad cutem. Et in partibus solidis humor alens, vel vitio partis, vel humoris ipsius, aduritur, acrimoniamque & salfedinem, vistarum partium mistione, acquirit. Qui humor ad cutem protrusus, si tenuis fuerit, sola cuticula attollitur, vnde sudamina vulgò dicta fiunt. Sim crassior, tumet cutis & exulceratur: fiuntque pustulæ, quæ pituita salsa albicant. A bile magis rubent, cum flauitie quadam. A sanguine & iecore affecto, saturatum ruborem edunt. Ab atrabile, nigrescunt, & perniciem portendunt. Quarum prog. varia colligitur, pro vt variis affectibus sequuntur & apparent. Apparent namque in febris criticè. In quibus reliquæ sanguinis, qui in febre putruit, tanquam cinis aliquis, à natura sæpè propelluntur ad cutem, totius corporis emunctorium. Si scilicet, inde sequatur alleuatio, & symptomatum remissio. Atque excrementa alui & vrinæ pura nec nimium biliosa videantur. Apparent symptomaticè, veri adaucti morbi in febris, si permanserit febris post eruptionem, si eruda & praua excrementa fuerint, & si permaneant, ac multo deterius, si vbi produci ceperint, statim desinant. Quod duorum alterum significat. Nempè aut quia partes affectæ, vnde materia illa effunditur, ob copiam, eandem non possunt tollerare. Vel naturam ad summum ferè infirmitatis gradum peruenisse: quæ superflua quidem

dem excernere conatur, sed nequit. Apparent quoque pustulæ symptomaticæ, & malis ægri rebus, in vehementi intemperie, & corruptella alicuius visceris, vt in tabidis & pulmonibus malè affectis, ex coaceruatione saniei erodentis in corpore, & sanguine ichoroso corrupto. In quibus est causa maioris atrophix, vigiliarum, & febris. Et maximè si alius supprimatur, & vrina acrior euadat. Vnde acris humoris perennis generatio colligitur, & eius copia. Sic in vulneribus capitis sanie in cerebrum effusa, & maximè in moribundis, pustulæ in lingua superueniunt: propter connexionem ipsius, & vicinitatem cum partibus superioribus. Pariter in eadem parte pustulæ succedunt pleuritidi, ab ichore cum alio prauo humore coniuncto. Quæ vel morbum difficilem testantur, vel lethalem. Et potissimum si color liuidus coniungatur, qualis in ambustis, vnde declaratur humoris exustio, & bilis atræ permixtio; cum caloris natui extinctione in parte liuente. Superueniunt denique pustulæ in febre pestilentiali. Quæ quia consistit in sanguine atro, aut vitali in corde propria substantia putrescente & ebulliente, cum venenata quadam & contagiosa qualitate, pustulis, aut carbunculis; aut bubonibus externis, aut phlictenis, stigmatibus, vlceribus, pestilentem atque putrilaginosum calorem habentibus, se manifestat, funesto iudicio. Præsertim

si primis diebus oboriantur: moriuntur enim ægri veneni malignitate, & humoris corruptione.

De progn. vlcenum.

C A P. VII.

VLceris consideratio, siue ante morbi principium oriatur, siue post, in prædicendo de morbi exitu plurimum posse colligitur ex sententia 25. primi prog. vbi inquit Hippocrat. *Vlcus verò si quis eo ante morbum obsessus fuerit, siue in morbo natum sit, cuiusmodi sit scilicet tenere oportet. Nam si interiturus sit æger, &c.* In quacunque igitur parte fiant vlcera (quantum attinet ad hoc institutum) consideramus, tam ea quæ præcedunt, quàm ea quæ morbis superuenire, siue bona siue mala fuerint consueuerunt: quibus diligenter perspectis, de morbi vniuersalis fine pronuntiamus. Quemadmodum enim morbus, in cuius vlceribus humiditas laudabilis, & puris optima confectio apparet, securitatis est plenus. Ita ille funestus indicatur, cuius vlcera vel prauis coloribus vestiuntur, vel sicca, vel circumglubra euadunt. Est enim puris confectio, quædam in solidis partibus benè constitutis, in materia benigna facta concoctio. Ergo quocunque morbi tempore vlcera vel sponte, vel relo fiant: in quocun

quocunque loco (magis tamen in extremis) inclinante morbo ad exitium, puris inopia arefcunt, alimenti defectu & ficcitate contrahuntur, calore nativo extincto liuefcunt, pro humorum affluentium varietate prauè colorantur, atque circum labra fiunt. Estque hoc signum tam certum Hippocrati, vt existimet non modo talia facta vlcera, vi febris hominem moriturum denuntient. Imò etiam si moriturus fit æger, talia necessario euadere. Quòd tamen de ficcitate non est simpliciter pronuntiandum. Cùm vlceris curatio ex Hippocrate lib. de vlceribus, fit eiusdem mediocris exiccatio. Ea enim tantum ficcitas dānanda est, quæ propriæ substantiæ defectu, vel excrementorum paucitate contingit. Quæ verò sordium, & saniei determinatione, laudanda.

Superueniūt autem vlcera quibusdam morbis aliis à febre: vt aqua inter cutem laborantibus, in quibus non facilè sanantur per aphor. 8. lib. 6. *Aqua inter cutem laborantibus exorta in corpore vlcera, non facilè sanantur.* Notat Auicennas hydropicis duo vlcerū genera superuenire. Quorum alia in ore & gingiuis apparent, à tetrīs vaporibus sursum elatis. Quæ mortem in propinquo eo authore significant. De quibus tamen non loquitur prædictus aphorismus. Alia in habitu corporis. Quæ quia in hydropicis nimia est humiditas instrumentalis, & summa ficcitas simularis,

milaris, quæ duo vnitatem retardant, iure optimo curatu difficilia iudicantur.

De progn. fistularum.

C A P. V I I I.

Quia fistula definitur vt sit vlcus altum, angustum, callosum, & aliquando obliquum, meritò inter vlcerum genera numeratur. Quæ vt plurimû succedit ab abscessibus malè curatis. Cuius prognosis pendet omninò ab eiusdè triplici differètia. Quæ sumitur vel à loco, vel à figura & spatio, vel à modo & genere puris. Ex quibus licet pronunciare, quæ fistulæ faciliùs vel difficiliùs curantur, & quæ sunt incurabiles. Quibus Celsus addit naturâ ægri. Locus igitur facit, vt fistulæ aliæ sint curabiles, vt quæ in partibus carnosiss & mollibus, aliæ curatu difficiles & plerunque iucurabiles. Vt quæcunque cartilaginosis, nervosis & excarnibus partibus nascuntur. Tum quia earûdem cûratiô perfici non potest, nisi chirurgica operatione; nempè sectionibus, igne, adurentibus & exedentibus medicamentis, ac vinculis. Quæ locis prædictis, exanguibus & nervosis, propter inflammationes, dolores, vigilias, (à quibus conuulsiones & deliria plerunque sequuntur) tutò tentari non possunt. Sic fistulæ difficile curantur in
par-

partibus, quæ continuò superflua humiditate
madent. Eandem difficultatem facit figura fi-
stulæ & spaciū eius. Quarum enim cavitās
altiùs peruenit, & longiùs excurrit pluresque si-
nus & cuniculos egit, difficiles sunt curatu, du-
plici ratione. Primò, quia manu chirurgica
egent, ut ante dictæ. Quòd propter dolores, fe-
bres, anxietates, maximè si neruus vicinus fue-
rit, aut pars præcipua, tutò exequi non potest.
Secundò quia colyria & alia medicamenta, ad
omnes partes non possunt peruenire: vel quia
interiores sinus latent, vel quia longiùs distant
ab ingressu, ut in veteratis solet contingere, in
recentibus minimè. Idem iudiciū est de fistulis,
quæ ad interiora penetrant. Tertia fistularum
curationis difficultas, vel facilitas, colligitur ex
quantitate, qualitate, & modo puris exeundi.
Nam si pus continenter & incessanter è fistula
manat. Id fit vel partis fistulatæ vitio, vel alieno.
Si vitio partis, plures esse sinus & quoquoverfus
sparsos cuniculos (vnde curationis difficultas)
significatur. Si vitio alieno, aut ichorosū & cor-
ruptum sanguinem in toto corpore, ostendit.
Aut aliquod viscus interius malè affectum; cuius
superflua per fistulam, in modum abscessus
continenter expurgantur. Cuius euacuationis
beneficio, plerisque valetudine integra perfrui,
sicut hæmorrhoidibus testatur Hipp. sect. 3. lib.
6. epid. non procul à fine, & experientia fontic-
ulorum

culorum , qui multi ad hunc finem aperiuntur, comprobatur. In neutro igitur harum fistularum genere, curatio facilè perficitur , propter perennem humorum effluxum , in posteriore tamen periculosa est , propter suppressionem ichoris , qui sine noxa in corpore non potest retineri. Et in summa omnes fistulæ sunt curatu difficiles, quarum orificia clauduntur caruncula, callo duriore, aut quæ carent orificio, vnde nec educi possunt ichores, nec medicamenta immitti , nec denique sine chirurgia crudeli possunt apperiri.

De prog. vulnerum.

C A P. IX.

Vulneris nomine in genere sumpto omnis magna offensio , ab externa causa pēdens significatur. Etiam si nullum sit vulnus nullaque continui solutio manifesta, apud Gal. comment. in sent. 12. sect. 5. lib. 6. epid. Particulari nomine eodem sumpto. Definitur à chirurgicis, ut sit recens cōtinui solutio cruenta, sine pure & putrefactione, in partibus mollioribus, extrinsecus incidens. Quibus differentiis ab ulcere distinguitur , quamvis nomine vnius alterum apud Hipp. intelligatur. Ut autem de omnium vulnerum exitu certius possit præsagiri. Quædam sunt

sunt de illis in genere prænotanda. Cuiusmodi sunt magnitudo, paruitas, malignitas, prauitas, difficultas, vel impossibilitas curationis, quibus addenda sunt vulnera quæ toto genere sunt lethalia. Magnum siquidem vulnus & graue dicitur apud Gal. cap. 6. lib. 4. methodi, sicut & cæteri omnes morbi. Præstantia scilicet partis, qualia sunt vulnera capitis, ventris, thoracis, hepatis. Affectus magnitudine, vt sunt vulnera quæ cæsis maioribus vasis, difficilem reddunt curationem. Atque cachoetia. Talia sunt vulnera partium neruosarum, quæ malefica vulnera dicuntur. Quæ lethalia quidem non sunt suapte natura: noxam tamen aliquam insignem relinquunt: cuiusmodi sunt, quæ illata sunt altius sincipiti. A quibus sæpè inflammationes & dolores oculis commouentur. Maligna & praua sunt vulnera, à quibus statim grauissima symptomata sequuntur. Dolores nempe, vigiliæ conuulsiones, & deliria, quæ vulneribus inflatis partibus neruosis, carne expertibus & ossibus, superuenire solent. Ex vulneribus igitur quæ difficulter curantur, alia sunt quæ nūquam sanantur, quorum quædam lethalia non sunt, quædam mortem necessariò inferunt. Difficulter enim sanantur neruorū vulnera, quæ tribus digitis à iunctura distant, quæque symptomata prædicta habent concomitantia. Lethalia sunt vt plurimū toti corpori, quæ visceribus inter-

nisque

nisque partibus altiùs impinguntur. Parti verò alicui, quæ fauciat venis, aut nervis, aut vtrisque, partem non solum motu & sensu priuant, sed etiam vita. Parua vulnera quæ in locis carnosiss, vbi pauci nervi, venæ & arteriæ, nec multæ, nec magnæ, & corpore euchymo contingunt, ea sunt tutissima. Vulnera parua quæ in nervis punctim fiunt, & cum exigua & orbiculatè facta diuisione, non sunt ita tuta. Difficulus enim, teste Aristotele, curantur, quia anguiculis carent, egéntque diligentia magna, & caurione vt curentur. Et in summa. Nullum est vulneris genus, ex quo homines mori non possint, imminente scilicet periculo, à venis, arteriis & nervis, à corporis cachochymia. Denique à dolore, febréque superueniente. Sicut, miraculi instar, multi visi sunt, qui ex vulneribus toto genere mortalibus, euaferunt.

De progn. vulnerum capitis.

C A P. X.

NVlla sunt vulnera quæ diligentiozem in præfagiendo requirant coniecturam, quæ ea quæ capiti impinguntur. De quibus tamen omnibus, non vno & eodem modo possumus pronuntiare. Nam quamvis de omnibus vulneribus

neribus capitis dici possit, suspectum & ancipitem eorum esse euentum. Sunt nihilominus alia aliis grauiora. Pluresque mori ex his qui priore parte capitis vulnerantur, quam ex his qui in posteriore, affirmat Hipp. in libro de vulneribus capitis. Vbi igitur caput ictu aut casu percussum est: aut sola caluaria frangitur: aut etiam membranæ, vasa, nerui, ipsius quoque cerebri substantia violatur: aut humor per cerebrum dispergitur. Vnde duo genera symptomatum solent sequi; vnum eorum quæ affectus substantiæ cerebri & circumpositarum partium consequuntur, cuiusmodi est conuulsio, paraly-sis, delirium, sopor, stupor, totius corporis infirmitas & impotentia, febris, & similia, quæ in vniuerso corpore apparent; alterum eorum est symptomatum, quæ ad facultatis & spirituum animalium, repentinam & vehementem agitationem aut dissolutionem magis pertinent, qualia sunt voce priuari, non videre, non audire, & ferè mori. A quibus symptomatis faucia-ti aliquando ad se redeunt; in quibus sola virtus animalis offenditur; ob idque se in cerebrum colligit, atque otatur, aut propter validum dolorem ex toto spiritus in cerebrum re-uocat, sine ossis fractura aut vlla neruorum, venarum, vel membranarum ipsius cerebri disruptione. Aliquando attoniti, vel soporati moriuntur, vel vbi ad se redierint, in grauissima

Y

symptomata incurrunt, pro varia plagæ natura, & partium vulneratarum ratione. Siue cutis adhuc integra, aut parum vulnerata appareat, siue os nudatum & conspicuum. Quod contingit, cum offensa per cranium ad cerebrum vsque peruenit. Ita vt ex nervis quidam valdè tendantur, alij diuellantur, aut aliquid in calvaria, cerebro, vel ipsius membranis rumpatur. Ex supradictis colligimus prognosim, vt quæcunque symptomata capite sauciatis cōtingunt, & mox à principio fiunt & apparent, ea minùs terrere debent, quàm quæ perseverāt, vel postea superueniunt. Initio enim causa doloris, loci, hæmorrhagiæ, inordinati motus spirituum & humorum, atque facultatum contractionis, multa videntur esse lethalia, quæ non sunt. In quibus supersedere iudicium oportet. Quæ verò vel permanent, vel quarto, septimo, aut deinceps accidunt (quo tempore omnia remitti oportuit) ingens aliquod malum portendunt, vt phlegmonem, putredinem, saniei collectionem, & similia. Quare vulnus in hac parte duabus de causis mortale est, nempè propter nobilitatem partis principis, & superuenientium symptomatum gravitatem. Etenim quia pars princeps, celerrimè exhauriuntur spiritus, noxaque toti corpori communicatur, per priuationem aut depravationem facultatis animalis. Symptomata autem gravissima superueniunt. Tum ex inflam-

inflammatione , tum ex interceptione cōmeatus facultatis animalis, vt conuulsio , paralyfis, &c. De quibus paulò ante. Quod etsi verum sit de omnibus magnis capitis vulneribus : nulla tamen plaga illius partis est , quæ plura & grauiora symptomata adferat, quàm quæ temporibus infertur, siue punctim, siue cæsim diuidantur muscoli temporales. Inde enim fiunt febres, deliria, conuulsiones, cataphora, vertigo , apoplexia, carus soporiferus. Causa autem omnium symptomatum ex præstantia loci illius , ex ossibus nempè, musculis, neruis, venis & arteriis carotidibus , pendet : quibus tam arctè connectuntur tempora cerebro , vt nihil mirum sit si tam celeriter affectus temporum ipsi cerebro communicetur. Accedit quod os temporale infirmissimū est , nec teste Hipp. libro de vulneribus capitis, vlla alia in parte caluaria periculosius frangitur. Prognosis quoque est, scire, non ad omnem illius partis inflammationem , sequi prædicta symptomata ; sed duntaxat ad magnas eius affectiones. Ex quibus verificatur, quod in vniuersum dicitur de vulneribus capitis, maxime de magnis, esse valdè lethalia. Quamuis Gal. & alij authores recenseant nonnullos, quorum alij cum penetratione teli vsque ad ventriculos cerebri, alij etiam cum substantiæ cerebri perditione, euaserunt. Quibus exemplis, quia rarissima sunt, & Dei potius voluntate,

quàm artis operibus eueniunt, non euertitur illa de vulneribus capitis vniuersalis sententia.

De progn. vulnerum medulla spinalis.

C. A P. XI.

Q Via spinalis medulla cum cerebro omnia ferè communia habet, substantiam nempe, nervorum principium, sentiendi vim propè parè, meningas duas, à duabus cerebri meningibus productas. Ob id vulnera in ea, non secus atque cerebri sunt lethalia. Non solùm propter partis nobilitatem, ac nerueam naturam: sed etiam propter superuenientium symptomatum magnitudinem, cerebri partiumque vicinarum sympathiam, & curandi difficultatem. Accidit quòd vehemens causa esse oportet, quæ talem continui solutionem faciat. Cùm medulla ipsa à telo diuidi vix possit, nisi sub ictu vehementi, aut vulnere collo inflicto, præsertim parti anteriori, qua vertebræ inter se quidem sunt æquales, propter arctam colligationem, soliditatem atque crassitiem, quodammodo tamen disiunctæ Vnde fit, vt dum vulneratur collum, medulla ipsa attingi queat. Idque vel punctim, vel transuersim. Vulnus itaque quòd transuersim medullam diuidit, necessariò mortem adfert. Quia statim partes omnes inferio-

res

res resoluuntur, vrinæ & fæces supprimuntur. Nec conuenienter remedia admoueri possunt. Præsertim cum os nudare, vt in vulneribus capitis, nequaquam liceat. Quod verò punctim medullam sauciat, nō semper necat, modo vulnus exiguum sit, quamuis pauci euadant. Notandum quoque est ex hoc genere vulneris, tanto celerius in periculum vocari ægrū, quanto eiusmodi vulnera sublimiore spinę parte fuerint accepta; quod supremæ vertebræ sint omnium præstantissimæ, vt videre est apud Gal. 4. de locis affectis. Notandum pariter, ex his vulneribus aliquando illæsam euadere substantiam dorsalē, fieri tamen sub plaga tubercula, phlegmonem, cōtusionem, vertebrarum luxationem de quibus ex superuenientibus symptomatis præfagiendum. Quemadmodum de omnibus neruofarum partium vulneribus. Quibus dolores, vigilæ, conuulsiones & deliria, solent superuenire. Quæ tamen absolutè lethalia non sunt Hippocrati. Sed praua, magna & cacoëthe, de quibus sequenti capite.

De progn. vulnærum neruorum.

C A P. XII.

Neruorum vulnera non recensentur à Gal. inter ea quæ necessario sunt lethalia. Sed

Y 3

ex his esse asserit, quæ cacoëthia, magna, & vulgo malefica appellantur. Quibus nisi dolor diligenter sedetur, phlegmonis generatio prohibeatur, vigiliæ, conuulsiones & deliria succedere solent. Sed cum nerui possint vel punctim, vel cæsim, cæsim autem vel per longitudinem vel per transuersum vulnerari, interdum etiam contunduntur: de omni figura plagæ, quæ illis infligitur, non possumus vno modo præfagire. Nam punctura (vt antea diximus) est omnium difficillima. Cui propter sensus vehementiam, nerui cum cerebro continuationem, phlegmones malignitatem, & saniei acris suppressionem, faciliè conuulsio superuenit. Quam præoccupat Gal. vulneris cute incisa, apertione, remediorum tenuiorum, & mediocriter calidorum admotione, qualia sunt olea rosarum, cham. sabinum, &c. Cæsiones neruorum per longitudinem factæ, quia vberiùs saniem expurgant, non tantam adferunt calamitatem. At vulnus per transuersum inflictum neruis, maiorem conuulsionis metum adfert, propter phlegmonem, quæ à sectis fibris ad non sectas cōmunicatur. Sunt igitur vulnera neruorum quidē pertinetia, periculosa & cacoëthe. De quibus nihil certo præfagire possumus præter periculum, ingentem dolorem, claudicationem, &c.

De progn.

De prog. vulnerum venarum & arteriarum.

C A P. XIII.

DE vulneribus venarum & arteriarum non possumus vno & eodem modo prædicere. Nam quæ vulnera magnis, ut caux (quæ magna per excellentiam dicitur) iugularibus, cruralibus, axillaribus & popliteis, & his quæ ad anum & testiculos perueniunt, magna vulnera infliguntur, necessariò lethalia sunt iudicanda, multis rationibus. Primò propter immoderatum sanguinis profluvium. Secundò propter nerueam naturã. Tertiò propter situm profundiorẽ, quo neque integris viribus medicamenta peruenire, nec ligatura vena constringi, sistendo sanguini necessaria aut manibus tractari queant. In arteriis quoque sunt iisdem de causis mortalia vulnera. Et tãto grauiora, quanto celerius vitæ extinctio sequitur. Effusio scilicet vitalis spiritus, cum tenui, flauo, calidoque sanguine, qui quodam quasi saltu erumpit. Augetur curationis difficultas, propter positum ipsarum, magis à natura reconditum, agitationem perpetuam, substantiam solidiorem, duriorẽ & pluribus tunicis confirmatam. Additur aneurysma, quod incisa arteria sequi solet, etiam suppresso sanguine: in minoribus autem

venis, quamvis supradictis rationibus non sint suspecta vulnera: duabus tamen, plerumque periculum adferunt, siue sectæ, siue contusæ sint venæ: vna est suppressio grumosi sanguinis intra corpus: nam vbi sanguis è venis effluxus concreuit, mox qualitatem contrahit, tanto deteriore, quanto maior mixtio maioris putredinis occasio est; induit siquidem sanguis ille naturam veneni, vnde grauissima symptomata sequuntur, & mors ex Gal. cap. 4. libr. 6. de locis affectis: altera ratio est, quia venæ minores percussæ, aut praua vincendi ratione compressæ, modò mortem partis vulneratæ, modò sphacellum inferunt.

De prog. vulnerum hepatis, splenis & renum.

C A P. XIII.

NON possumus sine distinctione de exitu vulnerum hepatis pronuntiare. Cùm ex his alia necessariò mortem, alia grauem metum, sine tamen certa desperatione adferant, spectata partium, ipsius hepatis vulneratarum varietate, vulnerum magnitudine & paruitate. Multum enim interest, an vulnus in parte summa hepatis, acceptum fuerit, an penitus penetrauerit. Hoc enim certius multo, & celerius, illud verò tardiùs necat. Quod autem Hippocrat. in coacis animaduersionibus, enumerat vulnera hepatis

hepatis inter ea quæ necessariò interimunt. Intelligendum est, non eodem genere mortis, nec semper interire ægros. Nam exiguum vulnus in fibris, sine corruptione substantiæ hepatis, sanari potest: accedente autem corruptione, & ulcere perpetuò distillante, corpus paulatim marcescit, decoloratur, & tandem necatur: ex Gal. 5. de locis, siquidem per abscessus & ulcera hepatis omnes feruari vult Hippoc. quibus iecoris ipsius illæsa substantia, pus intra tunicam tantum contineatur. Interire autem quibus in carnem usque corruptio penetrat, ita vulnerata quo modo libet iecoris substantia, affectus merito lethalis censetur: præsertim cum inde viscus inflammari, & abscessu facto ulcerari, necesse sit. Huius generis sunt lienis ulcera & renum, utriusque enim partis sunt ut plurimum lethalia. Lienis quidem, quia munus habet toti corpori apprimè utile, & necessarium. Est namque veluti alterum hepar. Renum verò, quia præter usum quem habent vitæ conseruandæ necessarium, multa vasa continent, perpetuumque excrementorum illapsum sustinent. Renes, inquit Celsus cap. 10. libr. 4. ubi affecti sunt partim propter multitudinem humoris excepti, partim propter continuos excrementorum effluxus, partim quia sunt in profundo siti remedia minus excipiunt, summa cum difficultate curantur.

De prog. vulnerum diaphragmatis.

C A P. X V.

Spectata septi transversæ naturæ, & compositione, facili est de eiusdem vulneribus præfagium colligere. Vt ea scilicet sint magis mortifera æstimanda, quæ ad centrum & medullium diaphragmatis propinè accedunt, quæ remotius minus. Illa enim insanabilia prorsus esse, & natura & actio partis demonstrat. Est enim substantia nervea, quæ coalescere non potest, & perpetuo motu agitur, qui motus est altera causa impediens cōglutinationem. Quam substantiam nerveam, quamvis circulus carneus huius partis non habeat, in ea tamen vulnus nihilominus, difficillimæ est curationis: tum propter inflammationem, quæ statim oboritur: tum quia sanies ex vulnere, non facili exit. Non enim foras se profert orificium, facitque saniei illa retentio diuersa symptomata, pro ut in varias partes solet reponi. Si enim intra vulneris labra retineantur, coalitus impedit. Si in pulmones feratur, asthma, peripneumoniam parit. Si in peritonæi partes diffuset, dolores & alia nocumenta facit in omnibus partibus, ad quas sanies est peruentura. Et tandem inflammatio, quæ facili huic vulnere superuenit, non solum respi-

respirandi munus deprauat, sed etiam cor, iecur, & ventriculi os, propter viciniam, cerebrum verò, propter insignium neruorum communionem & continuam halituum euaporationem, in consortium mali promptissimè adducit. Distinguit Hipp. hæc vulnera in profunda & superficialia, plus, minus, quorum hæc curari aliquando posse, illa omninò lethalia dicit.

De prog. vulnerum cordis.

C A P. XVI.

Vulnera cæterorum viscerum omniū, cum additione lethalia esse dicebantur. Cordis verò absolutè & necessariò talia dicuntur. Nunquam enim quisquam visus est euasisse, corde sauciato. Nam vulnus quod profundum est, repentinè necat, exiguum non multo post. Idque & necessariò & semper, venis & arteriis languescantibus, pallente vultu, & sudore frigido, ac foetido, nec non extremis frigidis. Nec obstat quod nonnulli affirmant, se callos & vlcera inuenisse in corde. Nam quæ spontè naturæ generantur: naturam aliquando posse tolerare certum est. Quæ verò subito infliguntur, minus. Ad illud autem quod refert Gal. 2. de placitis. De animalibus in sacrificiis, quæ extracto corde respirabant, clamabant, & currebant, donec

nec totus sanguis effluxisset. Dicit interpret, non esse idem iudicium ferendum de corde humano, ac de brutorum animalium. Est enim caro cordis humani multo mollior, sanguis copiosior & calidior, ac vasa crassiora. Teste Arist. lib. 1. cap. 17. de historia animalium. Huius autem visceris vulnus non posse aglutinari, facit non solum continuus ipsius motus: sed etiam eiusdem carnis durities, sanguinis profluvium, spirituum subita resolutio, meatuum & ventriculorum cordis à sanguinis collectione, obstructio, atque necessario superueniens inflammatio.

De progn. vulneris vesicae.

C A P. XVII.

DE vesicæ vulnere hac distinctione est prælagiendum. Aliud nimirum esse, vesicæ vulnus non coalescere, ut voluit Hipp. aliud hominem mori vesica vulnerata, ut habetur aph. 18. lib. 7. Nam quamvis vesica neque coalescat, neque ferruminetur. Diù tamen homo superstes esse potest, & vitæ munia obire, vulnere exiguo in vesica accepto: & maximè in collo ipsius, quod valdè carnosum est, ut videre est, in his quibus manu chirurgica, calculus extrahitur. Attamen vesica in aluco & nervosa
parte,

parte, eaque media, aut circa fundum grauitèr vulnerata, doloris acerbitate, & superuenientis inflammationis vi, interficit. Tunc enim hæc tria concurrunt, febris continua perseverans, nulla mali per vrinas allèuatio, & continuata in perinæo durities, vt est in aph. 2. 3. & 4. tertij prognosticon.

De progn. vulneris epiploi.

C A P. XVIII.

DVo omenti vsus insignes percunt eo ipso vulnerato, fomentatio nempe ventriculi basis, à qua incipit omentum, & intestinorum, quibus tanquam tegumentum obtenditur. Atque venarum quæ in lienem à ramis portæ in ventriculum, duodenum, & colum deducuntur, sustentaculum. Excidit namque ex suo loco aliquando in scrotum, aliquando foras procidit per plagâ abdominis diuiso peritonæo. Quod cum accidit, statim reponi debet, prius quàm putrescat, & liuescat, aut cùm liuescit excidendum, per aph. 58. lib. 6. Galeno interprete. Causa autem tam expeditæ corruptionis est, partis humiditas, & caloris natiui extinctio, à frigore ambiente. Est enim omnibus partibus interioribus, non solum mollibus, sed etiam duris commune, vt aëris occursu alienentur. Eoque celerius,

rius, quo sunt humidiores, vt est hæc pars, & intestina. Quæ si diutius in ambientem exponantur, liuescunt, nigricant, sensu priuantur. Quod malum teste Celso est immedicabile.

De progn. vulnerum intestinorum & ventriculi.

C A P. XIX.

Vulnera intestinorum, nec necessariò, nec in omnibus, nec omnia esse lethalia, experientia constat. Ex tenuibus siquidem vulnus penetrans in ieiuno, insanabile est; teste Gal. cap. 4. lib. 6. metho. multis rationibus. Vasorum nempè magnitudine & multitudine, tunicæ tenuitate, & neruosa natura, iccoris vicinia, atque bilis synceræ exceptione. Additur curationis difficultas. In hac parte tamè visum est aliquando vulnus superficiale curatū. Reliquorū intestinorum crassorum vulneratio leuior, facilè aglutinatur: quia plurimū carnosæ substantiæ habent, nec ad mortem perducit nisi phlegmone & ileus superuenerint. Vulnera autem magna & per transversum facta, ob eādem causam lethalia iudicantur per aph. *Moriuntur quibus intestina vulnerantur, siue ea tenuia sint siue crassa: siquidem transversa magnæque plaga sit. Supersunt autem nonnulli cum paruum vulnus idque rectum fuerit.* Labra enim talium vulnerum non solum per se mul-

multum diffident, sed etiam vitiosarum humidatum transitu disiunguntur, nec medicamenta conuenienter admittunt. Non dissimile iudicium est de vulneribus ventriculi. Nam quæ tantum eius exteriorem tunicam lædunt, facile sanescunt, quæ verò ad summum vsque interiorem penetrant, difficile curantur. Quæ etiam circa fundum, quia carnosum, minus habent periculi. At in ore eius neruoso, insigne vulnus desperatum est: propter partis præstantiam, eius sympathiam cum corde & cerebro, naturam exanguem, & medicamentorum difficile applicationem.

De progn. gangrena & sphaceli.

C A P. XX.

QVandoquidem gangrena interdum magnis & malignis inflammationibus, quæ plerumque sequuntur ad vulnera sclopetorum, & aliorum instrumentorum, solet succedere. De ea erat hoc loco agendum sicut de sphacello, quorum vna est & eadem causa, solum maioris minorisque ratione differens. Sicut enim gangrena est incipiens partis corruptela: sic eadem corruptela cum completa est, sphacelus propriè appellatur. Hæc tamen duo germana significatione dicuntur de duabus partibus, ut propriè

propriè gangrena sit hoc in carne, quod sphacelus in osse. Quamuis apud Gal. comment. in aph. 50. lib. 7. Sphacelus etiam carnosarum partium mors dicatur, vt de syderatione videre est eodem aphorismo. Est igitur sphacelus, siue syderatio membri mortificatio, quæ est gangrenæ non curatæ terminus. Causæ omnes huius affectus ad duo genera reducuntur. Quorum vnum est facultatis spiritus vitalis interceptio. Alterum est insiti caloris interitus. Prohibetur facultatis influxus ad partem, viarum obstructione, quæ fit multis modis, vel materiæ copia, vel constrictione, ob tumorem, ob vinculum, ob luxationem, ob fracturam, vel ob vasorum sectionem. Interit verò & perit natiuus calor partis, quatuor modis. Primò calore alieno discipante vt in inflammatione, combustione, acerbis & causticis pharmacis. Secundò frigore extinguente, ob eius occursum & narcoticorum vsum. Tertiò transpirationis defectu, ob cutis densitatem, copiam humorum, meatuum constipationem, &c. vnde calor suffocatur. Quartò veneno & malignis defluxionibus, pustulis, ulceribus. Hinc euanescit floridus partis color, tenditque ad liuorem, sensus hebescit, membrum ipsum frigescit, flacescit, nec post tactum recurrit. Et quoad prognosim, gangrena cum incipit, superstita adhuc aliquo partis vigore, curationem admittit, maximè in iuuenibus, auctore

thore celfo cap. 26. lib. 5. Quæ curatio in communibus & topicis posita est remediis. At ubi pars in sphacelum peruenit. (Quod dignoscitur, cum pars vita priuata, non tantum fœtet & nigrescit, sed etiam sensu prorsus destituitur.) Nisi quamprimùm pars ad viuum excidatur, cerpit malum in vicinas partes, & hominem iungulat, teste Paulo cap. 19. lib. 4.

De progn. fracturarum omnium, & ossis capitis.

C A P. XXI.

TRiplex vitium ossibus contingere solet, in quibus ars prædicendi etiam potest exerceri, fractura nempe, luxatio & caries. In fracturis quidem prognosis optimè instituitur, cognitis earundem differentiis, simplicitate, & compositione, earumque natura. Comparatur autem fracti ossis dignorio & fracturæ differentia, vel ratione, ut cum vis causæ agentis, & læsa membri actio expenditur, vel sensu, cum fragmenta videtur recedere cum punctione & dolore. Cum inæqualitas & asperitas percipiuntur, strepitus ex collisione ossium exauditur. Verum si os tantum sit fissum, nihil pūgit, nihilque resinum apparet, fractum tamen esse coniicitur, ex contactu dolorifico, tumore, calore, & læsa membri actione. Cognita fractura eius periculum colli-

Z

gitur, ex morbi magnitudine, partis natura, ægri conditione, & symptomatibus. Nam fractura omnis eo periculosior est, quo in plura fragmenta ossa confringuntur, præsertim si foras emineant, multoque magis si intro flectantur, ex lib. de fracturis apud Hippo. quo articulis proprius est, ob dolorem, fluxionem, & curandi difficultatem, ex Celso lib. 8. quo plura vel maiora ossa franguntur, ex lib. de fracturis. Quo sunt sicciora, ut in biliosis & in senibus ex Gal. 6. methodi: & denique si cum vulnere, contusione, vel inflammatione coniungantur, ex Celso. Quod nunquam os fractum instaurari possit, nisi prius affectus illi tollantur. Quod attinet ad species fracturæ ossis capitis, cum omnes sint cognitu difficiles, præter incisionem quæ seruat teli vestigium, nisi futuris occultetur, Chirurgici sagacitatem & diligentiam requirunt, ut quamprimum reuellantur. Multum enim habet earundem dignotio momenti ad præsagium, & curationem, ita ut Hippo. præcipiat, medicum pati non debere, ut res tertium diem excedat, prius quam seccet, sed intra id spacium secandum, præsertim ubi tempus calidum fuerit, & à principio ægrum inuiserit. Æstiuo enim tempore, caro magis putrescit, & os gangrena periclitatur, ob saniem defluentem. Ob idque post triduum inflammatio infestare hominem consuevit, quo tempore os tractari non

non potest. Accidit aliquādo vt Chirurgus de-
ceptus, ea continui ossis capitis solutione, in
qua os, neque finditur, nec deprimitur, sed in
suo statu manere videtur, & in sua substantia
tantum continui solutionem occultam patitur,
terebrationem prætermittat autem septimum,
maximè verò die tertio, quem Hipp. eligit. Tūc
enim progressu temporis, sanie interiora putre-
faciente, grauiissima symptomata infligit, ac tan-
dem mortem. Tametsi per initia nihil periculi
subesse videatur. Primum enim inflammatur
vltus, & caro ab osse separatur. Deinde ichor
& sanies ex sanguinis extra venas effusi, vel os-
sis fracti putredine, in membranam cerebri stil-
lat. Ex cuius putredine, in parte principe, sem-
per febris excitatur, calore extraneo per arterias
communicato. Cui denique superueniunt de-
liria, sopor, conuulsio, vel paralyfis. Contingit
etiam aliquando, vt naturæ beneficio, & quia
fissura non ita profunda est, & collisio tam
vehemens, vt pus in cutem vergat, se-
paretque hanc ab osse, quæ mol-
litie & fluctuatione, si digi-
to præmatur, se pro-
dit, bonis ægri
rebus.

*

Z

2

De progn. luxationum.

C A P. XXII.

Prolapsus ossis è propria sede in alienam & insolitam, motum lædens, luxatio dicitur. Cuius duplex est differentia apud Hipp. completa nempe, cùm os prorsùs è sinu excidit. Et imperfecta, cùm aliquatenùs peruertitur & distorquetur. In quamcunq̃ue igitur partem, & quocunque modo fiat peruersio eiusmodi, non solùm lædit actionem, magis vel minus: sed etiã figuram membri naturalem mutat, & dolorem adfert. Quibus adduntur duo signa epigenomena, tumor, & inflammatio, quæ membri repositionem impediunt. Prognostica autem signa sumuntur ex luxationis magnitudine, tempore, causis, articulorum figura, corporis constitutione, & coniunctis affectibus. Tanto enim luxatio mitior est, & curatu facilior, quanto ossa minus aut faciliùs exciderunt, ex lib. 4. de articulis, vel pars minoris est momenti, vel corpus macrius, ex particula 46. lib. 1. de articulis. Aut mollius, vt in pueris & adolescentibus, ex Celso cap. 21. lib. 8. Presertim si recens fuerit & solitaria. Contra deterior est quæ maior, ob grauium symptomatum successionem, & partis atrophiam, quæ vasorum distorsionem sequitur, ex parti-

particula 80. lib. 3. de articulis , quæ partibus nobilibus vicinior , ex Paulo cap. 121. lib. 6. in ceruice, ob priuationem respirationis ex Celso. Quæ fit à causis internis, vt neruorum laxitate , ob facilem relapsum , aut vinculorum disrptione , quæ est incurabilis. Quæ pendet à depressione sinus, aut superciliorum attritu , ob frequentem mali recursum : ex Auicenna , in obesis & corpulentis , ob difficilem repositionem , ex par. 26. lib. 1. de articulis. Quia, vt ait Gal. multitudine carnis , vndique constringuntur articuli. Quæ natiua est vel inueterata , ob calli interuentum , ex sententia 21. eiusdem. Quæ denique luxatio vulnus , tumorem , vel inflammationem coniunctam habet: quia prohibet quo minus membrum tuto & facile reponatur, ex Hipp. 4. de articulis. Et hæc de luxationibus in genere. In specie autem duæ sunt potissimum à quibus graua symptomata adueniunt. Vna est maxillæ luxatio, quam periculum mortis afferre asserit Hipp. de articulis. Ea enim præter naturam muscoli temporales intenduntur , ac propterea dolent , & idcirco inflammatione præmuntur. Quia simili vitio cerebrum afficiant , quo affecto febres acutæ sequuntur, læduntur omnes animi actiones, sensus nempe, motus, ratiocinatio & memoria. Altera luxatio est illa triplex, quæ spinæ dorsali contingit, tres species gibbositatis constituens.

Inde enim omnes partes spinæ adiacentes affi-
ciuntur , crura & manus resoluuntur , &
tunc corpus stupore tenetur , fæces &
vrinæ supprimuntur, &c. De qui-
bus videndus est Hipp. lib.
de articulis , & Gal.
in commen-
tario.

*

*Finis libri sexti, ad gloriam & laudem Dei
Opt. Max.*





I N D E X
R E R V M E T
V E R B O R V M Q V Æ
I N H O C O P E R E C O N -
tinentur, ordine Al-
phabetico.

A



- Ab s c e s s u s per quos terminari solet pē-
ripneumonia. 145
Abscessus ad crura in peripneumonia non
in agina, cur laudat Hipp. ibid.
Abscessus stranguriosi qui. 220
Abscessus quot modis fiat. 319
Abscessus tria genera & quid apud Chirurgicos. 319
Abscessus duplex consideratio. 320
Abscessus boni considerationes. 321
Abscessus omnes in multa copia crudorum humorum
esse semper lethales. 323
Abscessus apertio in thorace minus periculosa. 243
Actiones voluntarię quare inter signa phrenitica nume-
rantur. 252
Alui fluoris symptomaticis, causę. ibid.
Alui profluuium longū & pertinax unde hydrops. 106 a
Alui fluxus varius in imbecillitate hepatis. 193
Alui profluuii cuiuslibet distinctio. 193. 194
Alui profluuium cur prodest pleuritidi. 253. b

I N D E X.

Alui fluxus critici signa.	258
Anastomosis.	233
Anginæ signa patognomica.	124
Anginæ differentiæ vnde sumuntur.	ibid.
Angina breui interficiens.	ibid.
Anginæ tutissimæ vt curabilis signa.	124. 125
Anginæ lethalis descriptio.	125
Ang. perniciosæ signa.	126
in Angina humoris translationes plus minus periculosæ.	126
Angina in qua rubor in faucibus sit suspectus.	127
Angina tumorem externum habens, salutem promittit.	129
Animalia clamare & currere visa ab Aristotele, corde extracto.	347
Anxietas duplex, & qui sint anxij.	88
Anxietas symptomatica, à malignitate morbi multiplex.	89
Anxietatis causa proxima.	89
Anxietas non mala.	89
Anxietas febres malignas sequens pessima.	90
Anxietas praua.	250
Appetentiæ animalis diminutæ gradus.	176
Appetentia parùm aut multùm læsa, non est sufficiens ad tutum præsagium.	177
Appetentia canina & bulimus differunt.	178
Appetentia canina in quæ mala mutatur.	179
Aphtarum causæ & prognosis vnde sumenda.	41
Aphtis pueri quando consumuntur.	ibid.
Aphthæ in adultis & suppuratis.	ibid.
Apoplexiæ varij exitus.	17
Apoplexia funesta quæ etiam febre superueniente non soluitur.	ibid.
Apoplex. quæ mutatur in resolutione.	ibid.
	Apo-

I N D E X.

Apoplexia curabilis.	18
Aspectus horrendus in acutis.	32
Asperitatis causæ.	74
Atræ bilis à sanguine adusto distinctio.	264
Atra bilis cur frigida dicatur.	ibid.
Atræ bilis exclusio semper perniciofa, & eius retentio deterior.	265
Atræ bilis generatio & eius effectus, cur semper lethales. 252	
Atra bilis vtrum salubriter excernatur sursum vel deorsum.	253
Atrophia.	146
Auditus læsiones.	34
Auditus grauis differentia, & quæ incurabilis.	35
Aurium dolores vel grauiore ratione loci.	48
Auriû dolor periculosus, in quib. fit locis & à qua causa. ibid.	
Aurium dolor cur periculosus iuuenibus.	49
Aurium sordium dulcedo cur damnatur.	228
Aures purulentes infantes epilepsia vindicare.	ibid.

B

B Albi cur raro calculis laborant.	216
Balbuties ebriosorum vnde.	311
Bilis cur prima incenditur inter omnes humores.	251
Bilis absentia in deiectionibus tres causæ.	261
Bilis effusionis in ictero causæ.	307
Bubonum prognosis vnde sumitur.	326
Bubo diuturnitatem morbi signans.	ibid.
Bubonum symptomatica generatio.	ibid.
Bubones pestiferi.	327

C

C Achexia causa.	165
Calculus quib. præcauetur.	216

Z s

I N D E X.

Calor natiuus in quo differt à febrili.	65
Calor æqualis toti optimum est.	ibid.
Caloris præter nat. vtilitates.	ibid.
Calor quartanæ quos affectus curet & præcauet.	66
Caloris & frigoris idem effectus.	ibid.
Caloris consideratio à Medico.	ibid.
Caloris extinctio cur sequitur à refrigeratione.	70
Calor quando exurit.	73
Calor, spiritus & sanguis, quot causis impediuntur, quo minus influat in habitum corporis in syncope.	109
Calor extraneus quando refrigerat & hydropem facit.	159
Calor modicus vrit & indurat mora.	167
Caloris naturalis vis ad æquanda crassa excrementa.	226
Calor parvus dicitur vel per se vel comparatè.	270
Caloris & coloris vicissitudo vnde.	304
Caloris & coloris in ægris mutatio, quid significat.	ibid.
Caloris extinctionis causæ quatuor.	353
Catarrhus quid.	229
Capitis dolores per sympathiam quid ostendant.	45
Caput quibus partibus condoler.	46
Capitis ossa quo tempore terebranda.	354
Cardialgia & cardiogmos cuius partis sunt affectus.	59
Cardialgia à iecore inflammato quando lethalis.	60
Cataphora lethalis.	18
Catoches exitus.	ibid.
Catoche parotidas prænuntians, lethalis.	19
Celiacæ passionis descriptio.	185
Cephalea cephalalgia qui dolores.	45
Cerebrum quare excrementosum.	227
Cerebrum per quos canales expurgatur.	ibid.
Cervicis descriptio, & cur dolet per febres acutas.	49
Cervicis dolor cur perniciosus aut carens periculo.	ibid.
Cervicis dolor quando comatosum affectum vel phrenitidem	

I N D E X.

nitidem minatur.	30
Claucularum nomen, & ad quos affectus clauiculæ do- lent.	32
Cibo non refici in appetentia canina malum.	179
Chirurgus quando fallit in fracturis capitis.	355
Choleræ morbi descriptio.	188
Cholera morbus cum febre malignus.	ibi.
Choleræ morbi malignitatem quæ accidentia denotent.	189
Coctionis primæ deprauatio vnde.	184
Coctio prima quid & eius læsiones.	ibid.
Coctionis primæ vitia non posse in aliis emendari.	174
Coctio excrementorum laudanda.	275
Coctio fallax & falsa.	ibid.
Coctionis ordo quibus causis intercipitur.	274
Coctio interrupta quid denotet.	286
Colicus dolor de omnibus intestinis dicitur.	200
Colici doloris causæ, & cur magis in crassis intestinis fiat.	ibid.
Colicus dolor quando firmatur in tympanitem.	201
Colicus dolor à retentis flatibus.	271
Color cutis naturalis.	297
Color cur mutatur in affectibus cordis.	298
Coloris mutatio in affectibus hepatis.	ibid.
Color niger & liuidus cur perniciosus.	302
Color liuidus quando simpliciter lethalis vel cum ad- ditione.	303
Coloris & caloris vicissitudinis causæ.	304
Coloris & caloris mutatio in ægris.	ibid.
Colliquationis & mortis signum.	70
Comatosæ affectiones quare magis vel minus memo- riam lædunt.	19.20
Coma succedens vigiliis lethale.	95
Coma quando in feb. exitialis iudicandum.	113
	Con.

I N D E X.

Conualefcētes cur plura appetunt.	179
Conuulfionis definitio, & quæ fine motu vel cum eo fit.	80
Conuulfio minùs periculofa.	ibid.
Conuulfio in feb. non abfolutè lethalis.	81
Cōuulfio cui fuperuenit febris, cur falutaris vel lethalis.	81
Conuulfio omninò lethalis.	ibid.
Conuulfio feбри fuperueniens à qua caufa debeat fieri fi fit curabilis.	ibid.
Corpus cum in magna febre non attenuatur quid fignificat.	316
Cutis volæ manus medium extremorum, proprium tactus instrumentum.	42
Cutis frontis facilè tabefcit.	71

D

D ecubitus confideratio duplex & figura.	90
Decubitus fanorum & eius figura optima quid fignificet.	91
Decubitus fpecies in malis habendæ.	ibid.
Decubitus præfagij institutio bona.	ibid.
Decubitus abfurdi qua ratione ad delirium referri poffint.	92
Decubitus materiæ in doloribus partium externarum cur funeftus.	64
Deiectiones vnde albefcant in phreniticis.	24
Deiectiones quare in hepaticis tandem nigrefcunt.	167
Deiectio cruenta in inflammatione hepatis mala.	170
Deiectiones alui quarum partium œconomiam demonftrant.	257. & 258
Deiectiones optimæ notæ, & quid fignificent.	258
Deiectio liquida quando laudabilis.	ibid.
	Deiectio

I N D E X.

Deiectio liquida in morbis acutis cur deterior aluo ad-
stricta. ibid.

Deiectiones liquidæ quando in veterosis damnandæ.
257

Deiectiones à mora vel vitione exsiccentur. 260

Deiectiones siccæ quæ prauæ. ibid.

Deiectiones albarum causæ. 261

Deiectiones albæ à bilis raptu ad cerebrum malæ. ibid.

Deiectiones albæ suppuratione. 262

Deiectiones albæ à mixtione in quib. affectibus. 262

Deiectiones albarum suppressio quando suspecta. 263

Deiectionum humorum noxiorum in principio morbi
cur suspecta. ibid.

Deiectiones cruentæ in dysenteria hepatica, cur semper
malæ. ibid.

Deiectiones atrabiles semper malæ. 264

Deiectiones biliosarum causæ. 265

Deiectio meraca, spumosa à calore igneo valdè mala. 266

Deiectiones meracæ spumantes, quorum morborum sunt
soboles. ibid.

Deiectionum variarum multa genera. 267

Deiectionum varietas bona. 268

Deiectiones meracæ spumantes, quos affectus sequuntur.
269

Deiectiones inuoluntariarum causæ. ibid.

Deiectiones coactæ. ibid.

Deiectiones inuoluntariæ semper malæ. 272

Deliquium animi cur facilè curatur. 167

Delirium febrem sequens vel procedens. 20

Delirium cum aluo liquida, in febr. malignis, 258

Delirii signa. 132

Delirantes cur magnum & raro respirant. 139

Delirium à quibus affectibus diaphragmatis sequatur.

I N D E X.

Delirium ab affecto diaphragmate, in quo differt à vera phrenitide.	152
Dentium consensus cum partibus corporis.	207
Dentium stridoris causæ.	311
Dentium stridor sine febre.	312
Dentium stridor in pueris dormientibus.	ibid.
Dentium stridoris in febre causæ.	ibid.
Dentium stridor per feb. cur signum malum.	313
Desipientia secuta vel perniciofa incurabilis, solubilis.	28
Distillatio quare semper mala.	229
Diaphragmatis vsus præcipuus.	151
Diaphragmatis cum cerebro consensus.	ibid.
Diaphragmatis inflammatio cur lethalis.	152
Diaphragmatis inflammationis symptomata.	153
Diarrhoeæ nomen, & in quo differt à lienteria, ac quot modis fiat.	190.b
Diarrhoeæ modus morbi diuturnitatem præfagiens.	ibid.
Diarrhoeæ modus lethalis, criticus.	191
Diarrhoea cur suspecta in morbis capitis.	190
Diarrho. salutaris in ophthalmia.	191
Diarrho. duobus modis solet salubriter pleuritidi superuenire.	192
Diarrho. in morbis thoracis noxia.	ibid.
Diarrho. tabidis lethalis.	192
Diarrhoea quæ damnatur in febre ardente.	193
Diarrhoea suspecta in phlegmone hepatis.	ibid.
Diarrhoea quando utilis in hydropo.	194
Diapedesis.	233
Diurosia quid & quare omnium pessima.	234
Dolor ut fiat quæ requirantur.	44
Dolor quando leuissimus causa grauissima.	ibid.
Dolor & voluptas quid sint.	44
	Doloris

I N D E X.

Doloris sensus cur aliquando sentitur in parte in qua non est causa doloris.	ibid.
Doloris causa in quib. capitis partib. fit.	45
Dolor capitis in apoplexiam vel epilepsiam finiens.	46
Dolor capitis pertinax in quæ mala definit.	ibid.
Dolor pulsatiuus in quib. partib.	55
Dolores genuum cur maligni.	64
Dolores manuum & pedum quid portendant.	ibid.
Doloris occultatio in angina lethalis vel non lethalis.	125. 126.
Doloris lateris sine causa sedatio quid portendat.	243
Dorsi descriptio & morbi.	54
Dorsi dolor duplex.	55
Dorsi distortioncs.	ibid.
Dorsi omnes morbi cur difficiles.	ibid.
Dorsum cum quib. partib. consensum habet.	ibid.
Durities mala & causæ eius.	73
Durities in acutis vnde.	ibid.
Durities pernitiola.	74
Durities lethalis	ibid.
Dysenterix nomen & genera.	194
Dysenteria hepatica.	ibid.
Dysenterix quatuor genera.	195
Dysenteria critica quibus fit morbis.	ibid.
Dysenteria lienosorum.	196
Dysenteria salutaris diurnior, cur fit lethalis.	ibid.
Dysenteria in appetentiam faciens.	ibid.
Dysenterix symptomata superuenientia.	ibid.
Dysenterix iudicium ab excretis.	197

E

E Brij cur balbutiunt.	311
Elephantiæsis quare nec hæmorrhoides nec purgationes	nes

I N D E X.

nes possunt prodesse.	209
Empiematis generali vel particulari significatione quid intelligatur.	149
Empyema quid & quæ signa.	ibid.
Empyema quot modis finiatur.	150
Empyci qui celeriter sanantur vel moriuntur.	151
Empyematis tardè & difficulter curabilis descriptio.	ibid.
Epilepsia quale symptoma.	82
Epilepsiæ differentia.	ibi.
Epilepsiæ & apoplexiæ varia generatio.	ibid.
Epilepsiæ per consensum vel per essentiam signa.	ibid.
Epilepsia incurabilis, non periculosa.	83
Epilepsiæ magnæ signa.	ibid.
Epiploi vulnera quæ incommoda sequantur, & cur tam citò putrescit cum foras prodit.	342
Error potius in morbis longis committitur quàm in acutis.	4
Exantematis nomen.	327
Excrementa constitutionem partium à quib. manant ostendunt.	9
Excrementorum coctio vel cruditas quid portendat.	10
Excrementa alui qualia in hepaticis.	166
Excrementorum expulsio per successum commodior.	202
Excrementa narium viscosa pessima.	229
Excrementorum per os varia genera.	230
Excrementorum etiam sincerū facilis, educio bona.	235
Excrementorum crassities à calore naturali.	ibid.
Excrementa quando in bonis vel malis habenda.	225
Excrementorum largior vel parciore excretio quid ostendat.	226
Excrementorum duo genera in cerebro fiunt, & per quæ loca	loca

I N D E X.

Loca excernuntur.	227
Excrementa quomodo à calore naturali resiccantur.	226
Excrementorum genera quæ in principiis morborum solent excerni.	253
Excretorum non iudicantium significatio.	290
Excretiones omnes & abscessus parui cur dānantur.	291
Excretiones omnes spontaneæ cū fieri incipiunt & cessent, malæ in morbis acutis.	293
Expectoratio facilis, quid denotat.	240
Expectoratio assidua in pulmonia requiritur.	242

F

F acies rubor quare in acutis suspecta.	300
Facies florida & rubens cum tristi vultu cur mala.	300
Facies cur tam facilè rubet.	299
Facies rubor pulmone inflammato.	ibid.
Facies rubor à variis affectib.	300
Facultatis animalis illæsiō, & facultatum numerus.	6
Facultates animales internæ quib. affectibus minuuntur aut abolentur.	7
Facultatis vitalis læsiones.	ibid.
Facultatis sanguificæ læsiones, vnde.	ibid.
Facultatis animalis læsiones à quib. fiunt.	16. & 19
Facultatis animalis dispensatio & organa.	26
Facultatis vitalis necessitas ad omnes actiones.	104
Facultatis pulificæ & respirandi idem vsus.	ibid.
Facultatis animalis roboris necessitas in morbis thoracis.	243
Facultatis influxus, quib. causis impeditur.	352
Fames duplex.	178
Fames non naturalis, duplex.	ibid.
Faucium nomine quid intelligatur.	51

I N D E X.

Paucium dolores convulsionem aut phrenitidem significantes.	ibid.
Fauces unde malè afficiuntur in cholera morbo.	189
Febris diuersa maniacis & phreniticis.	20
Febris natura quib. dignoscitur.	110
Febris symptomatice lethalis.	110
Febres continuæ cur periculosa.	ibid.
Febres quæ singultuosa dicantur.	112
Febres quæ comatodes.	113
Febres colliquantes & diaphoretica, quæ.	113
Febres malignæ & insidiosa laborantes.	114
Febres in quib. signa lethalia eduntur in his qui paulò antè sani videbantur.	115
Febres medicis imponentes.	ibid.
Febres quib. biliosi humores, crassi ac crudi miscentur malignæ.	116
Febres ardentes malignæ.	ibid.
Febres æstiosa & implacida.	117
Febrium æstiosarum causa.	ibid.
Febrium semitertianarum differentia duplex.	118
Febres tritæphiæ quæ, & earum causa.	ibid.
Febrium tritæphiarum insultus cur recrudescere soleant.	119
Febris quartana cur difficilis.	122
Febres diurnæ & nocturnæ de numero sunt pituitosarum.	ibid.
Febris diurna cur periculosior nocturna.	123
Febres tritæphiæ quales & quare in his accessiones posteriores sunt prioribus deteriores.	119
Febres quales in autumnis.	120. & 121
Febrium erraticarum duo genera.	121
Febres autumnales in quas degenerant.	ibid.
Febres erraticæ factæ ex intermittentibus cur malæ.	ibid.

Febris

I N D E X.

Febris syncopalis picam sequens.	180
Febris lypiria vtrum possit cholera superueniente solui.	189
Febres lypiriæ causæ.	ibid.
Febres quæ finiuntur abscessibus, ad partes inferiores.	321
Fistula quale vlcus, & quæ eius generatio.	332
Fistularum differentia vnde sumitur.	ibid.
Fistularum facilitas vel difficultas generationis à loco.	ibid.
Fistularum curatio facilis vel difficilis: à figura & loco, à puris quantitate, qualitate & modo exeundi.	333
Fistularum vtilitas vt fonticulorum.	333
Fistulæ curatu faciles.	334
Flatus quid, & eius generatio.	270
Flatuum à variis calorib. generatio.	ibid.
Flatuum exitus liberalis & retentio.	271
Flatuum retentio quos affectus pariat.	ibid.
Flatuum retentio mala.	ibid.
Frigus quas partes plùs minùs afficit.	66
Frigus partium externarum quare perniciosum.	67
Frigus priuatium & positium quando fit.	68
Frigus extremorum alternatim recurrens, quid significet.	ibid.
Frigus quando sequitur siccitatem.	74
Frigus cur sentitur cum fiat à materia mordaci.	100
Frigidum in corporib. duplex.	294
Fractura ossis, quibus signis cognoscitur.	253
Fracturarum varia prognostica vnde.	ibid.
Fracturæ ossis capitis quæ difficulter dignoscuntur.	353

G

G Angrenæ & sphaceli differentia.	351
Gangrena quando curationem accipit.	352

I N D E X.

Graueolentia excedens damnatur in omnib. excrementis sicut abſentia fœtoris.	268
Graueolentiæ cauſæ.	ibid.
Grauitatis ſenſus in omnib. partibus vnde.	72
Grauitas totius.	ibid.
Grauitas morbo ineunte lethalis.	ibid.
Grauitatis cauſa duplex.	78
Gultui partes deſtinatæ.	39
Gultus diminutio & ablatio vnde.	ibid.

H

H Abitus qualis debet eſſe in feb.	316
H æmorrhagia, quæ vtilis in inflammatione hepatis.	170
Hæmorrhagiæ ægrorum & ſanorum conſideratio.	277
Hæmorrhagia ſuppreſſa morbos plethoricos facit.	ibid.
Hæmorrhagia perfectè morbos iudicans qualis.	248
Hæmorrhagia in morbis longis & acutis conſideratio.	ibid.
Hæmorrhagia in Lienoſis.	ibid.
Hæmorrhagia ſymptomatica in acutis.	ibid.
Hæmorrhoides à quib. morbis corpus vindicant.	207
Hæmorrhoides varias partes corporis expurgant.	ibid.
Hæmorrhoides quib. conueniunt.	207
Hæmorrhoides à quo humore fiunt.	ibid.
Hæmorrhoides plethoram & cacochimam deplent.	ibi.
Hæmorrhoides quib. proſunt vel obſunt.	208
Hæmorrhoides ſuperfluz qua ratione obſunt.	209
Hæmorrhoides ſupreſſæ qua ratione tabem & hydro- pem generant.	ibid.
Hæmorrhoides quando proſunt vel non proſunt ele- phantiaſi.	209
Hæpar quando pituiſoſum vel bilioſum generat ſan- guinem.	

I N D E X.

guinem.	160
Hæpatici qui dicantur.	165
Hæpaticorum duo genera.	166
Hæpaticorum signa patognomica.	ibid.
Hepaticorum deploratorum signa.	ibid.
Hepatis intemperantia, quæ hæmatosim labefactat.	165.
& 166	
Hepatis cinna vel gibba pars inflammata, quib. signis dignoscitur.	169
Hepatis phlegmones multiplex exitus.	ibid.
Hepatis conuexæ partis inflammatio, cur magis suspe- cta.	170
Hepatis ariditas, & totius corporis à liene tumefcente.	
173	
Horror, quare cum lassitudine coniungitur.	85
Horroris & rigoris causæ.	100
Horror magnus in augmento febris quartanæ.	101
Horror in suppuratis.	144
Hydrops siccus quos dolores ventris sequatur.	63
Hydropis species in quo modo conueniunt.	159
Hydropis generatio triplex.	ibid.
Hydropem eminentem quæ signant.	160. & 161
Hydrops qui curari potest.	161
Hydrops qui sanatus videbatur cur recrudescit deterius.	
161. & 162.	
Hydropis desperati signum.	162
Hydropis grauissimi descriptio.	ibid.
Hydrops morbo acuto succedens cur lethalis, & dolo- rificus.	163. 269
Hydrops à supp. hæmorroi.	208
Hypochondrij nomine quæ partes intelligantur.	60
Hypochondrij boni notæ.	ibid.
Hypochondrij doloris causæ.	ibid.
Hypochondrij partes quæ periculosius soleant dolore.	

I N D E X.

Hypochondrij dolores quot modis finiantur.	ibid.
Hypochondrius dolor quando lethalis est prædicendus.	ibid.
Hypochondrij dolores, quare celeriter generantur & finiantur aliquando.	62
Hypostasis quid & quæ omnium præstantissima.	285
Humiditatis effectus.	68
Humiditas laudabilis vel vituperanda.	73
Humidum putrefactionis causa.	ibid.
Humorum & spirituum agitatio à quibus causis.	89
Humorum nigrorum differentiæ.	263. & 264
Humoris nigri vel melancholici à sanguine nigro distinctio.	164
Humor niger salubriter excernitur.	ibid.

I

I cteri causa proxima ubi primò apparet.	307
Icterus sine febre icterus triplex.	ibid.
Icterus criticus quo morbi tempore fiat, & quibus circumstantiis.	308
Icteri varia signa.	ibid.
Icterus salutaris & symptomacus.	ibid.
Icterus factus post septimum diem, cur non necessario bonus.	309
Icterus vitio hepatis factus, qui curabilis, & qui lethalis.	ibid.
Icterus in hydropem desinens.	ibid.
Icterus niger ab hepate calidiore.	ibid.
Iecori quot partes adstant.	5
Ilei natura, causa, & signum maximè proprium.	198
Ileus tenuiorum intestinorum cur periculosior.	ibid.
Ilei superuenientia symptomata funesta.	ibid.
Inappetentiæ causæ.	176
	In

I N D E X.

Inappetentia recidiuam minans.	177
Inappetentia lethalis.	ibid.
Incubus in quos affectus mutatur.	25
Inspiratio & exspiratio, quando magis & minus susci- piunt.	14
Intestinorum actionum læsiones.	8
Intestinorum tenuium vulnus cur insanabile.	350
Intest. crassorum vulnus curabile.	ibid.
Iuguli dolor cur periculosus.	52

L

L Achrimarum inuoluntariarum causæ, & quæ sint exitiales.	29
Lassitudo triplex.	87
Lassitudo iuncta cum anxietate.	ibid.
Lassitudo cum coniungitur cum horrore.	ibid.
Lassitudo si ex rigore sequatur quid significet, & eius prognosis quomodo colligenda.	88
Læmarum in oculis generatio triplex.	28
Læmarum generatio quæ lethalis in morbis acutis.	ibid.
Lethargus phrenitidi superueniens semper lethalis.	24
Leuitatis & grauitatis signum.	71
Lienis variij affectus quib. sanguificatio deprauatur, & eius inflammationis signa.	171
Lienis morbi quare longi.	ibid.
Lienis inflammationis terminus.	172
Lien vtrum per vrinas possit euacuari.	ibid.
Lienis tumores in quas partes abscessum faciunt.	173
Lienis tumores cur rarò suppurantur.	ibid.
Lienosi quando lethales iudicantur.	ibid.
Lienteria quando mutatur in dysenteriam.	187
Lienteriæ causæ & eius discrimen à dysenteria.	185
Lienteria quæ in malis habenda.	ibid.

I N D E X.

Lienteria in hydropem definens , quæ citò curatur & mutatur in tenesmum.	187
Lienteria in tabem definens.	ibid.
Lienteria à catarrho cur periculosa.	ibid.
Lingua cur crebro spectanda Medico.	39
Lingua cur qualitates vaporum & fumorum facile imprimuntur.	ibid.
Lingua liuida & frigida in moribundis.	ibid.
Linguae color & sapor humoris redundantis signum.	40
Linguae horribilitas duplex, & quæ lethalis.	ibid.
Lingua cur horribilis in principio morbi.	ibid.
Linguae nigredo magis vel minus periculosa.	ibid.
Linguae quot affectus.	305
Lingua quare naturam morborum & humorum representat.	305
Lingua crebro spectanda.	ibid.
Linguae nigredinis causæ.	306
Linguae colores quas feb. indicat.	ibid.
Linguae liuor cur damnatur.	ibid.
Linguae nigredo quæ caret periculo.	307
Linguae nigredo lethalis.	ibid.
Lingua rubra vbi nigricans esse debet periculosa.	307
Lumborum dolor quando finitur per menses aut hæmorrhoidas.	58
Lumborum dolor cum sedatur relata ad caput materia, cur malignum.	57
Lumborum dolor quando critica excretionem terminatur.	ibid.
Lumbi quando sine febre dolent.	156
Lumborum partes continentæ & contentæ.	ibid.
Lumbis dolentibus quæ partes soleant dolere & quibus signis quæque dignoscantur.	157
Lumborum dolor sæpè recurrens cur periculosus.	213
Luminis fugæ causa communis, & quæ exitialis.	29
Luxatio	

I N D E X.

Luxatio quid & eius differentia.	356
Luxtionum prog.vnde sumitur.	ibid.
Luxatio quæ mitior vel deterior.	ibid.
Luxatio incurabilis.	357
Luxationi maxillæ quare grauia symptomata superueniunt.	ibid.
Luxatio spinæ dorsalis quæ symptomata pariat.	358

M

M Alatia seu pica in grauidis & puellis variè terminatur.	180
Mania,melancholia & phrenitis in quo differunt.	20
Mania sine febre.	ibid.
Maniæ qui sunt propensi.	22
Medicus vnde fallitur in præfagiendo.	3
Memoriæ diminutio & abolitio vnde.	17
Memoriæ læsiones quæ faciliè vel difficilè sanantur, & quæ sunt incurabiles.	16
Meraci significatio communis & propria.	168
Met astalis quæ non semper lethalis.	32
Mictio inuoluntaris in pueris & senibus.	222
Mollitiei alia consideratio in ægris, alia in infans.	73
Mollities æqualis in corpore quid significet.	ibid.
Mortis signa certissima ex spiritu frigido.	74
Morbi natura, magnitudo, motus, & mos vnde mentiuntur.	4
Morbi remissio infidelis quot modis fiat.	14
Morbus quib. recrudescit sine perseuerantia.	15
Morbi sicci qui.	69
Morbi maligni descriptio.	115
Morbi autumnales tripliciter difficiles.	121
Morborum acutorum terminus.	131
Motus morbi dignotio ex nigredine linguæ.	307

I N D E X.

Mouendi facultas quib. affectionib. læditur.	76
Motus deprauati 4. genera.	77
Motus deprauatio voluntarij à quib. affectibus.	80
Motus concussiu species.	97
Motus diebus paribus facti intempestiu.	122
Musculis oculorum conuulsis qui affectus sequantur.	31
Musculi sphinteris vesicæ operatio, eius resolutionis causæ & quæ incurabilis.	221. & 222

N

N ares cur contrahuntur in moribundis.	137
Naturæ vltimus conatus contra morbum.	14
Natura quid sit.	180
Naturæ vincentis progressus quales.	275
Nausea & vomitus in quo differunt.	201
Nausea, cardialgia, & vomitus in febribus vnde.	202
Nausea, & vomitus cur mala in morbis.	ibid.
Nausea in febre cur prauum vt signum, & vt causa.	256
Nerui punctura cur omnium difficillima.	342
Nerui puncturæ symptomata superuenientia quib. re- mediis impediuntur.	ibid.

O

O bliuio incurabilis.	16
Obliuio quando in affectibus peioribus transit.	17
Oculorum lior lethalis.	303
Oculorum vis ad præfagiendum.	26
Oculorū puritas vnde labefactatur in acutis morbis.	27
Oculorum puritas ab humorum translatione, quare suspecta.	ibid.
Oculorum habitationis discrimen.	ibid.
Oculus alter altero minor, quid significet,	30
Ocu	

I N D E X.

Oculorum vitia ex parte musculorum.	30
Oculorum cauitatis causæ.	31
Oculi cur facilè cauantur.	ibid.
Oculorum immobilitas quando signum est insanix & eorum contorsio lethalis.	ibid.
Oculorum immobilitas mala.	32
Oculorum prominentia quæ mala.	33
Oculorum dolores cur difficile curantur.	47
Odor tetrus vnde.	315
Odoratus deprauatio periculosa.	38
Olfactus instrumentum.	37
Olfactus vitiorum causæ.	ibid.
Olfactus diminutio, deprauatio à quibus causis.	38
Oscitationis & pandiculationis causæ.	86
Oscitatio & pandiculatio quid portendant, & quomodo fiant.	ibid.
Ortopneæ causæ.	136
Ortopnici cur solùm erecta ceruice respirant.	142
Os ventriculi cur cor vel cardia dicatur.	58
Orificium ventriculi quot affectibus torqueatur.	59
Os ventriculi ad quam affectionem hepatis doleat.	ibid.
Ossis fissura quomodo dignoscatur.	353
Ossa capitis quo tempore terebranda.	354
Ossis capitis apertio omissa quæ symptomata pariat.	355

P

P Alati vitia gustum lædencia.	41
Palati exulcerationis causæ.	ibid.
Palpebrarum vitia.	33
Palpebræ superioris tensio vnde.	ibid.
Palpitatio quarum partium sit affectus.	96
Palpitatio quid & eius causæ.	ibid.
Palpi	

I N D E X.

Palpitatio epilepsiam prænuntians, delirium præfagiens, oris torturam significans, phrenitidem, tenesimum portendens.	ibid.
Palpitatio cordis quid & in quo differat à motu pulsatili.	108
Palpitationis causæ.	ibid.
Palpitatio cordis à sanguinis feruore, curatur venæ se- ctione.	ibid.
Palpitatio cordis quæ magis vel minus periculosa.	109
Pandiculationis & oscitationis causæ, quomodo fiant & quid portendant.	85. & 86
Paralysis à grauioribus causis fit quàm stupor.	78
Paralysim posse fieri ab humore bilioso.	ibid.
Paralysis omnibus morbis frig. succedit, in multos etiam morbos potest transire.	ibid.
Paralysis numquam morbus acutus.	79
Paralysis curabilis, incurabilis lethalis.	ibid.
Paraphlegiæ causa.	43
Parotidum mollities à frequenti spuitione.	246
Parotis quid & ubi fiat.	154
Parotides in quib. feb. non fiunt & cur non fiunt in diu- turnis.	ibid.
Parotides vt fiant quæ debent concurrere.	321
Parotides cur rarò salutaris.	322
Parotidum variæ solutiones & quæ laudabiles.	ibid.
Parotidum solutio lethalis.	ibid.
Parotidum suppurationi quando fidendum vel non fi- dendum, & quot modis sunt periculosa.	ibid.
Parotides cum virium infirmitate semper mala.	223
Partium genitalium ratio, & toti corpori respondere.	223
Partes externæ ad quos affectus, aliæ aliis magis dolent.	63

Par

I N D E X.

Partium externarum dolentium varij exitus.	ibid.
Partes quæ faciliùs siccantur.	74
Partes respirationis quando dolent vel non dolent.	136
Pectoris acceptio multiplex.	53
Pectus cur pars est sensus exquisitissimi.	54
Pectoris prolapfus.	138
Pedes & manus rubere dupliciter.	200
Pectus quibus affect. tumet.	214
Pectoris ruboris in morbis acutis pulmonum quando lethalis.	301
Peripneumonia quid & eius triplex generatio.	143
Peripneumonia terminatur quinque modis.	143
Peripneumonia quando lethalis.	ibid.
Peripneumonia quando salubriter soluitur alui fluxu.	144
Phrenitidis prognosis instituendæ ratio.	20
Phrenitidis futuræ exordientis signum.	21
Phrenitis securior.	23
Phrenitis funesta & quæ ei succedunt symptomata.	ibid.
Phrenitidis periculosa signa.	24
Phrenitidis signum ex urinis.	276
Phlictenæ quid differunt ab exantematibus.	327
Phtisis in qua puris sputum sequitur, vel præcedit sangui- nis sputionem.	145
Phtisis causæ.	ibid.
Phtisis iam iam lethalis signa.	146
Phtisi, cur alui fluxus lethalis.	149
Pica quid sit.	178
Pica in gravidis & pueris variè terminatur.	180
Pituitæ falsæ generatio.	244
Perfrigerationes quæ plus minus prauæ, vel vtilis di- cantur.	67
Perfrigerationes pessimæ.	ibid.
Periculum, à natura partis distinguitur, non solum à ma- gnitu	

I N D E X.

gnitudine causæ.	61
Pleuritidis symptomata necessaria.	128
Pleuritidis diuersi exitus vnde colligantur.	129
Pleuritides quę celeriter vel tardè ad statum perueniunt.	129
Pleuritides lethales senibus.	ibid.
Pleuritides varij exitus.	130
Pleuritidem finiri expectorato, quid ostendat.	ibid.
Pleur. terminari per suppurationem & eius malignam qualitatem quem ostendat.	131
Pleuritidis pernities à siccitate vt concludatur quę sunt notanda.	131
Pleuritidis methastasis notæ.	132
Pleuritidis signa lethalia.	132
Pleuritidi stillicidium sanguinis superueniens, lethale.	ibid.
Pleuritidis exitus per sudorem, vel per abscessum ad cutem.	133
Prædicendi ratio vnde habetur.	4
Prænotiones esse incertiores in progressu & statu morbi in acutis quam in longis morbis.	3
Præfagiendi artem omnib. morbis accommodari.	1
Præfagiendi facilitas & certitudo qua ratione perquirenda.	2
Præfagiendi certitudo initio morborum acutorum tutior quam in longis.	3
Potionis vsus.	181
Potus & cibi omnimoda auersio quid significet.	182
Pruritus descriptio & causæ.	75
Pruritus varia effecta à variis causis.	ibid.
Pruritus quib. corporib. & quo tempore magis fit.	ibid.
Pruritus criticus.	ibid.
Pruritus in tabidis cur malum.	76
Pueri quare conuulsionib. facile corripuntur.	81
Pueri	

I N D E X.

Pueri dormientes cur strident dentib.	312
Pueri verminosi cur masticant.	206
Pulmonia sicca lethalis, salutaris.	144
Pulmo quib. partib. conficitur vnde tussis excitatur.	153
Pulsus non est tanta necessitas quanta respirationis.	105
Pulsifica facultas deprauatur in omnibus febris.	109
Puris explorandi ratio.	148
Puris confectio qualis.	330
Puris in capite generatio citra inflammationem.	228
Pus angignatur in cerebro,	ibid.
Puris pessimi notæ.	239
Pus in qua alteratione fiat.	ibid.
Pus cur modicè fœtens esse dicitur.	ibid.
Pustulæ quid differant à tumoribus.	319
Pustularum genesis & earum diuersitas.	317
Pustularum humor vnde acquirit acrimoniam & falsedinem.	328
Pustularum varietas, & generatio in feb. critice.	ibid.
Pustularum symptomatica generatio.	ibid.
Pustularum subita occultatio, mala prognosis.	329
Pustularum generatio symptomatica in corruptela alicuius visceris.	ibid.
Pustularum in lingua generatio, in vulneribus capitis.	ibid.
Pustulæ pleuritidi succedentes.	ibid.
Pustulæ febris pestiferæ succedentes cur lethales, præsertim cum in primis diebus oriuntur.	ibid.

R

R efrigeratio duplex.	159
Refrigerationis causæ pessimæ.	ibid.
Renes cur maximè dolent lumbis dolentibus.	56
Renum actio quæ & vnde lesiones eius.	211
Renum	

INDEX.

Renum affectus sine dolore.	212
Renes quare plerumque dolent in febre.	ibid.
Renum phlegmones signa.	212
Renum morbi diuturni senibus familiares.	ibid.
Renum calculus, vlcus & abscessus.	ibid.
Renum morbi in senibus curatu difficiles.	213
Renum morbi qui non sunt periculosi nec crudeles, & contra.	ibid.
Renum dolor in feb. qui periculosus.	214
Renum inflammatio cur peracuta.	ibid.
Renum vlcus quod ægrè curatur.	215
Renes vlcerati non semper dolent.	ibid.
Renum vlcera benigniora quàm vesicæ.	ibid.
Renum vlcera incurabilia.	ibid.
Renum & vesicæ calculus incurabilis.	ibid.
Resolutionis causæ.	69
Respirationis læsiones, & eius diminuitæ causæ.	133
Respirationis abolitæ causæ, & bonæ descriptio.	ibid.
Respirationis mutatæ causæ.	ibid.
Respirationis difficilis 4. coniugationes.	ibid.
Respiratio frequens cum magnitudine, & paruitate cōiuncta, & in quib. affectib. fiant.	135
Respiratio frequens & parua.	ibid.
Respirationis, & pulsus frequentię causæ.	136
Respiratio parua & rara, & spiritus frigidus idem sunt.	137
Respirationis partes quando dolent.	136
Respirationis magna, & frequens qualis, & quid significet.	138
Respiratio magna & rara quæ.	138
Respiratio propter virium debilitatem quæ.	139
Respiratio sublimis, quæ apud Hipp.	ibid.
Respiratio magna, & rara, quæ cum delirio coniungitur.	ibid.

Respi

P N D E X.

Respirationis partes.	140
Respirationis necessitas triplex.	ibid.
Respirationis inæqualitas in quo consistit, quando fit, & à quacausa.	141
Respiratio cum stertore in quibus fit actibus.	142
Rigor symptomaticus phreniticis contingens funestus.	
24	
Rigor quid & eius subiectum.	99
Rigor in sanis & ægris.	100
Rigoris & horroris discrimen.	ibid.
Rigoris & horroris causa.	ibid.
Rigent ægri variè in variis feb. typicis.	101
Rigor omnis quare incipit in partibus posticis non an- ticis.	ibid.
Rigor criticus quid, & quib. morb. fit, & eius signa.	102
Rigoris symptomatici descriptio, & quot modis noceat.	
ibid.	
Rigor citra euacuationem excitatus, materias ad cere- brum rapit.	103
Rigor primæ inuasionis.	ibid.
Ruboris perpetui & per interualla in facie causa.	299
Rubor faciei quare suspecta in acutis.	300
Rubor pectoris in morbis acutis pulmonum, quando lethalis.	301
Rubor manuum & pedum symptomaticus cur perni- ciosus.	ibid.
Ruboris partium extimarum quare deteriores nigriori- bus æstimantur, & mortem proximam designant.	302

S

S aliuatio multa vnde.	230
Salsedinis causæ, & quomodo fiat in sputis.	244
Sanguificatio quib. affectib. diminutè leditur.	158

B b

I N D E X.

Sanguificatio à quo calore.	160
Sanguinis per os è multis partibus eiicitur.	231
Sanguis quot modis exit è propriis vasis.	233
Sedimentum initio apparens, & deinceps desinens quid denotet.	287
Segnities commune symptoma eorum qui moriuntur.	69
Senes, & cachetici cur molles videantur cum sint sicci.	73
Senes cur facile tremunt.	84
Siccitas quæ periculosa vel non.	70
Siccitas quæ damnanda in vlceribus.	331
Signorum distinguendorum ratio.	11
Signa patognomonica syndreuonda, & morem morbi iudicantia.	ibid.
Signa critica, salutis & mortis, & simul signa, & symptomata.	11. & 12
Signorum distinctio Hippocratis.	13
Signorum constantia necessaria ad tutum præsagium.	ibid.
Signa timorem inferentia ignaris non medicis.	14
Signorum vires potius quàm numerus considerata.	15
Signorum bonorum, & prauorum comparatio.	240
Siccitas dolorem faciens.	69
Sicci duplex significatio.	ibid.
Siccitatis duplex generatio.	ibid.
Siccitas primo laxat partes, deinde rendit, & indurat.	70
Sitis defectus vtrum deterior quàm fames.	183
Sitis præter nat. causæ.	181
Sitis inexplibilis causæ.	ibid.
Sitis ante somnum excitata per somnum quiescens, & contra.	ibid.
Sitis quare non semper responderet feбри.	182
Sitis extincta sine causa, manifesta manente febre quid signi	

I N D E X.

significet.	182
Sitis solutio falso credita.	ibid.
Sitis modo sedata modo recurrens.	ibid.
Singultus quid, & eius causæ.	203
Singultus in senib. cur periculosus.	ibid.
Singultus superueniens inflammationi hepatis cur periculosus.	ibid.
Singultus à sola repletione minus periculosus.	204
Solutionis continui causæ.	41
Somnus quid, eius triplex differentia, item naturalis, & præter nat.	92
Somnus comatosus.	93
Somnus in moribundis vnde.	ibid.
Somni turbulenti causæ.	ibid.
Somnus criticus,	ibid.
Somnus profundus à quo facilè excitatur æger.	93
Somnus in principio accessionum quare nocet.	ibid.
Somnus nocens internis inflammat. & proficiens.	94
Spiritus quid, & qui ei affectus contingunt.	270
Spirituum & humorum agitatio à quib. causis.	89
Spiritus frigidus, respiratio rara, & parua lethalis.	137
Spirationis bonæ laus.	240
Splenici quando lethales indicantur.	173
Spinalis medulla quæ communia habet cum cerebro.	340
Sputum cruentum superueniens hepaticis, lethaliter.	239
Sputum lucidum in malis habendum si foeteat.	241
Sputi paucitas quibus morb. suspecta.	242
Sputum quale esse debet in pleuritidi.	ibid.
Sputi paucitas quare in pulmonia horrenda.	ibid.
Sputi suppressionis causæ.	243
Sputi suppressio lethalis.	ibid.
Sputa falsa & lenta cur praua.	244
Sputum dulcescens quare suspectum.	ibid.

I N D E X.

Sputa dulcia, quot causis succedant falsis & quare.	245
Sputi falsi perceptio sub dulcedine suspecta.	ibid.
Sputorum bonorum dotes & quid significant.	230
Sputi dererimi conditiones in pleuritide.	231
Sputum biliosum cur in pleurit.	234
Sputorum suppressio quare in pleuritide & cur ab ea sequitur phrenitidis.	235
Sputum laudabile.	236
Sputum tenue cur difficile excluditur.	ibid.
Sputum crassum & glutinosum quare difficulter expuitur.	ibid.
Sputi spumosi differentia.	237
Sputum cur magis vel minus perseverat.	ibid.
Sputum spumosum albicans cur minus periculosum.	ibid.
Sputum spumosum & sincerum cur lethale.	238
Sputi purulenti optimi notæ.	ibid.
Sputum purulentum grauitæ foetens quid ostendat.	239
Sputatio quot nominibus laudanda.	239
Sputationis frequentis ratio.	245
Sputatio frequens vt sit signum phreniticum quæ consideranda.	246
Sputatio magnitudinem inflammationis significas.	ibid.
Stertor quod symptoma.	142
Stertor solet fieri in vehementi difficultate respirationis & de eius causis.	ibid.
Stranguria quale symptoma & causæ eius.	219
Stranguria ex parte vesicæ vel vrinæ.	ibid.
Stranguriosus abscessus.	ibid.
Streptus in febribus acutis, dum bibunt ægri cur lethalis.	313
Streptus pleuriticorum & purulentorum cum stertore cur malum.	ibid.
Streptus & murmuris in ventre causæ.	314
Sudor	

I N D E X.

Sudor & calor quare potius in pectore & ventre, rigores in dorso.	292
Sudor in moribundis & suppuratis.	293
Sudores modo incipientes modo desinentes quomodo-cumque fiant quid significant.	294
Sudores frigidi quid denotent.	ibid.
Sudores frigidi vtrum sint frigore positivo.	295
Sudores frigidi duplex generatio.	ibid.
Sudores frig. quando non omnino lethales.	ibid.
Sudor quid, & de modis eius expulsionis.	286
Sudoris & urinæ eadem materia, eadem generatio in sanis.	287
Sudor ægrorum triplex.	287
Sudoris critici in febre continua signa, periodicus sudor.	ibid.
Sudor symptomaticus duplex.	288
Sudor symptomaticus quando lethalis, quando est signum morbi diuturni.	ibid.
Sudores quos morbos solent iudicare.	289
Sudoris qualitas.	290
Sudor multus febrem non finiens malus.	ibid.
Sudor morbi longitudinem.	ibid.
Sudor affatim & assidue ostendens effusus, cur nocuus.	291
Sudores pauci in acutis pravi.	ibid.
Suppuratio hepatis quæ curari vel non curari potest.	169. 170
Suppuratio vt fiat quæ sunt necessaria.	173
Suppuratio renum succedens inflammationi.	214
Sternutatio quid & eius causa.	97
Sternutatio quando excrementa ex capite, pulmone & ventre expurgir.	98
Sternutatio quando bona vel mala, in omni affectu eius absentia.	ibid.

I N D E X.

Sternutatio quando prodest vel obest.	99
Stomachi compositio.	176
Stillicidium sanguinis in acutis malum.	248
Strutitia & somnolentia.	16
Stuporis causa.	43
Stupor in febre cur periculosus.	ibi.
Stupor prænuntius paralysis.	78
Stupor periculo carens & lethalis.	ibi.
Surditas critica in quibus morbis fit & quid portendar.	
35	
Surditas symptomatica curabilis vel incurabilis, lethalis.	
ibi.	
Syncope & liptymiæ differentia.	106
Syncope definitio.	ibi.
Syncope semper cor afficit vel per se vel per consensum.	
ibi.	
Syncope causa proxima.	ibi.
Syncope lethalem quibus signis colligimus.	107
Syncope exitialis & salutaris.	ibi.
Symptomatum differentia.	196
Symptomata dysenteriaë funestæ superuenientia.	196
Symptomatum duo genera vulneribus capitis superuenientia, & unde fiunt talia.	337-338
Synderatio seu sphacellus quid, & de eius causis.	352

T

T Abes à suppressis hæmorrhoidibus.	209
Tabes renalis semper habet malum exitum.	216
Tabis nomine quid intelligatur.	146
Tactus cur disseminatus est toti corpori.	42
Tatus obiectum & instrumentum.	ibi.
Timpanitidis generatio.	160
Tinnitus aurium duplex.	36
Tinni	

I N D E X.

Tinnitus aurium criticus, indeclinatione morbi, in convalescentibus.	ibid.
Tinnitus cur lethalis.	ibid.
Torpor paralyſim ſignificans.	43
Torpor ab vrina ſuppreſſa.	219
Torpor ſymptoma morientium.	ibid.
Tuſſis humidæ & ſiccæ deſcriptio.	153
Tuſſis cur mala infantibus & ſenibus.	154
Tuſſis tabem minans.	ibid.
Tuſſis hydropi ſuperueniens mala.	ibid.
Tuſſis irrita cur fiat in tumore hepatis.	154.155
Tuſſis in feb. duplex ferina.	ibid.
Tuſſis blandæ & ſitim ſedantis deſcriptio.	155
Tuſſis ferina cur periculofa.	156
Tuſſis ſicca hydropi ſuperueniens ſignum pernicioſiſſimum.	164
Tumor œdematoſus pedum in quo hydrope eſt exitiale.	162

V

V Enæ cur prominent hepaticis.	167
Ventriculi operationum læſiones.	5
Ventris nominis ratio.	63
Ventris dolor in quos affectus ſolet tranſire.	ibid.
Ventris dolor quando terminatur ad mortem.	63
Ventriculus æſtuoſus, & calidus cur habitum tenuem, & frigidum facit, & iracundiores homines.	174
Ventriculi vulnera quæ ſanantur vel non ſanantur.	351
Ventriculi affectiones totam naturalem œconomiam labefactant.	178
Ventriculi vis retinendi quib. perficitur vel labefactatur.	345
Vertiginis prognofis diſtinctio.	24

I N D E X.

Vertigo sanorum.	ibid.
Vertigo morboſa lethalis.	25
Vertigo critica.	ibid.
Vertiginis duplex conſideratio.	111
Vertigo lethalis.	ibid.
Vertigo aduentante criſi quare media inter ſalutarem, & lethalem.	ibid.
Vermium generatio, cauſæ & quibus fiunt.	204
Vermes cur non fiunt lactentibus.	205
Vermium genera in quibus locis fiunt.	ibid.
Vermium ſæuitiam ſequentia ſymptomata.	ibid.
Vermium morſus facti quæ ſymptomata pariant.	205
Vermium rotundorum ſymptomata.	206
Vermium aſcaridum generatio.	ibid.
Vermium prog. vnde ſumitur.	ibid.
Vermium exclusio in principio morbi mala, in fine bona.	ibid.
Verminofi pueri cur maſticant.	206
Veficæ inflammatio lethalis.	220
Veficæ inflammatio citiſſimè in gangrenam vertitur.	ibid.
Veficæ muſculi ceruicis actio.	ibid.
Vefica tantum laborat in diſcuria.	217
Vigilia duplex.	94
Vigiliæ præter naturam, & ſuperfluç cauſæ.	95
Vigiliæ criſim ſignificantes.	ibid.
Vigiliæ poſt criſim, recidiuæ ſignum certiſſimum.	ibid.
Vigiliæ phrenitidem prænuntiantes & comitantes.	ibid.
Vigiliæ peſſimæ, vt cauſa, & vt ſignum.	ibid.
Virium infirmitas cur ſanguinis corruptioni coniungitur.	180
Virium robur quib. dignoſcitur.	4
Viſionis vitia circa quæ verſantur.	27
Ulcerum	

I N D E X.

Vlcerum consideratio vtilis ad prognosim.	330
Vlcera morbum salutarem vel lethalem demonstrant.	
ibid.	
Vlcera qualia in morb. funestis.	ibid.
Vlcera sicca quæ laudanda vel damnanda.	331
Vlcerum duo genera in hydrope.	ibid.
Vlcera narium quæ difficulter curantur, quæ incurabilia, & lethalia sunt.	38
Vlcerum pulmonum differentia.	147
Vocis vitia vnde eius diminutionis, & interceptionis causæ.	310
Vocis deprauatæ causa.	ibid.
Vocalium instrumentorum angustia, quando affectum periculosum demonstrant.	ibid.
Vox tremula in acutis.	311
Vocis destructio à paralyfi.	ibid.
Vox in quib. olfactus vitiis læditur.	37
Voluptas & dolor quid.	44
Vomitus in ileo varius lethalis.	199
Vomitus ratio in ileo.	ibid.
Vomitus & nausæ differentia.	201
Vomitus nausæ, & cardialgia in febribus vnde.	202
Vomitus, & nausæ cur mala in morbis.	ibid.
Vomitus criticus rarus.	249
Vomitus qui laudatur.	ibid.
Vomitus symptomatici descriptio.	250
Vomitus sanguinis copiosus vnde.	ibid.
Vomitus sanguinis à proprio vitio ventr. an aliunde.	
ibid.	
Vomitus omnis sanguinis damnatur.	ibid.
Vomitio meraca quarum partium labem sequitur.	251
Vomitus & nausæ in feb. putridis generatio.	255
Vomitus quando non dissuadet venæ sectionem in principio morbi.	ibid.

I N D E X.

Vomitus aluum cohibet, & mouet.	ibid.
Vomitus biliofus cur malus in dysenteria.	256
Vomitus biliofus cur fiat in omnibus vulneribus.	257
Vomitus cerebrum fauciatum, vel non fauciatum demonstrans.	ibid.
Vrinationi partes dicatæ.	210
Vrinæ quales in colliquatione hepatis.	167
Vrinarum purulentarum signa quare fallaciffima.	214
Vrinationis symptomata.	217
Vrinæ ftillidium quod symptoma.	ibid.
Vrinæ fuppreffio natura extincta.	ibid.
Vrinæ fuppreffio à vitio veficæ caufæ.	ibid.
Vrinæ fuppreffio vacua vefica, caufæ.	218
Vrinæ fuppreffio in morbi acutis.	ibid.
Vrinæ deriuatio, & translatio quando fufpecta vel non fufpecta.	ibid.
Vrinæ translationis signa.	ibid.
Vrina pluribus diebus fuppreffa quæ symptomata pariat.	219
Vrinæ fuppreffio ab inflammationis veficæ.	ibid.
Vrinæ inuoluntarius exitus quale symptoma.	222
Vrina quid & quarum partium affectus demonftrat.	273
Vrinæ varia fubftantia vnde fit.	ibid.
Vrinæ optimæ dotes & quæ optimè coctæ.	ibid.
Vrina celeriter coctæ quare non laudatur.	274
Vrina in omni morbo damnanda.	275
Vrinas manè & vefperi effe obferuandas.	ibid.
Vrinarum duplex confideratio in morbis.	ibid.
Vrina femel vifa non effe de exitu morbi pronuntian- dum.	ibid.
Vrinarum craffarum differentiæ, & quid fignificent.	ibid.
Vrinæ turbatæ quæ dicuntur & quot fint eius fpecies.	276.
Vrinæ quæ optimæ & deterrimæ.	ibid.
Vrinæ	

I N D E X.

Vrinæ turbatæ multa mala signantes.	ibid.
Vrinæ tenuitas in morb. à quibus causis.	277
Vrina vnde subitò attenuatur.	ibid.
Vrinæ multæ & tenues ex paucis & crassis, quare opti- mæ.	ibid.
Vrina paulò tenuior laudanda.	278
Vrinæ aqueæ cur semper malæ.	ibid.
Vrina aquosa quare non ita mala.	ibid.
Vrina tenuis & aquosa quare in pueris deterrima.	ibid.
Vrina tenuis quando morbi exitum per abscessum signi- ficat.	ibid.
Vrinæ quantitas duplex.	279
Vrinarum copia cum crassitie quando bona vel mala.	ibid.
Vrinarum multitudo critica.	ibid.
Vrinarum multitudo laudabilis.	ibid.
Vrinarum paucitatis causæ.	240
Vrinarum paucitas in omnib. hydropis speciebus à di- uersis modis.	ibid.
Vrinæ paucitas cum paucò sedimento cur damnatur in morbis humoralibus.	ibid.
Vrinæ suppressio laudabilis ante crism.	102
Vrinæ hepaticorum in quo differunt ab his quæ excer- nuntur à resolutione pinguedinis renum.	166, 167.
Vrinæ quid demonstrent.	241
Vrinarum rubrarum tres gradus obseruandi in morbis.	ibid.
Vrina subrubra crism promittens qualis.	241, 242
Vrinarum cruentarum causæ.	242
Vrina vnde colorem habet.	ibid.
Vrinæ color laudabilis.	243
Vrinæ vnde nigrescunt & quæ nigredo pessima.	ibid.
Vrinæ nigræ quæ salutare.	ibid.
Vrinæ	

I N D E X.

Vrinæ nigræ & tenues quare omnium pessimæ, & nigræ substantia ac sedimento quare lethales.	ibid.
Vrinæ virentes & herbacæ in acutis periculosæ.	244
Vrina tota substantia oleosa secundam crism promittit.	ibid.
Vrina oleosa malitiam febris ostendens.	ibid.
Vrinæ oleosæ à solis renibus vel à toto corpore destinatio.	ibid.
Vulneris definitio chirurgica & eius attributa.	334. 335
Vulnus quot modis dicitur magnus.	335
Vulneris cachectia.	ibid.
Vulnerum malignorum symptomata.	ibid.
Vulnerum insanabilium vel difficulter sanatorum genera.	ibid.
Vulnera nervis punctim facta, cur curatu difficilia.	336
Vulnera quæcúmque quib. insanabilia evadunt.	ibid.
Vulnera capitis ratione loci esse magis vel minus lethalia.	337
Vulnera capitis cur mortalia.	338
Vulnera temporib. facta, cur tam gravia symptomata adferant.	339
Vulnera spinalis medullæ lethalia.	340
Vulnera spinalis medullæ sublimiori parti facta, cur magis lethalia.	341
Vulnera spinalis medullæ transversa, cur necessario lethalia.	ibid.
Vulnera nervorum qualia.	342
Vulnera venarum & arteriarum quare necessario lethalia.	343
Vulnerum hepatis varium iudicium.	344
Vulnus hepatis exiguum quare aliquando lethale.	345
Vulnera hepatis quæ sanabilia vel insanabilia.	ibid.
Vulnera rerum & lienis quæ lethalia vel sanabilia.	ibid.
Vulne	

INDEX.

Vulnera diaphragmatis quæ magis vel minus mortifera.


346

Vulnera cordis cur simpliciter & necessariò lethalia. 347

Vulnus vesicæ lethale.

348


FINIS.



Laus sit Deo Opt. maximo.



Extrait du Privilege du Roy.

 A R grace & priuilege du Roy, il est permis à Claude Morillon, Libraire & Imprimeur à Lyon, imprimer, ou faire imprimer, vendre & distribuer vn liure intitulé: *Opus Medica Prognoseos, &c. Composé par Anthoine Constantin, Docteur en Medecine.* Et ce pour le temps & terme de six ans entiers & consecutifs, à cōpter du iour & datte que ledict liure sera paracheué d'imprimer; Avec defences à tous Libraires & Imprimeurs du Royaume de France, & autres sujets du Roy, de quelque nation qu'ils puissent estre, d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, debiter, tenir & achepter, ny eschanger ou traffiquer dedans & dehors ledict Royaume, aucuns dudit liure, que de celuy dudit Morillon, sans son sçeu & consentement, aux peines portees par les lettres patentes de sa Majesté, donnees à Paris au mois de Mars, l'an de grace mille six cens & treze, Et de son regne le quatriesme.

Par le Roy en son Conseil,

LE. LIEVRE.

Et seellé du grand seel en cire iaune.

Acheué d'imprimer le 12. de Mars, 1613.

